МЕЗОЗОЙСКИЕ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

МЕЗОЗОЙСКИЕ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ СССР

(Справочное руководство)

ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУКА"
МОСКВА 1980

УДК 561.42 : 551.76 (47 + 57) (03)

Мезозойские голосеменные растения СССР (Справочное руководство). М.: Наука, 1980 г.

Работа содержит данные, касающиеся стратиграфического положения и местонахождения остатков птеридоспермов, кейтониевых, беннеттитовых, цикадовых, гинкговых, чекановскиевых, хвойных и репродуктивных органов голосеменных, распространенных в триасовых, юрских и нижнемеловых отложениях СССР. Для каждого вида, принадлежащего одной из вышеперечисленных групп, приведены ссылки на все работы, в которых они когда-либо были описаны и изображены с территории СССР, а также указан возраст вмещающих пород и положение местонахождения. Сведения, касающиеся типов родов и голотипов, включены даже в том случае, если эти роды и виды были установлены за рубежом и лишь позднее были найдены в СССР. Приведен исчерпывающий список литературы.

Работа является справочным руководством для лиц, изучающих ископаемые флоры мезозоя и стратиграфию континентальных отложений этого возраста.

Библ. 648 назв.

Редакционная коллегия

Академик *А.В. Пейве* (главный редактор)
В.Г. Гербов, В.А. Крашенинников, П.П. Тимофеев

Ответственный редактор

доктор геолого-минералогических наук
В.А. Вахрамеев

М $\frac{20801 - 349}{055\,(02) - 80}$ 354–80, кн. 2 2002000000

© Издательство "Наука" 1980 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В предлагаемое справочное руководство "Мезозойские голосеменные растения СССР" входят все роды и виды этого класса (птеридоспермы, кейтониевые, бенеттитовые, цикадовые, гинкговые, чекановскиевые, хвойные и др.), остатки которых когда-либо были описаны из триасовых, юрских и нижнемеловых отложений с территории СССР как отечественными, так в редких случаях зарубежными (дореволюционное время) палеоботаниками. В него включены также виды, описанные из пограничных отложений нижнего и верхнего мела, относимых одними исследователями к альбу, а другими к сеноману. Внутри перечисленных порядков растения распределены в алфавитном порядке по родам, а внутри последних по видам. От выделения семейств пришлось отказаться, так как систематическая принадлежность к ним многих родов, и в том числе всех формальных родов (форм-родов), в настоящее время не может быть установлена.

После названия рода следует ссылка на типовой вид, помещаемый и в том случае, если он был обнаружен вне Советского Союза и описан зарубежными палеоботаниками. Для каждого вида даются ссылки на все работы (кроме учебных пособий), в которых он был описан и изображен с указанием возраста вмещающих отложений и местонахождения. Включены и все работы, в которых дано только изображение того или иного таксона или только его описание без изображения. Ссылка на первоописание вида приводится независимо от того, был ли этот вид впервые установлен на территории СССР или за рубежом. Если вид был первоначально описан под другим родовым названием, то сначала делается ссылка на работу, в которой этот вид был описан впервые, а затем на работу, в которой его родовое название было изменено на принятое ныне.

Родовая принадлежность помещенных в работе видов дана так, как она приведена в соответствующих монографиях и статьях. В случае, если данный род был полностью признан невалидным, а первоначально включавшиеся в него виды отнесены к другим родам, после наименования уничтоженного рода указывается причина его аннулирования (например, Tyrmia).

Первоописания некоторых видов в ряде отечественных работ сделаны не авторами данных таксонов, не успевшими по тем или иным причинам опубликовать описание выделенных или видов, а более поздними исследователями. Последние, опубликовав описания, сделанные на основе собственного палеоботанического материала, сохранили как первоначальные наименования, так и авторство предложивших эти наименования палеоботаников. В этом случае в нашей работе после заголовка, заключающего название вида и его первоначального автора, следует ссылка на работу другого исследователя (примеры: Pterophyllum burejense Prynada ex Vachrameev at Doludenko [Вахрамеев, Долуденко, 1961]; Taeniopteris asiatica Brick ex Sixtel [Сикстель, 1952]), в которой впервые появилось первоописание этого вида.

Ссылки на описания остатков растений, определенных по открытой номенклатуре (cf., aff., ex gr.), помещены в конце перечня работ, касающихся данного вида. Растения, определенные только до рода (Ginkgo sp., Czekanowskia sp. и т.д.) как правило, не включены в нашу работу. Немногочисленные исключения сделаны только для представителей редко встречающихся родов.

Для остатков растений, определенных на территории СССР только по открытой номенклатуре (aff., cf., ex gr., sp.), ссылки на первоописания видов обычно

не приводятся. Окончания названий видов в большинстве случаев даны в том виде, в каком они впервые были опубликованы.

Возраст отложений, вмещающих растительные остатки, по возможности дан по современным данным обычно в рамках отдела международной шкалы. В случае различного толкования возраста местных стратиграфических подразделений нами указывается возраст в пределах системы (например, возраст Усть-Балейского местонахождения в Иркутском бассейне, относимого одними к верхам нижней юры, а другими — к низам средней). Нередко в скобках указывается наименование свиты. Для районов с многократно менявшимися наименованиями и объемами свит принадлежность к свите не указывается.

Предлагаемое руководство значительно облегчит определительскую и исследовательскую работу лицам, занимающимся изучением мезозойских флор. С его помощью палеоботаники смогут легко отыскать ссылки на все публикации, необходимые для обработки остатков растений, принадлежащих тому или иному роду или виду. Оно же может быть использовано как палеоботаниками, так и геологами для выяснения стратиграфических рамок распространения включенных в него видов, частоты их встречаемости и примерных очертаний ареалов. С помощью руководства можно легко найти авторов видовых и родовых таксонов и проверить правильность их написания.

Несомненный интерес представляет и список литературы, помещенный в работе и охватывающий все палеоботанические статьи и монографии, посвященные описанию голосеменных растений из триасовых, юрских и нижнемеловых отложений СССР.

В книге будут заинтересованы и зарубежные палеоботаники, обычно недостаточно знакомые с работами советских исследователей. По ней они смогут составить и достаточно полное представление об объеме и характере имеющейся на русском языке палеоботанической литературы, посвященной мезозойским растениям и отдельным ее представителям.

Предлагаемая работа была выполнена членами Комиссии по изучению высших растений мезозоя (председатель В.А. Вахрамеев), входящей в Научный совет по проблеме "Пути и закономерности исторического развития животных и растительных организмов" при Академии наук СССР.

Разделы, посвященные птеридоспермам и кейтониевым, составлены И.А. Добрускиной; разделы, касающиеся беннеттитовых, цикадовых и филлоспермид ближе не установленного систематического положения (цикадофитов) — М.П. Долуденко; раздел гинкговых — В.А. Самылиной; раздел чекановскиевых — А.И. Киричковой; раздел хвойных — В.А. Красиловым; раздел "Репродуктивные органы голосеменных" — А.Т. Бураковой. В последний раздел включены только репродуктивные органы голосеменных ближе не установленного систематического положения. Репродуктивные органы, принадлежность которых к родам и семействам, входящим в те или иные порядки голосеменных, была достаточно убедительно установлена, включены непосредственно в эти порядки.

План построения справочного руководства был предложен В.А. Вахрамеевым, им же составлена инструкция, осуществлено редактирование всего материала и написано предисловие. Большая работа в унифицировании текста и выверке ссылок на литературу была выполнена М.П. Долуденко. В работе использованы литературные источники, опубликованные до 1978 г.

Авторы выражают свою глубокую признательность старшим лаборантам Лаборатории палеофлористики Геологического института АН СССР Г.Д. Веселовой и К.А. Печниковой за перепечатку материалов, подбор литературы и корректорскую работу.

КЛАСС GYMNOSPERMAE. ГОЛОСЕМЕННЫЕ

ПОДКЛАСС PTERIDOSPERMIDAE. ПТЕРИДОСПЕРМЫ

ПОРЯДОК CYCADOFILICALES. ПТЕРИДОСПЕРМОВЫЕ

Aipteris Zalessky, 1939

Aipteris speciosa Zalessky

1939. Zalessky, с. 348, фиг. 27. Верхняя пермь. Р. Аи, Башкирия.

Aipteris hirsuta Sixtel

1959. Сикстель, табл. I, фиг. 1. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

1961. Сикстель, с. 151, рис. 1, 2. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

1962. Сикстель, с. 320, табл. 10, фиг. 1. табл. 11, фиг. 1–5, 6 (?); рис. 12, 13, 14. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Aipteris nerviconfluens Brick

1952. Брик, с. 37, табл. 13, фиг. 1–9. Верхний триас (курашасайская свита). Бассейн р. Илек, Актюбинское Приуралье.

1959. Нейбург, с. 682, рис. 1,*е*, 2,*в*. Верхний триас. Р. Б. Сыня, Печорский бассейн.

Aipteris pamirica Sixtel

1960. Сикстель, в кн.: Новые виды. . . , с. 68, табл. 9, фиг. 7; рис. 12. Триас. Бартанг, Памир.

Aipteris pinnata Sixtel

1961. Сикстель, с. 153, рис. 3. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

1962. Сикстель, с. 323, табл. 12, фиг. 1–7, рис. 15, 16. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Angaridium Zalessky, 1933

Angaridium bardense Zalessky

1933. Zalessky, с. 1096, фиг. 4–6. Пермь. Урал.

Angaridium (?) dubitabilis Sixtel

1962. Сикстель, с. 352, табл. 23, фиг. 1–7, рис. 29, 30. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Angaridium (?) inflexum Sixtel

1962. Сикстель, с. 350, табл. 23, фиг. 8–11, рис. 27, 28. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Angaropteridium Zalessky, 1932

Angaropteridium cardiopteroides (Schmalhausen) Zalessky

1877. Neuropteris cardiopteroides. Schmalhausen, с. 742, табл. 2, фиг. 14—18. Карбон. Минусинская котловина, Средняя Сибирь.

1932. Angaropteridium cardiopteroides. Zalessky, стр. 111, фиг. 30. Пермь. Сибирь.

Angaropteridium (?) magnifolium Sixtel

1962. Сикстель, с. 348, табл. 22, фиг. 1—4. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Antevsia Harris, 1937

Antevsia zeilleri (Nathorst) Harris

1908. Antholithus zeilleri. Nathorst, с. 20, табл. 2, фиг. 59, 60, табл. 4. Верхний триас. Южная Швеция

1937. Antevsia zeilleri. Harris, с. 35. Верхний триас. Восточная Гренландия.

Antevsia kolvaensis Chramova

1977. Храмова, с. 53, табл. 17, фиг. 7—10. Верхний триас (сероцветная толща и большесынинская свита). Бассейн р. Печоры.

Antevsia prynadae Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 51, табл. 30. Верхний триас (протопивская свита) Гаражовка, Донбасс.

Callipteridium Weiss, 1870

Callipteridium sullivanti (Lesquereux) Weiss

1870. Weiss, с. 876, табл. 21, фиг. 1—3. Карбон. Центральная Европа.

Callipteridium remotum Brick

1952. Брик, с. 36, табл. 12, фиг. 1—6. Верхний триас (курашасайская свита). Бассейн р. Илек, Актюбинское Приуралье.

Callipteridium (?) sp.

1962. Сикстель, с. 331, табл. 24, фиг. 1; рис. 20. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Callipteris Brongniart, 1849

Callipteris conferta (Sternberg) Brongniart

1833 (1820—1838). Neuropteris conferta. Sternberg, с. 75, табл. 22, фиг. 5. Карбон. Польша.

1849. Callipteris conferta. Brongniart, с. 66

Callipteris ferganensis Sixtel

1962. Сикстель, с. 329, табл. 14, фиг. 2—5; рис. 19. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Callipteris sp.

1962. Сикстель, с. 331, табл. 14, фиг. 1,*а*, 1,*б*. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Chankanella Krassilov, 1964

Chankanella vachrameevi Krassilov

1964. Красилов, с. 117, табл. 16, фиг. 3—10. Нижний мел. Оз. Ханка, Южное Приморье.

Chiropteris Kurr, 1858

Chiropteris digitata Kurr

1858. Kurr (in Bronn), с. 143, табл. 12. Триас. Центральная Европа.

Chiropteris integella Sixtel

1962. Сикстель, с. 397, рис. 45, 46. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Comia Zalessky, 1934

Comia pereborensis Zalessky

1934. Zalessky, с. 268, фиг. 44, 45. Пермь. Печорский бассейн.

Comia sp.

1973. Могучева, с. 82, табл. 37, фиг. 6. Нижний триас. Тунгусский бассейн.

Compsopteris Zalessky, 1934

Compsopteris adzvensis Zalessky

1934. Zalessky, с. 264, фиг. 38, 39. Пермь. Печорский бассейн.

Compsopteris kryshtofovichii Vladimirovich

1968. Владимирович в кн.: Новые виды. . . , с. 57, табл. 18, фиг. 3—5. Средний—верхний триас (калачевская свита). Челябинский бассейн.

Ctenopteris Saporta, 1872

Ctenopteris cycadea (Berger) Saporta

1832. Odontopteris cycadea. Berger, с. 23, 27, табл. 3, фиг. 2, 3. Верхний триас. Центральная Европа.

1872 (1872—1873). Ctenopteris cycadea. Saporta, с. 355, табл. 40, фиг. 2—5; табл. 41, фиг. 1, 2. Юра. Франция.

Ctenopteris angustifolia Prynada

1970. Принада, с. 57, табл. 4, фиг. 8; табл. 6, фиг. 1; рис. 23. Нижний триас (корвунчанская свита). Тунгусский бассейн.

Ctenopteris punctata Sixtel

1962. Сикстель, с. 355, табл. 19, фиг. 5—6; рис. 32. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Ctenozamites Nathorst, 1886

Ctenozamites cycadea (Berger) Schenk

1832. Odontopteris cycadea. Berger, с. 23, табл. 3, фиг. 2, 3. Верхний триас. Центральная Европа.

1887. Ctenozamites cycadea. Schenk, с. 5, табл. 3, фиг. 11—16,*a*; табл. 4, фиг. 18; табл. 6, фиг. 30; табл. 7, фиг. 36; табл. 8, фиг. 43; табл. 9, фиг. 54. Нижняя юра. Иран.

1967. Делле, с. 86, табл. 13, фиг. 6—12; табл. 14, фиг. 1, 2. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

Ctenozamites minor Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 53, табл. 31; рис. 19,*с*, 20. Верхний триас (протопивская свита). Гаражовка, Донбасс.

Ctenozamites usnadzeae Doludenko et Svanidze

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 24, табл. 18, фиг. 1—6; табл. 19, фиг. 3, 5, 6. Верхняя юра. Грузия.

Ctenozamites sp.

1971. Станиславский, с. 59, рис. 24. Верхний триас (новорайская свита). Донбасс.

Cycadopteris Zigno, 1853

Cycadopteris ungeri Zigno

1853. Zigno, с. 349. Средняя юра. Италия. (Первое изображение листьев рода Cycadopteris дано для C. brauniana Zigno, 1861, с. 580, табл. 5, 6. Там же).

Cycadopteris georgica Doludenko

1974. Doludenko, с. 13, табл. 2, фиг. 3—7; табл. 3, фиг. 1—4. Верхняя юра. Грузия.

Cycadopteris jurensis (Kurr) Hirmer

1846. Odontopteris (?) jurensis. Kurr, с. 12, табл. 2, фиг. 1. Верхняя юра. ФРГ.

1924. Cycadopteris jurensis. Hirmer, с. 147, табл. 9, фиг. 4; табл. 10, фиг. 5—12; табл. 11, фиг. 13—19; табл. 12, фиг. 20—30. Юра. ФРГ, Италия, Португалия.

1969. Pachypteris bendukidzei. Долуденко, Сванидзе, с. 23, табл. 15, фиг. 1—8; табл. 16, фиг. 1—7; табл. 17, фиг. 1—3. Верхняя Юра. Грузия.

1974. Cycadopteris jurensis (Kurr) Hirmer. Doludenko, с. 10, 16, табл. 2, фиг. 1, 2. Верхняя Юра. Грузия.

Dicroidium Gothan, 1912

Dicroidium odontopteroides (Morris) Gothan

1845. Pecopteris odontopteroides. Morris, с. 249, табл. 6, фиг. 2?, 3. Триас. Австралия.

1912. Dicroidium odontopteroides. Gothan, с. 78, табл. 16, фиг. 5. Триас. Южная Африка.

1962. Сикстель, с. 341, табл. 19, фиг. 1—4. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Edyndella Mogutcheva, 1973

Edyndella dentata Mogutcheva

1973. Могучева, с. 84, табл. 36, фиг. 1—9; табл. 37, фиг. 1—5. Нижний триас. Тунгусский бассейн.

Furcula Harris, 1932

Furcula granulifer Harris

1932a. Harris, стр. 4, табл. 1, фиг. 1–7. Верхний триас. Восточная Гренландия.

Furcula bifurcata Sixtel

1961. Сикстель, с. 154. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

1962. Сикстель, с. 327, табл. 13, фиг. 1–8. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Furcula (?) ucrainica Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 117, табл. 63, фиг. 5, 6; табл. 64; табл. 65; табл. 66; табл. 67, фиг. 1–3; табл. 68, фиг. 1–4; рис. 48. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка, Донбасс.

Furcula uralica Prynada

1959. Владимирович, с. 464, табл. 3, фиг. 7, 8; рис. 4. Верхний триас (свита "С" Богословского месторождения). Восточный Урал.

Gigantopteris Schenk, 1883

Gigantopteris nicoteanaefolia Schenk

1883. Schenk, с. 238, табл. 32, фиг. 6–8; табл. 33, фиг. 1–3; табл. 35, фиг. 6. Верхний карбон. Китай, Юннань.

Gigantopteris ferganensis Brick

1936. Брик, с. 166, табл. 1, фиг. 4, 5. Триас (мадыгенская свита). Мадыген. Южная Фергана.

1962. Сикстель, с. 324, табл. 12, фиг. 8; рис. 17. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Gigantopteris hirsuta Sixtel

1949. Сикстель, рис. 1. Триас (мадыгенская свита). Мадыген. Южная Фергана.

Gigantopteris sp.

1962. Сикстель, с. 326, рис. 18. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Glottophyllum Zalessky, 1912

Glottophyllum cuneatum Zalessky

1912. Залесский, с. 28, табл. 5, фиг. 4. Карбон. Кузбасс.

Glottophyllum (?) sp.

1962. Сикстель, с. 349, табл. 22, фиг. 5, 6; рис. 26. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Harrisiothecium Lundblad, 1961

Harrisiothecium marsilioides (Harris) Lunblad

1932b. Hydropterangium marsilioides. Harris, с. 122, табл. 9, 10, фиг. 3–8; табл. 11, фиг. 1, 2, 15. Верхний триас. Залив Скоресби, Восточная Гренландия.

1950. Harrisia marsilioides. Lunblad, c. 71. Там же.
1961. Harrisiothecium marsilioides. Lundblad, c. 23. Там же.

Harrisiothecium laxum Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 56, табл. 46, фиг. 9, рис. 21. Верхний триас протопивская свита). Гаражовка, Донбасс.

Hissarella Sixtel, 1966

Hissarella schamolensis Sixtel

1966. Сикстель, с. 26, табл. 10, фиг. 1–11. Верхняя пермь – нижний триас. Р. Ханака, Гиссарский хребет.

Hissarella ferganensis Sixtel

1966. Сикстель, с. 27, табл. 11, фиг. 1–11. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Hydropterangium Halle, 1910

Hydropterangium marsilioides Halle

1910. Halle, c. 11, табл. 2, фиг. 1–14; табл. 3, фиг. 12–15. Верхний триас. Швеция.

Hydropterangium cf. marsilioides Halle

1971. Станиславский, с. 60. рис. 26. Верхний триас. Донбасс.

Hydropterangium asiaticum Sixtel

1962. Сикстель, с. 339, табл. 18, фиг. 4, 5; рис. 24. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Hydropterangium sp.

1967. Красилов, с. 226, табл. 88, фиг. 5, 6; рис. 31, *д–е*. Нижний мел (липовецкая свита). Южное Приморье.
1967. Красилов, с. 227, табл. 88, фиг. 7, 8; рис. 31, *ж*. Нижний мел (галенковская свита). Южное Приморье.

Hyrcanopteris Kryshtofovich et Prynada, 1933

Hyrcanopteris sevanensis Kryshtofovich et Prynada

1933а. Криштофович. Принада, с. 10. табл. 1, фиг. 3–5. Верхний триас. Р. Джерманис, Армения.

Hyrcanopteris tschuenkoi Prynada

1934. Принада, с. 27, табл. 11, фиг. 1, 4. Верхний триас. Памир.

Imania Krassilov et Schorochova, 1970

Imania heterophylla Krassilov et Schorochova

1970. Красилов, Шорохова, с. 103, табл. 13, фиг. 1–3, 7; табл. 14, фиг. 1–8; табл. 15, фиг. 1–10. Верхний триас. Южное Приморье.

Kirjamkenia Prynada, 1970

Kirjamkenia lobata Prynada

1970. Принада, с. 60, табл. 6, фиг. 4, 5; табл. 7, фиг. 4, 5. Нижний триас. Тунгусский бассейн.

Lepidopteris Schimper, 1869

Lepidopteris stuttgartiensis (Jaeger) Schimper

1827. Aspidioides stuttgartiensis. Jaeger, с. 32, 38, табл. 8, фиг. 1. Верхний триас. ФРГ.

1869 (1869–1874). Lepidopteris stuttgartiensis. Schimper, с. 572, табл. 34. Верхний триас. ФРГ.

1976. Станиславский, с. 112, табл. 53, фиг. 1, 2; табл. 57; табл. 59; табл. 60; табл. 61; табл. 62, фиг. 1, 2; табл. 63, фиг. 1–4; рис. 47. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка, Донбасс.

Lepidopteris elegans (Brick) Sixtel

1941. Cladophlebidium elegans. Брик, с. 22, табл. 6, фиг. 3; рис. 4. Верхний триас. Камыш-Баши, Южная Фергана.

1960. Lepidopteris elegans. Сикстель. с. 65, табл. 9, фиг. 3, 4; рис. 11. Верхний триас. Камыш-Баши, Южная Фергана. Верхний триас? Памир.

Lepidopteris (?) laevis Chramova

1977. Храмова, с. 52, табл. 16, фиг. 1–3. Верхний триас (сероцветная толща). Бассейн р. Печоры.

Lepidopteris ottonis (Goeppert) Schimper

1836. Alethopteris ottonis. Goeppert, с. 303, табл. 37, фиг. 3, 4. Верхний триас. Польша.

1869 (1869–1874). Lepidopteris ottonis. Schimper, с. 574. Там же.

1952. Брик, с. 34, табл. 12, фиг. 7, 8. Верхний триас (курашасайская свита). Бассейн р. Илека, Актюбинское Приуралье.

1958. Турутанова-Кетова, табл. 3, фиг. 8, 10. Нижний триас. Вост. Урал.

1961. Ковальчук, табл. 57, фиг. 3, 4. Верхний триас (тологойская свита). Кендерлыкская мульда, Казахстан.

1962а. Киричкова, с. 460, табл. 1, фиг. 13–16; рис. 2, 3. Нижний триас. Анохино, Восточный Урал.

Lepidopteris parvula Sixtel

1962. Сикстель, с. 316, табл. 9, фиг. 4–10; рис. 9–11. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

1968. Сикстель, Худайбердыев, табл. 15, фиг. 4, 5. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Lepidopteris toretziensis Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 33, табл. 4–28. Верхний триас (протопивская свита). Гаражовка, Донбасс.

Lepidopteris sp.

1971. Станиславский, с. 56, рис. 22, *А–Н*. Верхний триас. Донбасс.

1977. Храмова, с. 52, табл. 16, фиг. 4–9. Верхний триас (большесынинская свита); бассейн р. Печоры.

Madygenia Sixtel, 1956

Madygenia asiatica Sixtel

1956. Сикстель, с. 226, табл. 40, фиг. 1–3. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана

1959. Сикстель, табл. 1, фиг. 2–3. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

1962. Сикстель, табл. 22, фиг. 7–8. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

1968. Сикстель, Худайбердыев, табл. 12, фиг. 2. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Madygenia borealis f. typica Radczenko

1967. Владимирович и др., с. 27, рис. 6–9. Нижний триас (мальцевская свита). Кузбасс. Нижний триас. Тунгусский бассейн.

1973. Могучева, с. 82, табл. 34, фиг. 3–6; табл. 35, фиг. 5–7. Нижний триас. Тунгусский бассейн.

Madygenopteris Sixtel, 1956

Madygenopteris irregularis Sixtel

1956. Сикстель, с. 227, табл. 38, фиг. 4–5. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

1959. Сикстель, табл. 2, фиг. 1–2. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

1962. Сикстель, табл. 15, фиг. 1–4. Триас (мадыгенская свита). Мадыген Южная Фергана.

1968. Сикстель, Худайбердыев, табл. 12, фиг. 3. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Madygenopteris dentata Sixtel

1960. Сикстель, с. 72, табл. 16, фиг. 7–8. Нижняя юра? Ташкутан, Средняя Азия.

Madygenopteris triasica Vladimirovich

1968. Владимирович, в. кн.: Новые виды. . . , с. 55, табл. 18, фиг. 1–2. Нижний триас (верхи туфогенной толщи). Челябинский бассейн

Neuropteridium Schimper, 1879

Neuropteridium grandifolium Schimper

1879. Schimper in Schimper et Schenk, 1879–1890, с. 117, фиг. 90. Нижний триас. Центральная Европа.

Neuropteridium (?) ferganicum Sixtel

1962. Сикстель, с. 353, табл. 16, фиг. 3–5; рис. 31. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Neuropteridium sp.

1961. Сикстель, с. 355, табл. 16, фиг. 1. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Odontopteris Brongniart, 1825

Odontopteris brardii (Brongniart) Brongniart

1822. Filicites brardii. Brongniart, с. 234, табл. 2, фиг 5. Карбон. Западная Европа.

1825. Odontopteris brardii. Brongniart in Sternberg, 1825 (1820–1838), табл. 21. Там же.

Odontopteris (?) laceratifolia Halle

1962. Сикстель, с. 335, табл. 17, фиг. 3–4. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Odontopteris (?) latiloba Sixtel

1962. Сикстель, с. 336, табл. 19, фиг. 14; рис. 23. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Odontopteris (?) triasica Brick

1941. Брик, с. 23, табл. 7; рис. 5 и 5,*в* в тексте. Верхний триас. Камыш-Баши, Южная Фергана.

Pachypteris Brongniart, 1829

Pachypteris lanceolata Brongniart

1829 (1828–1838). Brongniart, с. 167, табл. 45, фиг. 1. Средняя юра. Англия.

1958. Вахрамеев, Самылина, с. 1611, табл. 1, фиг. 1–7. Средняя – верхняя юра. Северный Кавказ.

1962. Гомолицкий, Курбатов, Сикстель, с. 166–167, табл. 9, фиг. 1–7. Средняя – верхняя юра. Гиссарский хребет.

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 176, табл. 35, фиг. 3, 7, 8; рис. 73. Средняя юра. Туаркыр.

1967. Делле, с. 84, табл. 11, фиг. 4–14. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

1969. Долуденко, с. 26, табл. 1, фиг. 1, 2; табл. 2, фиг. 1–4; табл. 3, фиг. 1–5; табл. 4, фиг. 1–6; табл. 5, фиг. 1–6; табл. 6, фиг. 1–10; табл. 8, фиг. 3, 4, 7; табл. 9, фиг. 1, 2, 6; табл. 10, фиг. 1, 2. Верхняя юра. Верхняя Рача, Грузия.

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 20, табл. 9, фиг. 1–7; табл. 10, фиг. 1–4; табл. 11, фиг. 1–5; табл. 12, фиг. 1–5; табл. 13, фиг. 1–5; табл. 14, фиг. 1–5. Верхняя юра. Грузия.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 175, табл. 6, фиг. 4. Средняя юра. Кугитанг, Средняя Азия.

Pachypteris bendukidzeae Doludenko et Svanidze

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 23, табл. 15, фиг. 1–8; табл. 16, фиг. 1–7; табл. 17; фиг. 1–3. Верхняя юра. Грузия. Этот вид был отнесен позже (Doludenko, 1974, с. 10, 16) к Cycadopteris jurensis (Kurr) Hirmer

Pachypteris dagestanica Doludenko

1969. Долуденко, с. 29, табл. 15, фиг. 1–6; табл. 16, фиг. 1, 2. Средняя юра. Дагестан.

Pachypteris multiformis Delle

1967. Делле, с. 85, табл. 12, фиг. 1–6; табл. 13, фиг. 1, *а*, 2–5. Средняя юра. Ткварчели. Грузия.

1969. Долуденко, с. 29. табл. 13, фиг. 3–5; табл. 14, фиг. 1–13. Средняя юра. Грузия.

Pachypteris aff. speciosa (Ettingshausen) Andrae

1969. Долуденко, с. 28, табл. 12, фиг. 1–6; табл. 13, фиг. 1, 2. Средняя юра. Грузия.

Peltaspermum Harris, 1937

Peltaspermum rotula Harris

1937. Harris, с. 34. Изображение дано: Harris, 1932a, табл. 6, фиг. 3—6. Верхний триас. Восточная Гренландия.

Peltaspermum incisum Prynada

1976. Станиславский, с. 49, табл. 16, фиг. 6; табл. 22, фиг. 5; табл. 29; рис. 18. Верхний триас (протопивская свита). Гаражовка, Донбасс.

Peltaspermum petchoricum Chramova

1977. Храмова, с. 53, табл. 17, фиг. 1—6. Верхний триас (большесынинская свита). Бассейн р. Печоры.

Peltaspermum sp.

1971. Станиславский, с. 58, рис. 22. Верхний триас (новорайская свита). Донбасс.

1976. Станиславский, с. 114, табл. 58, фиг. 3; рис. 47, *Н*. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка, Донбасс.

Protoblechnum Lesquereux, 1880

Protoblechnum holdeni (Andrews) Lesquereus

1875. Alethopteris holdeni. Andrews, с. 420, табл. 51, фиг. 1, 2. Карбон. США.

1880. Protoblechnum holdeni. Lesquereux, 188.

Protoblechnum kryshtofovichianae Sixtel

1962. Сикстель, с. 346, табл. 21, фиг. 6—10. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

1968. Сикстель, Худайбердыев, табл. 13, фиг. 2. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Protoblechnum tuzhykovae Vladimirovich

1972. Владимирович, с. 95, табл. 1, фиг. 4—6. Средний триас (букобайская свита). Оренбургское Приуралье.

Protoblechnum wongii Halle

1927. Halle, с. 135, табл. 35; табл. 36; табл. 64, фиг. 12. Карбон. США.

1962. Сикстель, с. 346, табл. 21, фиг. 1—5. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Problechnum sp.

1960б. Шведов, с. 80, табл. 1, фиг. 4. Верхний триас (мамонова свита). Центральный Таймыр.

1973. Могучева, с. 83, табл. 38, фиг. 1. Нижний триас. Тунгусский бассейн.

Pseudotychtopteris Turutanova-Ketova, 1968

Pseudotychtopteris issykkulensis Turutanova-Ketova

1968. Турутанова-Кетова, с. 60, табл. 18, фиг. 6. Нижняя юра (джильская свита). Иссык-Куль.

Ptiloctenia Delle, 1959

Ptiloctenia ketoviae Delle

1959б. Делле, с. 819, табл. 1, фиг. 1–4; табл. 2, фиг. 1–5. Средняя юра. Грузия.

1963. Делле, в кн.: Основны палеонтологии, с. 307, табл. 28, фиг. 12–16. Там же.

Род является синонимом рода Ctenozamites, Nathorst, 1886. Типовой вид Ptiloctenia ketoviae включен автором в Ctenozamites cycadea (см. Делле, 1967, с. 86).

Ptilozamites Nathorst, 1878

Ptilozamites nilssonii Nathorst

1878b. Nathorst, с. 23, табл. 3, фиг. 1–5, 8. Нижняя юра. Швеция.

Ptilozamites cf. nilssonii Nathorst

1976. Станиславский, с. 52, табл. 13, фиг. 4; рис. 19*А*, *В*. Верхний триас (протопивская свита). Гаражовка, Донбасс.

Ptilozamites lanceolatus Chramova

1977. Храмова, с. 60, табл. 25, фиг. 1–6. Верхний триас (большесынинская свита). Бассейн р. Печоры.

Ptilozamites linguiformis Chramova

1977. Храмова, с. 61, табл. 26, фиг. 1–5. Верхний триас (сероцветная толща). Бассейн р. Печоры.

Ptilozamites semenoviae Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 118, табл. 62, фиг. 3–5; рис. 49. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка, Донбасс.

Sagenopteridium Stanislavsky, 1976

Sagenopteridium inaequale Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 120, табл. 68, фиг. 5; табл. 69. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка. Донбасс.

Sarmatiella Prynada, 1956

Sarmatiella brevifolia Prynada

1956. Принада, в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 240, табл. 42, фиг. 1. Верхний триас. Донбасс.

1971. Станиславский, с. 60, табл. 16, фиг. 4; рис. 25. Верхний триас (новорайская свита). Донбасс.

Scytophyllum Bornemann, 1856

Scytophyllum bergeri Bornemann

1856. Bornemann, с. 75, табл. 7, фиг. 1–6. Триас. ГДР.

Scytophyllum abramovii Dobruskina

1966. Добрускина, рис. 1, *ж*. Триас. Печорский бассейн.

1969. Добрускина, с. 50, табл. 4, фиг. 4; табл. 6, фиг. 1–4; рис. 5, *ж*. Верхний триас. Печорский бассейн.

Scytophyllum (?) baschkiricum Dobruskina

1969. Добрускина, с. 51, табл. 4, фиг. 5, *а*, 6, 6, *а*; табл. 6, фиг. 5; табл. 7, фиг. 1–6; рис. 4, *g*. Верхний триас (суракайская свита). Южное Приуралье.

Scytophyllum flexuosum Chramova

1973. Храмова, с. 8, табл. 2, фиг. 1–2. Верхний триас. Печорский бассейн.

1977. Храмова, с. 43, табл. 5, фиг. 1–7. Верхний триас (большесынинская свита). Бассейн р. Печоры.

Scytophyllum geniculatum Chramova

1977. Храмова, с. 46, табл. 6, фиг. 1–6. Верхний триас (большесынинская свита). Бассейн р. Печоры.

Scytophyllum kiritchkovae Chramova

1977. Храмова, с. 47, табл. 8, фиг. 1–6. Верхний триас (сероцветная толща). Бассейн р. Печоры.

Scytophyllum kolvaensis Chramova

1973. Храмова, с. 8, табл. 2, фиг. 3. Верхний триас. Печорский бассейн.

1977. Храмова, с. 47, табл. 7, фиг. 1–6. Средний (?) – верхний триас (пестроцветная – сероцветная толщи). Бассейн р. Печоры.

Scytophyllum lepidopteroides Chramova

1977. Храмова, с. 48, табл. 9, фиг. 1–6. Верхний триас (сероцветная толща). Бассейн р. Печоры.

Scytophyllum multipapillatum Chramova

1977. Храмова, с. 49, табл. 10, фиг. 1–7; табл. 11, фиг. 1–4. Верхний триас (сероцветная толща). Бассейн р. Печоры.

Scytophyllum nerviconfluens (Brick) Dobruskina

1966. Добрускина, рис. 1а, б. Триас. Печорский бассейн.

1969. Добрускина, с. 46, табл. 3, фиг. 1–6; табл. 5, фиг. 1–9, рис. 4, *а*, *б*, 5, *а*, *б*. Верхний триас. Печорский бассейн, Башкирия и Актюбинское Приуралье.

1972. Владимирович, с. 90, табл. 2, фиг. 3. Средний триас (букобайская свита); Оренбургское Приуралье.

1977. Храмова, с. 49, табл. 12, фиг. 1–6. Верхний триас (большесынинская свита). Бассейн р. Печоры.

Scytophyllum aff. nerviconfluens (Brick) Dobruskina

1969. Добрускина, с. 48, табл. 1, фиг. 4, 4, *а*. Верхний триас (суракайская свита). Южное Приуралье.

Scytophyllum neuburgianum Dobruskina

1966. Добрускина, рис. 1, *Г–Е*. Триас. Печорский бассейн.

1969. Добрускина, с. 48, табл. 4, фиг. 1, 1, *а*, 1, *б*–2, 2, *а*, 3, табл. 5, фиг. 10; рис. 4, *в*, *г*, 5, *в–д*. Верхний триас. Печорский бассейн.

Scytophyllum papillosum Dobruskina

1966. Добрускина, рис. 1, *в*. Триас. Печорский бассейн.

1969. Добрускина, с. 49, табл. 3, фиг. 8, 8*а–г*; табл. 6, фиг. 6–9; рис. 4, *е*, 5, *е*. Верхний триас. Печорский бассейн.

Scytophyllum pilosiformis Chramova

1977. Храмова, с. 50, табл. 13, фиг. 1–6. Верхний триас (сероцветная толща) . Бассейн р. Печоры.

Scytophyllum sectum Chramova

1973. Храмова, с. 9, табл. 3, фиг. 1. Верхний триас. Печорский бассейн.

1977. Храмова, с. 51, табл. 14, фиг. 1–6. Верхний триас (сероцветная толща) . Бассейн р. Печоры.

Scytophyllum sorokini Chramova

1973. Храмова, с. 9, табл. 3, фиг. 2. Верхний триас. Печорский бассейн.

1977. Храмова, с. 51, табл. 15, фиг. 1–7. Верхний триас (большесынинская свита) . Бассейн р. Печоры.

Scytophyllum tenuinerve Mogutcheva

1973. Могучева, с. 80, табл. 35, фиг. 1–4. Нижний триас. Тунгусский бассейн.

Sphenocallipteris Zeiller, 1898

Sphenocallipteris sp.

1898. Zeiller, стр. 19. Пермь. Южная Франция.

Sphenocallipteris anochiensis Turutanova-Ketova

1958. Турутанова-Кетова, табл. 2, фиг. 1. Средний триас. Анохино, Восточный Урал.

1962 а. Киричкова, с. 461, табл. 1, фиг. 10–12; рис. 4, 5, 6. Нижний триас. Анохино, Восточный Урал.

Sphenocallipteris ketovae Kiritchkova

1962 а. Киричкова, с. 464, табл. 1, фиг. 20; рис. 9. Нижний триас. Анохино, Восточный Урал.

Sphenocallipteris mesozoica Kiritchkova

1962 а. Киричкова, с. 463, табл. 1, фиг. 18; рис. 8. Нижний триас. Анохино, Восточный Урал.

Sphenocallipteris uralica Turutanova-Ketova

1958. Турутанова-Кетова, табл. 2, фиг. 1. Средний триас. Анохино, Восточный Урал.

1962 а. Киричкова, с. 463, табл. 1, фиг. 1–9; рис. 7. Нижний триас. Анохино, Восточный Урал.

Sphenopteridium Schimper, 1874

Sphenopteridium dissectum (Goeppert) Schimper

1852. Cyclopteris dissecta. Goeppert, с. 161, табл. 14, фиг. 3, 4. Карбон. Силезия, Польша.

1874 (1869–1874). Sphenopteridium dissectum. Schimper, с. 488, табл. 107, фиг. 12. Карбон. Польша.

Sphenopteridium (?) brickianae Sixtel

1962. Сикстель, с. 333, табл. 15, фиг. 5–7. Триас (мадыгенская свита) . Мадыген, Южная Фергана.

Stenopteris Saporta, 1872

Stenopteris desmomera Saporta

1872 (1872–1873). Saporta, 292, табл. 32, фиг. 1–2; табл. 33, фиг. 1 Верхняя юра. Франция.

Stenopteris cf. elongata Carruthers

1958. Турутанова-Кетова, табл. 3, фиг. 7,9. Средний триас. Анохино, Восточный Урал.

Stenopteris karaschilikensis Vladimirovich

1968. Владимирович, в кн.: Новые виды. . . , с. 53, табл. 17, фиг. 1–4. Верхний триас. Карашиликское месторождение, Северный Казахстан: Челябинский бассейн.

Tanymasia Prynada, 1934

Tanymasia pamirica Prynada

1934. Принада, с. 25, табл. 4, фиг. 6. Верхний триас. Памир.

Tersiella Radczenko, 1960

Tersiella beloussovae Radczenko

1960. Радченко, Сребродольская в кн.: Новые виды. . . , стр. 120, табл. 23, фиг. 3–7. Нижний триас. Кузбасс, Печорский бассейн.

Tersiella jurakchensis Schvedov

1963. Шведов, с. 61, табл. 1, фиг. 7?, 8–10. Нижний триас. Тунгусский бассейн.

Tersiella latifolia Sixtel

1968. Сикстель, с. 87, табл. 24, фиг. 6. Триас (мадыгенская свита), Мадыген, Южная Фергана.

Tersiella leptophylia Mogutcheva

1973. Могучева, с. 97, табл. 45, фиг. 3–9. Нижний триас. Тунгусский бассейн.

Tersiella radczenkoi Sixtel

1962. Сикстель, с. 342, табл. 19, фиг. 7–13; табл. 20, фиг. 1–5; рис. 25. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

1968. Сикстель, с. 86, табл. 24, фиг. 4,5. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

1968. Сикстель, Худайбердыев, табл. 15, фиг. 2. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Tersiella serrata Srebrodolskaja

1960. Радченко, Сребродольская, в кн.: Новые виды. . ., с. 120, табл. 24, фиг. 1–4. Нижний триас. Кузбасс.

Thinnfeldia Ettingshausen, 1852

Thinnfeldia rhomboidalis Ettingshausen[1]

1852 b. Ettingshausen, с. 2, табл. 1, фиг. 4—7. Нижняя юра. Румыния.
1933б. Принада, с. 16, табл. 2, фиг. 8. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.
1957. Станиславский, с. 47, табл. 4, фиг. 4, 5. Юра. Донбасс.
1963. Владимирович, в кн.: Основы палеонтологии, с. 94, табл. 4, фиг. 1, 2. Верхний триас. Богословское месторождение, Восточный Урал.
1965. Владимирович, с. 239, табл. 1, фиг. 1—7. Верхний триас (свита "С"). Богословское месторождение, Восточный Урал.
1966. Просвирякова, с. 85, табл. 11, фиг. 2—4. Средняя юра (джарсуйская свита). Мангышлак.

Thinnfeldia cf. rhomboidalis Ettingshausen

1907. Сьюорд, с. 10, табл. 1, фиг. 11, 12. Юра. Кавказ.

Thinnfeldia aletopteroides Sze

1956. Sze, с. 145, табл. 34, фиг. 6; табл. 45, фиг. 1, 1, *a*, 2. Триас (свита Яньчань). Северный Китай.
1960. Сикстель, с. 67, табл. 9, фиг. 5, 6. Верхний триас. Р. Ягноб, Гиссарский хребет.

Thinnfeldia cf. arctica Heer

1907. Сьюорд, с. 28, табл. 6, фиг. 37. Средняя юра. Кизилтал, Средняя Азия.

Thinnfeldia bikinensis Krassilov

1961. Красилов, с. 133, табл. 11, фиг. 1—3. Нижний мел. Сихотэ-Алинь.

Thinnfeldia distantifolia Prynada

1961. Ковальчук, табл. 56, фиг. 5—7, 8; табл. 57, фиг. 1. Верхний триас (тологойская свита). Кендерлык, Казахстан.
1965. Владимирович, с. 243, табл. 3, фиг. 3—9, табл. 4, фиг. 1,2. Верхний триас (свита "С"). Богословское месторождение, Восточный Урал.

Thinnfeldia gracilis Prynada

1940. Принада, фиг. 2. Верхний триас. Богословское месторождение, Восточный Урал.
1965. Владимирович, с. 244, табл. 4, фиг. 3—7; табл. 5, фиг. 1. Верхний триас (свита "С"). Богословское месторождение, Восточный Урал.

Thinnfeldia aff. gracilis Prynada

1969. Киричкова, с. 289, табл. 6, фиг. 3, 4. Верхний триас. Челябинский бассейн, Буланаш, Восточный Урал.

Thinnfeldia irregularis Vladimirovich

1965. Владимирович, с. 245, табл. 5, фиг. 2—7; табл. 6, фиг. 1. Верхний триас (свита "С"). Богословское месторождение, Восточный Урал.

---

[1] Кутикула этого вида, переведенного в род Pachypteris, описана М.П. Долуденко (1971, с. 103, табл. 12, фиг. 1—6).

Thinnfeldia karevae Kiritchkova

1969. Киричкова, с. 289, табл. 5, фиг. 3, 9; табл. 6, фиг. 7. Нижняя юра. Веселовское месторождение, Восточный Урал.

Thinnfeldia karpinskii Vladimirovich

1965. Владимирович, с. 247, табл. 6, фиг. 2—6. Верхний триас (свита "С"). Богословское месторождение, Восточный Урал.

Thinnfeldia microphylla Kiritchkova

1962 б. Киричкова, табл. 2, фиг. 8. Верхний триас. Челябинский бассейн.

1969б. Киричкова, с. 291, табл. 6, фиг. 5, 6; табл. 17, фиг. 8. Верхний триас. Челябинский бассейн.

Thinnfeldia minima Sixtel

1962. Сикстель, с. 343, табл. 20, фиг. 6—8. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Thinnfeldia vulgaris Prynada

1940. Принада, фиг. 1, 3. Верхний триас. Богословский рудник, Восточный Урал.

1965. Владимирович, с. 241, табл. 2, фиг. 1—8; табл. 3, фиг. 1—2. Верхний триас (свита "С"). Богословское месторождение, Восточный Урал.

1969. Киричкова, с. 291, табл. 5, фиг. 1—2; рис. 3. Верхний триас. Челябинский бассейн.

Thinnfeldia sp.

1911. Томас, с. 26. Юра. Каменка, Донбасс.

1952. Брик, с. 39, табл. 9, фиг. 10. Верхний триас (курашасайская свита). Р. Илек, Актюбинское Приуралье.

1960б. Шведов, с. 79, табл. 1, фиг. 3. Верхний триас (мамонова свита). Центральный Таймыр.

1961. Ковальчук, табл. 57, фиг. 2. Верхний триас (тологойская свита). Кендерлык, Восточный Казахстан.

1963. Василевская, Павлов, табл. 5, фиг. 4, 5. Нижний мел (кюсюрская свита). Лено-Оленекский район.

1963а. Генкина, с. 49, табл. 13, фиг. 3. Средняя юра. Орский бассейн.

Thinnfeldiella Prynada, 1956

Thinnfeldiella reticulata Prynada

1956. Принада в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 224, табл. 39, фиг. 5. Верхний триас. Донбасс.

Tudovakia Schorochova et Krassilov, 1970

Tudovakia papillosa Schorochova et Krassilov

1970. Красилов, Шорохова, с. 110, табл. 16, фиг. 1—7. Верхний триас. Южное Приморье.

Turketia Gomolitzky, 1969

Turketia angustifolia Gomolitzky

1969. Гомолицкий, с. 1532, табл. 1, фиг. 1—3; табл. 2, фиг. 1—4. Средняя юра. Яккабагские горы, Гиссарский хребет.

Validopteris Bertrand, 1932

Validopteris integra (Gothan) Bertrand

1932. Bertrand, с. 103, фиг. 19. Карбон. Франция.

Validopteris (?) angustifolia Sixtel

1962. Сикстель, с. 334, табл. 17, фиг. 5, 6; рис. 22. Триас (мадыгенская свита). Южная Фергана.

ПОРЯДОК CAYTONIALES. КЕЙТОНИЕВЫЕ

Caytonia Thomas, 1925

Caytonia sewardii Thomas

1925. Thomas, с. 315, табл. 12, 13, 15. Средняя юра. Англия.

Caytonia orientale Krassilov

1964. Красилов, с. 114, табл. 16, фиг. 1, 2. Нижния мел. Южное Приморье.

1967. Красилов, с. 137, табл. 31, фиг. 1—4. Там же.

Caytonanthus Harris, 1937

Caytonanthus arberi (Thomas) Harris

1925. Antholithus arberi. Thomas, с. 327, табл. 14, фиг. 33—40; рис. 9,*A*, 10. Средняя юра. Англия.

1937. Caytonanthus arberi. Harris, с. 44, рис. 4, *D—G*. Там же.

Caytonanthus tyrmensis Krassilov

1977. Krassilov, с. 159, табл. 7—13. Верхняя юра — нижний мел. Р. Тырма, бассейн р. Буреи.

Sagenopteris Presl, 1838

Sagenopteris nilssoniana (Brongniart) Ward

1825. Filicites nilssoniana. Brongniart, с. 218, табл. 12, фиг. 1. Юра. Англия.

1900. Sagenopteris nilssoniana. Ward, с. 352.

1953в. Сикстель, с. 126, табл. 2, фиг. 4, *b*; табл. 6, фиг. 2, *a* ; табл. 7, фиг. 6, *d*. Юра. Ягман, Туркмения.

Sagenopteris cf. nilssoniana (Brongniart) Ward

1968. Полевой атлас..., с. 138, табл. 38, фиг. 1—3. Нижняя юра. Р. Омолон.

Sagenopteris angustifolius Chramova

1977. Храмова, с. 54, табл. 18, фиг. 1—6; табл. 19, фиг. 1—5. Верхний триас (сероцветная толща). Бассейн р. Печоры.

Sagenopteris colpodes Harris

1940. Harris, стр. 250, рис. 1, 2, 6, *F—H* в тексте. Средняя юра. Англия.

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 16, табл. 4, фиг. 1—7; табл. 5, фиг. 1—4. Верхняя юра. Грузия.

Sagenopteris heterophylla Doludenko et Svanidze

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 17, табл. 6, фиг. 2—6; табл. 7, фиг. 1—6; табл. 8, фиг. 1—7. Верхняя юра. Грузия.

Sagenopteris ilekensis Brick

1952. Брик, с. 45, табл. 14, фиг. 1—7. Верхний триас. Бассейн р. Илека, Западный Казахстан.

1977. Орловская, с. 116, табл. 3, фиг. 1, 2; рис. 5*а, в*. Верхний триас Бассейн р. Илека, Западный Казахстан.

Sagenopteris kamenkensis Thomas

1911. Томас, с. 10, табл. 1, фиг. 10, 11. Юра. Каменка, Донбасс.

Sagenopteris cf. kamenkensis, Thomas

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 179, табл. 38, фиг. 2, рис. 25 в тексте. Средняя юра. Туаркыр.

Sagenopteris mantellii (Dunker) Schenk

1846. Cyclopteris mantelli. Dunker, стр. 10, табл. 9, фиг. 4, 5. Нижний мел. ФРГ.

1871. Sagenopteris mantelli. Schenk, с. 222, табл. 31, фиг. 5. Там же.

1967. Красилов, с. 138, табл. 31, фиг. 5—10. Нижний мел. Южное Приморье.

Sagenopteris petiolata Oishi

1940. Oishi, с. 360, табл. 37, фиг. 1, 2. Верхняя юра — нижний мел. Япония.

1967. Красилов, с. 139, табл. 31, фиг. 11. Нижний мел. Южное Приморье.

Sagenopteris phillipsii (Brongniart) Presl

1830 (1828а—1838). Glossopteris phillipsi. Brongniart, с. 255, табл. 61, фиг. 5; табл. 63, фиг. 2. Юра. Англия.

1838 (1820—1838). Sagenopteris phillipsi. Presl in Sternberg, с. 69.

1911. Томас, с. 11, табл. 1, фиг. 9. Юра. Каменка, Донбасс.

1925. Моисеев, с. 565. Средняя юра. Крым.

1926. Моисеев, с. 586. Средняя юра. Крым.

1944. Турутанова-Кетова, с. 69, табл. 1, фиг. 3; табл. 4, фиг. 3. Юра. Мангышлак.

1953б. Сикстель, с. 125, табл. 4, фиг. 1, 2, b, 3 b; табл. 6, фиг. 1, *с*, 5. Юра. Ягман, Туркмения.

1957. Станиславский, с. 48, табл. 5, фиг. 6—9. Юра. Донбасс.

1962. Тесленко, с. 126, табл. 17, фиг. 4; рис. 30. Нижняя — средняя юра. Красноярский край.

1966. Просвирякова, с. 84, табл. 11, фиг. 5—7. Средняя юра. Мангышлак.

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 15, табл. 2, фиг. 1—8; табл. 3, фиг. 1—6. Верхняя юра. Грузия.

1970б. Тесленко, с. 140, табл. 30, фиг. 3; табл. 50, фиг. 15. Средняя—верхняя юра. Западно-Сибирская низменность.

1975. Баранова, Киричкова, Зауэр, с. 117, табл. 8, фиг. 15, 16. Средняя юра. Соркудук, северная Эмба. Западный Казахстан.

1976. Долуденко, Орловская, с. 94, табл. 46, фиг. 1—19. Верхняя юра. Чохай, Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Sagenopteris phillipsii (Brongniart) Presl var. cuneata Seward

1900. Seward, с. 162, рис. 25 в тексте. Средняя юра. Англия.

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 178, табл. 38, фиг. 1, 3—7, рис. 74 в тексте. Средняя юра. Туаркыр.

Sagenopteris cf. phillipsii (Brongniart) Presl

1914. Криштофович, с. 104, табл. 5, фиг. 2. Юра. Р. Тырма, Буреинский бассейн.

1967. Делле, с. 87, табл. 11, фиг. 15. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

Sagenopteris ex gr. phillipsii (Brongniart) Presl

1963а. Генкина, с. 44, табл. 21, фиг. 1, 2. Средняя юра. Орский бассейн.

Sagenopteris variabilis Chramova

1977. Храмова, с. 55, табл. 18, фиг. 7; табл. 20, фиг. 1–8. Верхний триас (сероцветная толща). Бассейн р. Печоры.

Sagenopteris sp.

1931. Принада, с. 12. Юра. Зеравшан, Средняя Азия.

1933б. Принада, с. 6, табл. 3, фиг. 4, *а*. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

1963. Самылина, стр. 80, табл. 2, фиг. 1; табл. 10, фиг. 1; рис. 4. Нижний мел. Р. Амга.

1963а. Генкина, с. 46, табл. 20, фиг. 6, 7. Средняя юра. Орский бассейн.

1971. Станиславский, с. 59, рис. 23. Верхний триас. Донбасс.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 175, табл. 6, фиг. 5. Средняя юра. Кугитанг, Средняя Азия. Верхний триас. Шураб, Средняя Азия.

ПОДКЛАСС PHYLLOSPERMIDAE. ФИЛЛОСПЕРМИДЫ.

ПОРЯДОК BENNETTITALES (CYCADEOIDEALES). БЕННЕТТИТОВЫЕ

Anomozamites Schimper, 1870

Anomozamites inconstans (Goeppert) Schimper

1843 (1841–1846). Pterophyllum inconstans. Goeppert, с. 136. Верхний триас. Бавария, ФРГ.

1867. Schenk, с. 171, табл. 37, фиг. 5–9.

1870–1872 (1869–1874). Anomozamites inconstans. Schimper, с. 140.

Anomozamites acutilobus Heer

1876b. Heer, с. 102, табл. 23, фиг. 1, *а*; табл. 24, фиг. 1–3; табл. 25, фиг. 9; табл. 28, фиг. 3, b. Верхняя юра. Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Anomozamites angulatus Heer

1876b. Heer, с. 103, табл. 25, фиг. 1. Верхняя юра. Верховья р. Амура.

1878a, Heer, с. 17, табл. 4, фиг. 3. Нижний мел. Низовья р. Лены.

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 81, табл. 32, фиг. 1–3. Нижний мел. Буреинский бассейн.

1963. Василевская, Павлов, табл. 24, фиг. 1. Нижний мел. Ленский бассейн.

Anomozamites arcticus Vassilevskaja

1963. Василевская, Павлов, табл. 24, фиг. 3; табл. 25, фиг. 2; табл. 35, фиг. 3; табл. 38, фиг. 1, *а*. Нижний мел. Ленский бассейн.

1964б. Самылина, с. 75, табл. 15, фиг. 3. Нижний мел (ожогинская свита). Бассейн р. Колымы.

1970. Абрамова, с. 44, табл. 4, фиг. 9. Нижний мел (джарджанская свита). Жиганский район, Ленский бассейн.

1972. Василевская, в кн. : Новые виды. . . , с. 320, табл. 73, фиг. 5, 6. Верхняя половина нижнего мела (огонер-юряхская, лукумайская, укинская, джарджанская, эксеняхская свиты) . Ленский бассейн.
1975. Филиппова, с. 32, табл. 2, фиг. 5; табл. 4, фиг. 8. Нижний мел. Северо-Восток СССР.
1976. Самылина, с. 49, табл. 20, фиг. 5; табл. 21, фиг. 1—3, *а*. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Anomozamites asiaticus Kiritchkova

1973. Киричкова, в кн.: Новые виды. . . , с. 10, табл. 5, фиг. 1. Нижняя юра (кокалинская свита) . Мангышлак.

Anozamites bifurcatus Burakova

1363. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 187, табл. 46, фиг. 5, 7—9; рис. 79 в тексте. Нижняя юра (пестроцветная свита) . Западный Аманбулак, Туаркыр.

Anozamites dentatus Vassilevskaja

1956. Василевская, с. 30, табл. 2; рис. 3 в тексте. Нижняя юра. Восточная Фергана.
1976. Долуденко, Орловская, с. 60, табл. 21, фиг. 6; рис. 28. Нижняя юра. Акбулак, хребет Каратау, Южный Казахстан.
1976. Иминов, с. 17, табл. 1, фиг. 7—9. Нижняя юра. Сулюкта, Южная Фергана.

Anomozamites dondurmensis Genkina

1970. Алиев, Генкина, с. 22, табл. 6, фиг. 1—3; табл. 7, фиг. 1. Верхний триас, Тянь-Шань.

Anomozamites elegans Orlovskaja

1976. Долуденко, Орловская, с. 60, табл. 22, фиг. 3—8; рис. 29, *а—е*. Нижняя юра. Акбулак, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Anomozamites embensis Kiritchkova

1975. Баранова, Киричкова, Зауер, с. 120, табл. 20, фиг. 1—7. Средняя юра. Сорколь. Северная Эмба, Западный Казахстан.

Anomozamites gracilis Nathorst

1875. Nathorst, с. 383. Верхний триас. Швеция.
1876. Nathorst, стр. 43, табл. 12, фиг. 4—12. Там же.
1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 184, табл. 42, фиг. 2—7. Нижняя юра (пестроцветная свита) . Западный Аманбулак, Туаркыр.
1963б. Генкина, с. 193, табл. 1, фиг. 5. Юра (аксайская свита) . Согутинский район, Иссык-Куль.
1966. Генкина, с. 82, табл. 33, фиг. 6. Нижняя юра. Иссык-Куль.
1971. Сикстель, Савицкая, и др., с. 175, табл. фиг. 2. Нижняя и средняя юра. Кугитанг и Шураб, Средняя Азия.
1976. Иминов, с. 18, табл. 2, фиг. 1, 2. Нижняя юра. Шураб-2, Южная Фергана. Средняя юра (гурудская свита) . Шатут, Айрибаба, Гиссарский хребет.

Anomozamites kirgisicus Genkina

1970. Алиев, Генкина, с. 21, табл. 5, фиг. 1—7. Верхний триас. Тянь-Шань.

Anomozamites kornilovae Orlovskaja

1976. Долуденко, Орловская, с. 57, табл. 19, фиг. 1—8; табл. 20, фиг. 1—8; табл. 21, фиг. 1—5; рис. 26, *а—н*. Средняя юра. Боролдай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Anomozamites lindleyanus Schimper

1870—1872. (1869—1874). Schimper, с. 141.

1878a Heer, с. 5, табл. 2, фиг. 1—4. Юра. Иркутский бассейн.

1961. Ковальчук, табл. 16, фиг. 3. Средняя юра (михайловская свита). Карагандинский бассейн.

1962. Лебедев И.В., с. 196, табл. 1, фиг. 5. Юра. Р. Бунгарап, Кузбасс.

1962. Принада, с. 154, табл. 8, фиг. 4; табл. 9, фиг. 1—4; рис. 26. Юра. Иркутский бассейн.

1962. Тесленко, с. 127, табл. 17, фиг. 5, 6; рис. 31 в тексте. Средняя юра. Чусовитино, бассейн р. Бунгарап, Кузбасс.

1968. Орловская, с. 80, табл. 20, фиг. 7. Верхний триас. Кетмень, Казахстан.

1970б. Тесленко, с. 143, табл. 30, фиг. 4—6; табл. 51, фиг. 1. Нижняя юра (абашевская свита). Кузбасс. Средняя юра (осиновская свита). Бассейн р. Бунгарап, Кузбасс.

1976. Долуденко, Орловская, с. 59, табл. 22, фиг. 1, 2; рис. 27, *а—г*. Нижняя юра. Акбулак, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Anomozamites aff. lindleyanus Schimper

1963а. Генкина, с. 52, табл. 23, фиг. 4—6; табл. 24, фиг. 1. Средняя юра. Восточный Урал.

Anomozamites ex gr. lindleyanus Schimper

1938а. Принада, с. 38, рис. 14, *А* в тексте. Нижний мел. Р. Зырянка, бассейн Р. Колымы.

Anomozamites minor (Brongniart) Nathorst

1825. Pterophyllum minus. Brongniart, с. 218, табл. 12, фиг. 8.

1878a. Anomozamites minor. Nathorst, с. 21. Верхний триас. Швеция.

1878b. Nathorst, с. 11. Там же.

1878c. Nathorst, с. 19, табл. 2, фиг. 12. Верхний триас. Швеция.

1890 (1878--1890). Романовский, с. 135, табл. 17, фиг. 9. Нижняя юра. Сарвадинский бассейн, р. Вору, Узбекистан.

1933а. Криштофович, Принада, с. 13, табл. 1, фиг. 1, *а*. Верхний триас. Армения.

1944. Турутанова-Кетова, с. 73, табл. 2, фиг. 3; табл. 3, фиг. 5. Нижняя — средняя юра. Мангышлак.

1961б. Маркович, табл. 20, фиг. 5. Средняя юра (орская и романкульская свиты). Магнитогорский синклинорий, Южный Урал.

1961. Романова, с. 114, табл. 2, фиг. 2. Нижняя юра. Хребет Каратау, Боролдайское месторождение, Южный Казахстан.

1963а. Генкина, с. 53, табл. 24, фиг. 2—4. Средняя юра. Восточный Урал.

1963б. Генкина, с. 192, табл. 1, фиг. 1—4. Юра (аксайская свита). Согутинский район, Иссык-Куль.

1966. Генкина, с. 81, табл. 33, фиг. 1—5. Нижняя юра. Иссык-Куль.
1966. Просвирякова, с. 86, табл. 12, фиг. 1—10. Средняя юра. Мангышлак.
1971. Маркович, с. 80, табл. 5, фиг. 3—5. Средняя юра (орская свита). Орский бассейн.
1971. Худайбердыев, Гомолицкий, Лобанова, с. 15, табл. 2, фиг. 4. Нижняя — средняя юра. Сулюкта, Южная Фергана.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 176, табл. 7, фиг. 1. Нижняя — средняя юра. Шураб, Южная Фергана.
1976. Иминов, с. 18, табл. 2, фиг. 3—9. Средняя юра (согульская свита). Шураб-2, Южная Фергана. Средняя юра (гурудская свита). Байсун, Гиссарский хребет. Средняя юра. Ленгер, Южный Казахстан.

Anomozamites minor Nathorst var. hirsuta Burakova

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 185, табл. 43, фиг. 1—3. Нижняя — средняя юра. Восточный и Западный Аманбулак, Туаркыр.

Anomozamites cf. minor Nathorst

1961. Ковальчук, табл. 10, фиг. 4. Нижняя юра (дубовская свита). Карагандинский бассейн.
1971. Станиславский, с. 64, рис. 28. Верхний триас. Донбасс.

Anomozamites ex gr. minor Nathorst

1971. Станиславский, с. 65, табл. 23, фиг. 7—12; рис. 29-32. Верхний триас. Донбасс.

Anomozamites nevzorovae Burakova

1966. Буракова, с. 142, табл. 9, фиг. 23, 24. Средняя юра (нижняя угленосная толща). Туаркыр.

Anomozamites nilssonii (Phillips) Seward

1829. Aspleniopteris nilssonii,. Phillips, с. 147, табл. 8, фиг. 4. Средняя юра. Йоркшир, Англия.
1900. Anomozamites nilssonii, Seward, с. 204, рис. 36 в тексте. Там же.
1975. Баранова, Киричкова, Зауер, с. 120, табл. 14, фиг. 1—10; табл. 15, фиг. 1—6; табл. 16, фиг. 1—6; табл. 17, фиг. 1—10; табл. 18, фиг. 1, 2; табл. 21, фиг. 3—6. Средняя юра. Северная Эмба, Западный Казахстан.

Anomozamites cf. nilssonii (Phillips) Seward

1952. Сикстель, с. 29, табл. 6, фиг. 6, 7; рис. 10 в тексте. Нижняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.

Anomozamites polanskyi Iminov

1971. Иминов, с. 8, табл. 1, фиг. 1—3; рис. 1 в тексте. Нижняя юра. Северный Дарваз, Средняя Азия.
1976. Иминов, с. 19, табл. 2, фиг. 10, 11. Нижняя юра (зюрюзаминская свита). Северный Дарваз, Средняя Азия.

Anomozamites pterophylloides Kiritchkova

1975. Баранова, Киричкова, Зауер с. 122, табл. 18, фиг. 3—7; табл. 19, фиг. 1—9. Средняя юра. Шубаржилан, Чингиз, Северная Эмба. Западный Казахстан.

Anomozamites quadratus Prosvirjakova

1966. Просвирякова, с. 87, табл. 13, фиг. 1—3. Средняя юра. Мангышлак.

Anomozamites schmidtii Heer

1876b. Heer, с. 100, табл. 23, фиг. 2, 3; табл. 24, фиг. 4—7. Верхняя юра. Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Anomozamites turkestanicus Burakova

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 186, табл. 43, фиг. 4, 5; табл. 44, фиг. 1—4; табл. 45, фиг. 1—4; рис. 78 в тексте. Нижняя юра (пестроцветная свита). Западный Аманбулак, Туаркыр.

1971. Сикстель, Савицкая, и др., с. 176, табл. 7, фиг. 3, 4. Нижняя юра. Шураб, Южная Фергана.

1976. Иминов, с. 19, табл. 3, фиг. 1—3. Нижняя юра (нижняя согульская подсвита). Шураб, Южная Фергана.

Anomozamites varians Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 121, табл. 70 табл. 71; табл. 72, фиг. 1, 2; табл. 74, фиг. 8; рис. 50. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка, Донбасс.

Anomozamites sp.

1934. Принада, с. 31, рис. 4 в тексте. Верхний триас? Р. Кокуйбельсу, Памир.

1936a. Турутанова-Кетова, с. 104, табл. 2, фиг. 14. Нижняя юра. Чокпак, Южный Казахстан.

1938a. Принада, с. 39, табл. 4, фиг. 3; рис. 15 в тексте. Нижний мел. Р. Зырянка, бассейн р. Колымы.

1958. Вахрамеев, с. 104, табл. 30, фиг. 1; табл. 32, фиг. 3. Нижний мел. Вилюйская впадина.

1962. Принада, с. 155, рис. 27, *А*. Верхняя юра — нижний мел. Восточное Забайкалье.

1964б. Самылина, с. 75, табл. 15, фиг. 4, 5; рис. 9, *б*. Нижний мел (буоркемюсская свита). Бассейн р. Колымы.

1971. Станиславский, с. 70, рис. 33. Верхний триас. Донбасс.

1971. Станиславский, с. 71, табл. 16, фиг. 3. Верхний триас. Донбасс.

1976. Долуденко, Орловская, с. 102, табл. 61, фиг. 1—4. Верхняя юра (боролсайская свита). Чохай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Bureja Prynada, 1956

Bureja rigida Prynada

1956. Принада в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 237, табл. 42, фиг. 6. Верхняя юра. Буреинский бассейн.

1959. Вахрамеев, с. 999, табл. 2, фиг. 3—5. Нижний мел. Оз. Ханка, Южное Приморье. Нижний мел (батылыхская свита). Р. Леписка, Западное Приверхоянье.

Cloughtonia Halle, 1911

Род является синонимом Cycadolepis Saporta, 1875 (Harris, 1953b)

Cloughtonia rugosa Halle

1911. Halle, с. 2, табл. 1, 2. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

1961. Сванидзе, с. 49, табл.1, фиг. 3—9; табл. 2, фиг. 3—6; табл. 3 фиг. 1—7. Средняя юра. Ткибули, Грузия.

Cycadeoidea Buckland, 1828

Cycadeoidea megaphylla Buckland

1828. Buckland, с. 397, табл. 47, 48. Средняя юра. Англия.

Cycadeoidea sp.

1911. Томас. с. 36, табл. 5, фиг. 10. Средняя юра. Каменка, Донбасс.

Cycadolepis Saporta, 1875

Cycadolepis villosa Saporta

1873 (1873–1875). Saporta, с. 201, табл. 114, фиг. 4. Верхняя юра. Франция.

Cycadolepis cf. villosa Saporta

1957. Станиславский, стр. 68, табл. 11, фиг. 6–12. Средняя юра. Донбасс.

Cycadolepis corrugata Zeiller

1903. Zeiller, с. 200, табл. 50, фиг. 1–4; табл. 44, фиг. 1. Верхний триас. Вьетнам.

1952. Сикстель, с. 28, табл. 14, фиг. 1, *в*. Нижняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 183, табл. 20, фиг. 17. Нижняя юра. Гиссарский хребет.

1976. Иминов, с. 32, табл. 29, фиг. 4. Нижняя юра (нижняя часть гурудской свиты). Кугитанг, Гиссарский хребет.

Cycadolepis fimbriata Lebedev

1962. Лебедев И.В., с. 197, табл. 1, фиг. 6, 7. Юра. Р. Томь, Кузбасс.

Cycadolepis ovalis Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 69, табл. 77, фиг. 1–8; табл. 60, фиг. 1. Верхняя юра. Грузия.

Cycadolepis pterophylloides Krassilov

1967. Красилов, с. 161, табл. 49, фиг. 1–6; рис. 20, *в–д*. Нижний мел (липовецкая свита). Южное Приморье.

Cycadolepis rugosa (Halle) Harris

1911. Cloughtonia rugosa. Halle, с. 2, табл. 1, фиг. 1–7; табл. 2, фиг. 1–5. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

1953b. Cycadolepis rugosa. Harris, с. 39, рис. 3, *F*. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

1967. Делле, с. 89, табл. 17, фиг. 2–6. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 70, табл. 78, фиг. 3, 5. Верхняя юра. Грузия

Cycadolepis sixtelae Vachrameev

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 100, табл. 42, фиг. 4; табл. 46, фиг. 1–4; рис. 29. Нижний мел. Буреинский бассейн.

Cycadolepis tschikrizovii Iminov

1976. Иминов, с. 32, табл. 29, фиг. 5, 6. Средняя юра (байсунская свита). Ташкутан, Гиссарский хребет.

Cycadolepis sp.

1967. Красилов, с. 162, табл. 48, фиг. 2, 3. Нижний мел (липовецкая свита). Южное Приморье.

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 70, табл. 78, фиг. 1, 2, 4, 6, 7. Верхняя юра. Грузия.
1971. Станиславский, с. 79, табл. 21, фиг. 6–8. Верхний триас. Донбасс.
1971. Станиславский, с. 79, табл. 22, фиг. 2, 3. Верхний триас. Донбасс.
1971. Станиславский, с. 80, табл. 34, фиг. 5. Верхний триас. Донбасс.
1971. Станиславский, с. 80, рис. 38. Верхний триас. Донбасс.

Dictyozamites (Oldham) Medlicott et Blanford, 1879

Dictyozamites falcatus (Morris) Medlicott et Blanford

1863. Dictyopteris falcata. Morris in Oldham and Morris, с. 38, табл. 24, фиг. 1, 1, *a*. Юра. Раджмахал, Индия.
1879. Dictyozamites falcatus. Medlicott, Blanford, с. 142, табл. 8, фиг. 6. Юра. Индия.
1967. Красилов, с. 154, табл. 42, фиг. 2–5. Нижний мел. Приморье.

Dictyozamites cordatus (Kryshtofovich) Prynada

1929. Proteaephyllum cordatum. Криштофович, с. 125, табл. 59, фиг. 5. Нижний мел. Южное Приморье.
1963. Dictyozamites cordatus. Основы палеонтологии. Голосеменные и покрытосеменные, с. 136, табл. 3, фиг. 2. Там же.
1967. Красилов, с. 155, табл. 42, фиг. 1; табл. 43, фиг. 1. Там же.
1970. Вахрамеев, с. 121, рис. 1, 2. Нижний мел (батылыхская свита). Р. Эйгес, Западное Приверхоянье.

Dictyozamites grossinervis Yokoyama

1889. Yokoyama, с. 55, табл. 7, фиг. 10. Нижний мел. Япония.
1967. Красилов, с. 153, табл. 40, фиг. 2–4; табл. 41, фиг. 1–5; рис. 19, *А*. Нижний мел. Приморье.

Dictyozamites kawasakii Tateiwa

1929. Tateiwa, фиг. 6, *a, b*. Нижний мел? Корейский полуостров.
1967. Красилов, с. 154, табл. 43, фиг. 2–3. Нижний мел (ключевская свита). Южное Приморье.

Dictyozamites obliquus Samylina

1964а. Самылина, с. 1287, табл. 1, фиг. 10, 11. Нижний мел. Р. Бикин, Сихотэ-Алинь.

Jacutiella Samylina, 1956

Jacutiella amurensis (Novopokrovsky) Samylina

1912. Taeniopteris amurensis. Новопокровский, с. 6, табл. 1, фиг. 4; табл. 2, фиг. 5. Нижний мел. Р. Тырма, бассейн р. Амура.
1956а. Jacutiella amurensis. Самылина, с. 1336, табл. 1, фиг. 2–5. Нижний мел. Бассейн р. Алдана.
1959б. Василевская, с. 58, табл. 7, фиг. 1–4. Нижний мел (чонгургасская свита). Сангарский район, Ленский бассейн.
1963. Василевская, Павлов, табл. 12, фиг. 1–4. Нижний мел. Ленский бассейн.
1963. Самылина, с. 88, табл. 20, фиг. 1–7. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

1976. Самылина, с. 50, табл. 19, фиг. 4–7. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Jacutiella dentata Burakova

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 180, табл. 41, фиг. 1–4; рис. 76. Средняя юра. Таур, Туаркыр.

Jacutiella mongugaica Srebrodolskaja

1960. Сребродольская, стр. 109, табл. 1, фиг. 8, 10. Верхний триас (нижняя монгугайская свита). Южное Приморье.

Kryshtofovichiana Tschastnikova, 1952

Kryshtofovichiana dentata Tschastnikova

1952. Частникова, с. 4, фиг. 1. Юра. Алайская долина, Южная Фергана.

Kryshtofovichiana vittaeformis Tschastnikova

1952. Частникова, с. 5, фиг. 2. Юра. Алайская долина. Южная Фергана.

Leptopterophyllum Thomas, 1930

Leptopterophyllum nathorstii (Seward) Thomas

1900. Dioonites nathorsti. Seward, с. 239. Средняя юра. Англия.

1930. Leptopterophylium nathorsti. Thomas, с. 393, табл. 20, фиг. 1; табл. 21. Там же.

Leptopterophyllum pterophylloides (Prynada) Krassilov

1912. Dioonites sp. Новопокровский, с. 10, табл. 3, фиг. 5. Нижний мел. Бурейнский бассейн.

1956. Tyrmia pterophylloides. Принада в кн. Материалы по палеонтологии, с. 242. Там же.

1967. Leptopterophyllum pterophylloides. Красилов, с. 158, табл. 44, фиг. 4–5. Нижний мел. Приморье.

Leuthardtia Krausel et Schaarschmidt, 1966

Leuthardtia ovalis Krausel et Schaarschmidt

1966. Krausel und Schaarschmidt, с. 26, табл. 8. Верхний триас. Швейцария.

Leuthardtia crassa Mogutcheva

1973. Могучева, с. 86, табл. 38, фиг. 5–8. Нижний триас. Тунгусский бассейн.

Neozamites Vakhrameev, 1962

Neozamites verchojanensis Vachrameev

1962. Вахрамеев, с. 124, табл. 12, фиг. 1–5. Нижний мел. Ленский бассейн.

1966. Василевская, с. 58, табл. 3, фиг. 1, 2. Нижний мел. Жиганский район, Ленский бассейн.

1970. Абрамова, с. 42, табл. 3, фиг. 2–6. Нижний мел (бахская свита). Жиганский район, Ленский бассейн.

1976. Самылина, с. 50, табл. 24, фиг. 5–8. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Neozamites denticulatus (Kryshtofovich et Prynada) Vachrameev

1932. Otozamites denticulatus. Криштофович, Принада, с. 369. Нижний мел. Приморье.

1962. Neozamites denticulatus. Вахрамеев, с. 125. Там же.

1967. Красилов, с. 151, табл. 40, фиг. 1. Там же.

Neozamites lebedevii Vachrameev

1962. Вахрамеев, с. 125, табл. 13, фиг. 1–3, 5–8. Нижний мел Якутия.

Neozamites (?) sp.

1970. Абрамова, с. 43, табл. 3, фиг. 7. Нижний мел (джарджанская свита). Жиганский район, Ленский бассейн.

Nilssoniopteris Nathorst, 1909

Nilssoniopteris tenuinervis Nathorst

1909. Nathorst, с. 29, табл. 6, фиг. 23–25; табл. 7, фиг. 21. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

Nilssoniopteris amurensis (Novopokrovsky) Krassilov

1912. Taeniopteris amurensis. Новопокровский, с. 6, табл. 1, фиг. 4; табл. 2, фиг. 5. Нижний мел. Р. Тырма, бассейн р. Амура.

1973. Nilssoniopteris amurensis. Красилов, с. 44, табл. 12, фиг. 1–7; табл. 14, фиг. 1–7. Нижний мел. Буреинский бассейн.

Nilssoniopteris angrenica Gomolitzky

1974. Гомолицкий, с. 1200, табл. 1, фиг. 1–4. Средняя юра (ангренская свита). Ангрен, Узбекистан.

Nilssoniopteris angustifolia Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 40, табл. 37, фиг. 1–11; табл. 38, фиг. 1–7. Верхняя юра. Грузия.

Nilssoniopteris boroldaica Orlovskaja

1976. Долуденко, Орловская, с. 53, табл. 16, фиг. 2–7; табл. 17, фиг. 1–3; рис. 23,*а–к*. Средняя юра. Боролдай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Nilssoniopteris (Sibiriophyllum) californicum (Fontaine) Samylina

1900. Macrotaeniopteris californica. Fontaine in Ward, с. 349, табл. 53, фиг. 1; табл. 54, фиг. 1, 2. Юра. США.

1963. Nilssoniopteris (Sibiriophyllum) californicum. Самылина, с. 90, табл. 13, фиг. 2, 3; табл. 17, фиг. 1–3; табл. 18, фиг. 4–7. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

Nilssoniopteris densinervis (Feistmantel) Markovitch

1876b. Taeniopteris densinervis. Feistmantel, с. 19, табл. 2, фиг. 6. Юра Кач, Индия.

1971. Маркович, с. 81, табл. 5, фиг. 6, 7; табл. 6, фиг. 1–4. Средняя юра (орская свита). Орский бассейн.

Nilssoniopteris karataviensis Orlovskaja

1976. Долуденко, Орловская, с. 54, табл. 16, фиг. 1; табл. 17, фиг. 4; табл. 18, фиг. 1–4; рис. 24,*а–ж*. Нижняя юра. Куркурсу, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Nilssoniopteris latifolium Kiritchkova

1973. Киричкова, в кн.: Новые виды. . ., с. 10, табл. 5, фиг. 2. Нижняя юра (кокалинская свита). Мангышлак.

Nilssoniopteris linearis Kiritchkova

1973. Киричкова, в кн.: Новые виды. . ., с. 11, табл. 4, фиг. 2. Нижняя юра (кокалинская свита). Мангышлак.

Nilssoniopteris longifolia Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 42, табл. 39, фиг. 1–6. Верхняя юра. Грузия.

Nilssoniopteris muchlensis Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 43, табл. 40, фиг. 1–8; табл. 41, фиг. 1–5. Верхняя юра. Грузия.

Nilssoniopteris ovalis Samylina

1963. Самылина, с. 89, табл. 19, фиг. 5; рис. 8. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

1959б. Василевская, с. 59, табл. 7, фиг. 5; табл. 8, фиг. 1, 2. Нижний мел (чонгургасская свита). Сангарский район, бассейн р. Лены.

1963. Василевская, Павлов, табл. 8, фиг. 1, 2. Нижний мел. Ленский бассейн.

1966. Василевская, Абрамова, с. 76, табл. 2, фиг. 1–4. Нижний мел. Ленский бассейн.

Nilssoniopteris aff. ovalis Samylina

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 82, табл. 33, фиг. 1–4; табл. 34, фиг. 1–5. Нижний мел. Буреинский бассейн.

Nilssoniopteris papillifera Kiritchkova

1973. Киричкова, в кн.: Новые виды. . ., с. 12, табл. 4, фиг. 1. Нижняя юра (кокалинская свита). Мангышлак.

Nilssoniopteris polymorpha Sveshnikova et Budantsev

1969. Свешникова, Буданцев, с. 59, табл. 11, фиг. 2–13; табл. 12, фиг. 2–7; табл. 13, фиг. 1; табл. 15, фиг. 12а,б; рис. 10. Нижний мел. О-в Солсбери, Земля Франца-Иосифа.

Nilssoniopteris prynadae Samylina

1964б. Самылина, с. 75, табл. 16, фиг. 8; табл. 18, фиг. 4–10. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Бассейн р. Колымы.

Nilssoniopteris rhitidorachis (Kryshtofovich) Krassilov

1932. Taeniopteris rhitidorachis. Криштофович, Принада, с. 368. Нижний мел. Приморье.

1967. Nilssoniopteris rhitidorachis. Красилов, с. 139, табл. 32, фиг. 1–4; табл. 33, фиг. 1–4; рис. 18,*а,г*. Там же.

Nilssoniopteris ex gr. rhitidorachis (Kryshtofovich) Krassilov

1976. Иминов, с. 20, табл. 4, фиг. 1–3. Средняя юра (согульская свита). Шураб-2, Южная Фергана.

Nilssoniopteris robusta (Kryshtofovich et Prynada) Krassilov

1932. Nilssonia robusta. Криштофович, Принада, с. 370. Нижний мел. Приморье.

1967. Nilssoniopteris robusta. Красилов, с. 142, табл. 33, фиг. 5; табл. 34, фиг. 1–4; рис. 18,б–в. Там же.

Nilssoniopteris stenophylla Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 44, табл. 42, фиг. 1–6. Верхняя юра. Грузия.

Nilssoniopteris taeniata Samylina

1961. Самылина, с. 634, табл. 1, фиг. 1–6; табл. 2, фиг. 1. Нижний мел. Бассейн р. Раздольной. Южное Приморье.

Nilssoniopteris uarensis Iminov et Loseva

1972. Иминов, Лосева, в кн.: Новые виды. . . , с. 319, табл. 73, фиг. 7, 8. Средняя юра. Гиссарский хребет.

1976. Иминов, с. 19, табл. 3, фиг. 4–7. Средняя юра. Яккабагские горы, юго-западные отроги Гиссарского хребта.

Nilssoniopteris vittata (Brongniart) Florin

1828b. Taeniopteris vittata. Brongniart, с. 62. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

1831 (1828a–1838). Brongniart, с. 263, табл. 82, фиг. 1–4. Там же.

1933. Nilssoniopteris vittata. Florin, с. 4, 15. Там же.

1968. Орловская, с. 76, табл. 4, фиг. 1–4. Средняя юра (шоптыкольская свита). Майкюбень, Казахстан.

Nilssoniopteris aff. vittata (Brongniart) Florin

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 45, табл. 43, фиг. 1–7. Верхняя юра. Грузия.

1976. Долуденко, Орловская, с. 52, табл. 14, фиг. 1–6; табл. 15, фиг. 1–7; рис. 22,*а–г*. Средняя юра. Боролдай, Таскомырсай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Nilssoniopteris vulgaris Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 46, табл. 44, фиг. 1–10; табл. 45, фиг. 1–5; табл. 46, фиг. 1–6. Верхняя юра. Грузия.

Nilssoniopteris sp.

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 83, табл. 35, фиг. 1–6. Верхняя юра. Буреинский бассейн.

Otozamites Braun in Münster, 1843

Otozamites obtusus (Lindley et Hutton) Brongniart

1834 (1831–1837). Otopteris obtusa. Lindley, Hutton, с. 129, табл. 128. Юра. Англия.

1849. Otozamites obtusus. Brongniart, с. 104. Там же.
1933а. Криштофович, Принада, с. 15, табл. 2, фиг. 2; табл. 3, фиг. 2,а. Верхний триас. Армения.
1968а. Иминов, с. 100, табл. 35, фиг. 7—10. Верхний триас. Памир. Нижняя юра. Гиссарский хребет.

Otozamites cf. obtusus (Lindley et Hutton) Brongniart

1957. Станиславский, с. 54, табл. 9, фиг. 6. Средняя юра. Днепровско-Донецкая впадина.

Otozamites cf. obtusus (Lindley et Hutton) var. ooliticus Seward

1907. Сьюорд, с. 12, табл. 1, фиг. 13. Юра. Кавказ.

Otozamites abbreviatus Feistmantel

1876а. Feistmantel, с. 37. Юра. Индия.
1879. Feistmantel, с. 21, табл. 7, фиг. 9; табл. 8, фиг. 6, 7; табл. 9, фиг. 3, 12. Там же.
1934. Принада, с. 54, табл. 11, фиг. 2. Верхний триас? Перевал Ходжи-Джайляу, Памир.

Otozamites asiaticus Genkina

1970. Алиев, Генкина, с. 25, табл. 8, фиг. 1, 2. Нижняя юра. Тянь-Шань.

Otozamites cf. beanii (Lindley et Hutton) Brongniart

1976. Долуденко, Орловская, с. 99, табл. 58, фиг. 1—3. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Otozamites bengalensis Oldham et Morris

1976. Иминов, с. 22, табл. 4, фиг. 4—9. Средняя юра. Ташкутан, Гиссарский хребет.

Otozamites cingulatus (Burakova) Kiritchkova

1966. Tyrmia (?) cingulata. Буракова, с. 140, табл. 9, фиг. 1—22. Средняя юра (нижняя угленосная толща). Туаркыр.
1974. Otozamites cingulatus. Киричкова, с. 126, рис. 1,3—5. Средняя юра (тонашинская свита). Мангышлак.

Otozamites giganteus Thomas

1911. Томас, с. 38, табл. 6, фиг. 1, 2. Средняя юра. Каменка, Донбасс.
1957. Станиславский, с. 53, табл. 9, фиг. 8, 9. Там же.
1976. Долуденко, Орловская, с. 99, табл. 56, фиг. 1, 2; табл. 57, фиг. 1—4. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Otozamites gissaricus Iminov

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 176, табл. 9, фиг. 4—7. Нижняя юра. Кугитанг, Средняя Азия.
1976. Иминов, с. 20, табл. 5, фиг. 1—4. Средняя юра (гурудская свита). Мачайли, Гиссарский хребет.

Otozamites graphicus (Leckenby) Schimper

1864. Otopteris graphica. Leckenby, с. 78, табл. 8, фиг. 5. Средняя юра. Скарборо, Англия.

1870 (1869–1874). Otozamites graphicus. Schimper, с. 170. Там же.
1967. Делле, с. 89, табл. 15, фиг. 1–6. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.
1969. Долуденко, Сванидзе, с. 46, табл. 47, фиг. 1–7; табл. 48, фиг. 1–3. Верхняя юра. Грузия.

Otozamites cf. graphicus (Leckenby) Phillips

1976. Иминов, с. 22, табл. 5, фиг. 5–7; табл. 7, фиг. 1–6; табл. 8, фиг. 3. Средняя юра. Гулиоб, Ташкутан, Гиссарский хребет. Верхний триас. Р. Ванч, Памир.

Otozamites hislopii (Oldham) Feistmantel

1877a. Otozamites hislopi. Feistmantel, с. 12, табл. 6, фиг. 3, 4; табл. 11, фиг. 1. Юра. Джабалпур, Индия.
1930. Турутанова-Кетова, с. 146, табл. 3, рис. 20, 21, 24. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Otozamites imbricatus Feistmantel

1976. Иминов, с. 23, табл. 5, фиг. 8. Средняя юра. Бештахта, Гиссарский хребет.

Otozamites iziumensis Thomas

1911. Томас, с. 37, табл. 5, фиг. 11. Средняя юра. Изюм, Донбасс.
1957. Станиславский, с. 53, табл. 9, фиг. 5. Средняя юра. Донбасс.
1976. Иминов, стр. 23, табл. 6, фиг. 1. Средняя юра (верхняя согульская подсвита). Шураб-2, Южная Фергана.

Otozamites jarmolenkoi Vachrameev

1948. Вахрамеев, с. 13, рис. 9 в тексте. Нижний мел. Р. Кульденен-Темир, Западный Казахстан.
1952. Вахрамеев, с. 168, табл. 9, фиг. 1; рис. 29 в тексте. Нижний мел (верхний альб). Р. Кульденен-Темир, Западный Казахстан.

Otozamites kirgisicus Genkina

1970. Алиев, Генкина, с. 23, табл. 7, фиг. 6, 9. Нижняя юра. Тянь-Шань.

Otozamites klipsteinii (Dunker) Seward

1846. Cyclopteris klipsteinii. Dunker, с. 11, табл. 9, фиг. 6, 7. Нижний мел. Западная Европа.
1895. Otozamites klipsteinii. Seward, с. 60, табл. 1, фиг. 3, 4; табл. 7. Там же.
1967. Красилов, с. 150, табл. 39, фиг. 1–3. Нижний мел. Приморье.

Otozamites latior Saporta

1875 (1873–1875). Saporta, с. 130, табл. 27, фиг. 1–6; табл. 28, фиг. 1–3. Верхний триас. Франция.
1930. Турутанова-Кетова, с. 148, табл. 4, рис. 26, 27, 27,*а*. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1976. Долуденко, Орловская, с. 98, табл. 53, фиг. 1,*б, в, г*, 2; табл. 54, фиг. 1–3. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Otozamites nalivkinii Prynada

1934. Принада, с. 52, табл. 5–6, фиг. 6,*б*, 8. Верхний триас? Р. Бартанг, Памир.

1976. Иминов, с. 20, табл. 6, фиг. 2–5. Верхний триас. Реки Бартанг, Нунбиста, Сарезское озеро, Памир.

Otozamites pamiricus Prynada

1934. Принада, с. 50, табл. 1, фиг. 4. Верхний триас. Р. Танымас, Памир.

1976. Иминов, с. 21, табл. 7, фиг. 7–10; табл. 8, фиг. 1, 2. Нижняя юра (нижняя часть санджарской свиты). Ташкутан, Гиссарский хребет. Верхний триас. Памир.

Otozamites sphenozamioides Turutanova-Ketova

1930. Турутанова-Кетова, с. 149, табл. 5, фиг. 31–34. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Otozamites turkestanicus Turutanova-Ketova

1930. Турутанова-Кетова, с. 150, табл. 2, фиг. 18; табл. 5, фиг. 35. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1936б. Турутанова-Кетова, с. 185, табл. 1; табл. 2. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1976. Долуденко, Орловская, с. 98, табл. 55, фиг. 1–4. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Otozamites sp.

1912. Криштофович, с. 493, табл. 1, фиг. 5, 5*а*. Нижняя юра. Восточный склон Урала.

1941. Брик, с. 29, табл. 8, фиг. 1. Верхний триас (нижняя свита). Камыш-Баши, Южная Фергана.

1957. Станиславский, с. 55, табл. 9, фиг. 7; рис. 19. Средняя юра. Донбасс.

1967. Красилов, с. 150, табл. 44, фиг. 1–3; рис. 19, *г–д*. Нижний мел. Приморье.

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 47, табл. 48, фиг. 4, 5. Верхняя юра. Грузия.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 177, табл. 9, фиг. 8–11. Нижняя и средняя юра. Шураб, Южная Фергана.

Otozamites? sp.

1961. Ковальчук, табл. 16, фиг. 4. Средняя юра (михайловская свита). Карагандинский бассейн.

1963. Василевская, Павлов, табл. 25, фиг. 1. Нижний мел. Ленский бассейн.

Pseudocycas Nathorst, 1907

Pseudocycas insignis Nathorst

1907. Nathorst, с. 4, табл. 1, фиг. 1–5; табл. 2, фиг. 1–9; табл. 3, фиг. 1. Нижняя юра. Швеция.

Pseudocycas baranovae Kiritchkova

1975. Баранова, Киричкова, Зауер, с. 122, табл. 21, фиг. 1, 2; табл. 22, фиг. 1–6. Средняя юра. Северная Эмба, Западный Казахстан.

Pseudocycas cessiensis Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 47, табл. 44. фиг. 1–4; табл. 50, фиг. 1–6. Верхняя юра. Грузия.

Pseudocycas colchica Prynada

1934. Криштофович. Принада, с. 68, Нижняя юра. Абхазия.

1961. Сванидзе, с. 47, табл. 1, фиг. 1, 2, 10, 11; табл. 2, фиг. 1, 2; рис. 1. Средняя юра. Ткибули, Грузия.

Pseudocycas dubius Turutanova-Ketova

1936б. Турутанова-Кетова, с. 192, табл. 3, фиг. 3. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pseudocycas polynovii (Novopokrovsky) Krassilov

1912. Dioonites polynovi. Новопокровский, с. 9, табл. 3, фиг. 6. Нижий мел. Буреинский бассейн.

1969. Pseudocycas polynovii. Красилов, с. 109, табл. 13, фиг. 6, 7; табл. 14, фиг. 1–7. Там же.

Pseudocycas saighanensis Jacob et Shukla

1955. Jacob, Shukla, с. 30, табл. 10, фиг. 82, 83, 85. Средняя юра. Северный Афганистан.

Pseudocycas cf. saighanensis Jacob et Shukla

1967. Делле, с. 92, табл. 17, фиг. 1. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

1975. Баранова, Киричкова, Зауер, с. 123, табл. 23, фиг. 1–4; табл. 24, фиг. 1–4. Средняя юра. Северная Эмба, Западный Казахстан.

Pterophyllum Brongniart, 1828

Pterophyllum longifolium Brongniart

1822 (1822–1823). Algacites filicoides. Schlotheim, табл. 4, фиг. 2. Верхний триас. Швейцария.

1828. Pterophyllum longifolium. Brongniart, с. 95. Там же.

Pterophyllum abdullaevii Iminov

1976. Иминов, с. 30, табл. 20, фиг. 5–12. Нижняя юра (санджарская свита). Мачайли, юго-западные отроги Гиссарского хребта.

Pterophyllum aequale (Brongniart) Nathorst

1825. Nilssonia aequalis Brongniart, с. 219, табл. 12, фиг. 6. Нижняя юра. Швеция.

1878b. Pterophyllum aequale. Nathorst, с. 18, табл. 2, фиг. 13. Там же.

1912. Новопокровский, с. 8, табл. 3, фиг. 3. Нижний мел. Р. Тырма, Буреинский бассейн.

1934. Принада, с. 33, табл. 2, фиг. 1; рис. 5,*а,б* в тексте. Верхний триас? Р. Кокуйбельсу, Памир.

1971. Станиславский, с. 73, табл. 19, фиг. 4; табл. 20, фиг. 1–7; рис. 35. Верхний триас. Донбасс.

1976. Иминов, с. 26, табл. 8, фиг. 11–13. Верхний триас. Реки Акджилга, Каинды, Кокуйбельсу, оз. Яшилкуль, Памир.

Pterophyllum andraeanum Schimper

1870 (1869–1874). Schimper, с. 135. Верхний триас. Банат, Румыния.

1922. Johansson, с. 33, табл. 5, фиг. 15–17; табл. 8, фиг. 22, 23. Верхний триас. Швеция.

1926. Криштофович, с. 601, табл. 12, фиг. 1в, 3. Нижняя юра. Р. Фиаг-дон, Северный Кавказ.
1934. Принада, с. 38, табл. 3, фиг. 4; табл. 5–6, фиг. 5, 10. Верхний триас? Реки Кокуйбельсу, Танымас, Памир.
1944. Турутанова-Кетова, с. 73, табл. 2, фиг. 4; табл. 4, фиг. 6. Нижняя – средняя юра. Мангышлак.
1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 190, табл. 48, фиг. 1, 3. Нижняя юра (пестроцветная свита). Туаркыр.
1971. Маркович, с. 83, табл. 6, фиг. 6; табл. 7, фиг. 1–2. Средняя юра (орская свита). Орский бассейн.
1976. Иминов, с. 24, табл. 9, фиг. 1–3. Нижняя юра. Сулюкта, Шураб-2, Южная Фергана.

Pterophyllum cf. andraeanum Schimper

1961. Просвирякова, с. 156, табл. 9, фиг. 2. Средняя юра (юхтинская свита). Р. Чульман, Южная Якутия.
1962. Сикстель, табл. 1, фиг. 2. Верхний триас (истыкская свита). Р. Танымас, Памир.
1966. Просвирякова, с. 89, табл. 15, фиг. 1. Средняя юра. Мангышлак.

Pterophyllum angrenica Gomolitzky

1074. Гомолицкий, с. 1201, табл. 1, фиг. 5–8. Средняя юра (ангренская свита). Ангрен, Узбекистан.

Pterophyllum angustilobum Prynada

1934. Принада, с. 44, табл. 2, фиг. 5; табл. 4, фиг. 4, 5. Верхний триас? Р. Танымас, Памир.

Pterophyllum angustum (Braun) Gothan

1843. Ctenis angusta. Braun in Münster, с. 39, табл. 11, фиг. 1, 3. Верхний триас. ФРГ.
1914. Pterophyllum angustum, Gothan, с. 46, табл. 26, фиг. 3. Там же.

Pterophyllum cf. angustum (Braun) Gothan

1933а. Криштофович, Принада, с. 14, табл. 2, фиг. 5. Верхний триас. Армения.

Pterophyllum bavieri Zeiller

1903. Zeiller, с. 198, табл. 49, фиг. 1–3. Верхний триас. Вьетнам.
1934. Принада, с. 35, табл. 3, фиг. 3. Верхний триас? Р. Танымас, Памир.

Pterophyllum bloedeanum Eichwald

1865 (1860–1868). Eichwald, с. 37, табл. 3, фиг. 5. Юра. Донбасс.

Pterophyllum braunianum Goeppert

1844. Goeppert, с. 134. Верхний триас. Франкония, ФРГ.
1867. Schenk, с. 164, табл. 38, фиг. 1–10. Там же.
1944. Турутанова-Кетова, с. 74, табл. 4, фиг. 7. Нижняя – средняя юра. Мангышлак.
1962а. Киричкова, с. 465, рис. 10–12. Нижний триас. Восточный Урал.
1966. Просвирякова, с. 88, табл. 14, фиг. 1–4. Средняя юра Мангышлак.

Pterophyllum aff. braunianum Goeppert

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 191, табл. 48, фиг. 2, 3. Средняя юра. Туаркыр.

Pterophyllum cf. braunianum Goeppert

1933б. Принада, с. 23, табл. 3, фиг. 10. Средняя юра. Ткибули, Грузия.

1934. Принада, с. 40. табл. 4, фиг. 1; табл. 5–6, фиг. 9. Верхний триас? Р. Танымас, Памир.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 178, табл. 7, фиг. 5. Верхний триас. Шураб, Южная Фергана.

Pterophyllum braunsii Schenk

1867. Schenk, с. 168, табл. 40, фиг. 2, 3 (?). Верхний триас — нижняя юра. Франкония, ФРГ.

1934. Принада, с. 36, рис. 6 в тексте. Верхний триас? Р. Кокуйбель-су, Памир.

Pterophyllum burejense Prynada ex Vachrameev et Doludenko

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 84, табл. 36, фиг. 1–4. Нижний мел. Буреинский бассейн.

1963. Самылина, с. 91, табл. 17, фиг. 5, 6; табл. 19, фиг. 2–4. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

Pterophyllum aff. burejense Prynada

1967. Красилов, с. 157, табл. 46, фиг. 1, 2. Нижний мел (липовецкая свита). Суйфунский бассейн, Южное Приморье.

Pterophyllum cf. burejense Prynada

1959б. Василевская, с. 60, табл. 7, фиг. 7,*а*. Нижний мел (ынгырская свита). Ленский бассейн.

Pterophyllum ctenoides Oishi

1932. Oishi, с. 314, табл. 23, фиг. 1–3; табл. 26, фиг. 1. Верхний триас. Япония.

Pterophyllum cf. ctenoides Oishi

1970. Алиев, Генкина, с. 23, табл. 7, фиг. 2–5. Нижняя юра. Тянь-Шань.

Pterophyllum filicinum Goeppert

1845. Goeppert in Murchison e. a., с. 501, табл. G, фиг. 4, A,B. Юра (мел?). Окрестности Москвы.

Pterophyllum georgiense Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 59, табл. 54, фиг. 2, 5; табл. 60, фиг. 1–4; табл. 61, фиг. 1–7. Верхняя юра. Грузия.

Pterophyllum aff. georgiense Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 59, табл. 62, фиг. 1–6. Верхняя юра. Грузия

Pterophyllum hanesianum Harris

1932b. Harris, с. 40, табл. 4, фиг. 1, 5; рис. 16–18. Верхний триас. Скоресби Саунд, Гренландия.

1962. Сикстель, с. 365, табл. 27, фиг. 6, *а,б*. Триас. Мадыген. Южная Фергана.

Pterophyllum helmersenianum Heer

1876b. Heer, с. 104, табл. 25, фиг. 2–6; табл. 29, фиг. 1,*d*. Верхняя юра. Верховье р. Амура.

Pterophyllum inconstans (Braun) Goeppert

1843. Pterozamites (Ctenis) inconstans. Braun in Münster, с. 30. Верхний триас. Франкония. ФРГ.

1843. Ctenis inconstans. Braun in Munster, с. 100, табл. 2, фиг. 6, 7. Там же.

1844. Pterophyllum inconstans. Goeppert, с. 136. Там же.

1931. Принада, с. 21, табл. 3, фиг. 29, 30. Нижняя — средняя юра. Р. Ягноб, бассейн р. Зеравшана.

1952. Сикстель, с. 27, табл. 14, фиг. 1,*а*. Нижняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.

1961б. Маркович, табл. 20, фиг. 1, 2. Средняя юра (орская и романкульская свиты). Магнитогорский синклинорий, Южный Урал.

1963б. Генкина, с. 195, табл. 2, фиг. 2. Юра (аксайская свита). Согутинский район, Иссык-Куль.

1966. Генкина, с. 83, табл. 34, фиг. 1—5. Нижняя юра. Иссык-Куль.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 179, табл. 7, фиг. 6. Средняя юра. Шураб, Южная Фергана.

1976. Иминов, с. 25, табл. 9, фиг. 4—6; табл. 10, фиг. 1, 2. Средняя юра. Дарвазский хребет, Гиссарский хребет, Южная Фергана.

Pterophyllum cf. inconstans (Braun) Goeppert

1961. Просвирякова, с. 157, табл. 8, фиг. 7. Средняя юра (дурайская свита). Р. Верхний Беркакит, Южная Якутия.

Pterophyllum insigne Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 63, табл. 66, фиг. 1—5; табл. 67, фиг. 1—3. Верхняя юра. Грузия.

Pterophyllum irkutense Prynada

1962. Принада, с. 159, табл. 8, фиг. 6. Средняя юра. Иркутский бассейн.

Pterophyllum issykkulensis Genkina

1963б. Генкина с. 194, табл. 1, фиг. 6; табл. 2, фиг. 1, 4. Юра (аксайская свита). Согутинский район, Иссык-Куль.

1966. Генкина, с. 82, табл. 33, фиг. 7—10. Нижняя юра. Иссык-Куль.

Pterophyllum jaegeri Brongniart

1828. Brongniart, с. 95. Верхний триас. Западная Европа.

Pterophyllum aff. jaegeri Brongniart

1962. Сикстель, с. 367, табл. 28, фиг. 3—6. Триас. Мадыген, Южная Фергана.

Pterophyllum kakhadzei Svanidze

1973*а*. Сванидзе, с. 117, табл. 1, фиг. 1—6, Сердняя юра. Западная Грузия.

Pterophyllum ketovae Sixtel

1962. Сикстель, с. 366, табл. 27, фиг. 1, 2. Триас. Мадыген, Южная Фергана.

Pterophyllum lancilobum Heer

1876b. Heer, с. 104, табл. 25, фиг. 7, 8. Верхняя юра. Верховье р. Амура.

1962. Принада, с. 160, рис. 30. Нижняя — средняя юра. Восточное Забайкалье.

Pterophyllum cf. lancilobum Heer

1912. Новопокровский, с. 8, табл. 3, фиг. 1. Нижний мел. Р. Тырма, Буреинский бассейн.

1958. Орловская, с. 136, рис. 4. Нижняя юра (шоптыкульская свита). Майкюбень, Казахстан.

1968. Орловская, с. 77, табл. 5, фиг. 2–4. Средняя юра (шоптыкульская свита). Майкюбень, Казахстан.

Pterophyllum magnum Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 62, табл. 64, фиг. 4, 5; табл. 65, фиг. 1–3. Верхняя юра. Грузия.

Pterophyllum manchurense (Oishi) Krassilov

1935. Cycadites manchurensis. Oishi, с. 85, табл. 6, фиг. 4, 4,*a*, 4,*b*. Нижний мел. Китай.

1967. Pterophyllum manchurense. Красилов, с. 158, табл. 46, фиг. 3, 4. Нижний мел. Южное Приморье.

Pterophyllum marginatum Unger

1850. Unger, с. 289. Нижняя юра. Западная Европа.

1867. Schenk, стр. 166, табл. 37, фиг. 2–4. Верхний триас. Франкония, ФРГ.

1969. Красилов, с. 106, табл. 15, фиг. 1–7. Средняя юра. Мангышлак.

Pterophyllum cf. marginatum Schenk

1931. Принада, с. 22, рис. 3,*A*. Нижняя – средняя юра. С. Кштут, бассейн р. Зеравшана.

Pterophyllum mirabile Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 58, табл. 59, фиг. 1–6. Верхняя юра. Грузия.

Pterophyllum mongugaicum Srebrodolskaja

1968. Сребродольская в кн.: Новые виды. . . , с. 67, табл. 19, фиг. 1–3. Верхний триас. Приморье.

Pterophyllum murchisonianum Goeppert

1845. Goeppert in Murchison e. a., с. 501, табл. G, фиг. 3, 5, 6,*a*. Мел? Окрестности Москвы.

Pterophyllum nathorstii Seward

1911b. Seward, с. 694, табл. 4, фиг. 60,*A*, 61, 61,*A*; табл. 5, фиг. 79, 86, 86,*A*; табл. 9, фиг. 36; табл. 10, фиг. 44; рис. 13,*A*, *B*. Верхняя юра. Шотландия.

1957. Станиславский, с. 55, табл. 11, фиг. 13; рис. 20. Средняя юра. Донбасс.

1961. Ковальчук, табл. 10, фиг. 5. Нижняя юра (дубовская свита). Карагандинский бассейн.

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 192, табл. 49, фиг. 2, 4. Нижняя юра (пестроцветная свита). Туаркыр.

1976. Иминов, с. 26, табл. 10, фиг. 3–5. Нижняя юра. Ташкутан, Гиссарский хребет; Шураб-3, Южная Фергана. Средняя юра. Ферганский хребет.

Pterophyllum papillatum Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 58, табл. 57, фиг. 1–4; табл. 58, фиг. 1–6. Верхняя юра. Грузия.

Pterophyllum paradoxum Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 64, табл. 54, фиг. 1; табл. 68, фиг. 1–5. Верхняя юра. Грузия.

Pterophyllum pectiniforme (Prynada) Krassilov

1956. Tyrmia pectiniformis Принада, в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 242, 244. Верхняя юра – нижний мел. Буреинский бассейн.

1963. Василевская, в кн.: Основы палеонтологии, с. 113, рис. 20. Там же.

1969. Pterophyllum pectiniforme. Красилов, с. 105, табл. 11, фиг. 3; табл. 12, фиг. 1–5. Там же.

Pterophyllum polonicum Makarewiczowna

1928. Makarewiczowna, с. 20, табл. 1 (10), фиг. 3–5. Нижняя юра. Польша.

Pterophyllum cf. polonicum Makarewiczowna

1961б. Маркович, табл. 12, фиг. 4. Верхний триас (кызылкаинская свита). Магнитогорский синклинорий, Южный Урал.

1971. Маркович, с. 83, табл. 6, фиг. 5. Верхний триас (кызылкаинская свита). Орский бассейн.

Pterophyllum princeps Oldham et Morris

1863. Oldham, Morris, с. 23, табл. 10, фиг. 1–3; табл. 11, фиг. 1; табл. 12, фиг. 1; табл. 13, фиг. 1, 2. Юра. Раджмахал, Индия.

Pterophyllum ex gr. princeps Oldham et Morris

1934. Принада, с. 48, рис. 10 в тексте. Верхний триас? Р. Кокуйбельсу, Памир.

Pterophyllum propinquum Goeppert

1844. Goeppert, с. 132, табл. 1, фиг. 5. Юра. ФРГ.

1934. Принада, с. 40, рис. 7–9 в тексте. Верхний триас. Реки Кудары, Кокуйбельсу, Тузбель, Бахтанг, Памир.

1976. Иминов, с. 28, табл. 11; табл. 12, фиг. 1, 2; табл. 13, фиг. 1, 2. Верхний триас. Памир, Средняя юра. Юго-западные отроги Гиссарского хребта.

Pterophyllum cf. proinquum Goeppert

1961б. Маркович, табл. 21, фиг. 3. Средняя юра (орская и романкульская свиты). Магнитогорский синклинорий, Южный Урал.

Pterophyllum pshartense Prynada

1934. Принада, с. 43, табл. 8, фиг. 1; табл. 9, фиг. 1; табл. 10, фиг. 6; табл. 11, фиг. 3. Верхний триас? Р. Западный Пшарт, Памир.

1960. Сикстель, с. 76, табл. 2, фиг. 2–4. Верхний триас. Памир.

1962. Сикстель, табл. 1, фиг. 1. Верхний триас. Р. Западный Пшарт, Памир.

1976. Иминов, с. 29, табл. 14, фиг. 1–3; табл. 15, фиг. 1, 2. Верхний триас. Реки Ромсунос, Водинров, Бартанг, Кокуйбельсу, Памир.

Pterophyllum pterophylloides (Prynada) Krassilov

1956. Tyrmia pterophylloides. Принада, в кн.: Материалы по палеонтологии. . . , с. 242. Нижний мел (тырминская свита). Р. Тырма, Буреинский бассейн.

1969. Pterophyllum pterophylloides. Красилов, с. 109, табл. 13, фиг. 1–5. Там же.

Pterophyllum ptilum Harris

1932в. Harris, с. 61, табл. 5, фиг. 1–5, 11; рис. 30, 31. Верхний триас. Скоресби Саунд, Гренландия.

Pterophyllum aff. ptilum Harris

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 56, табл. 53, фиг. 1–6; табл. 54, фиг. 3. Верхняя юра. Грузия.

Pterophyllum cf. ptilum Harris

1971. Станиславский, с. 71, табл. 21, фиг. 9; табл. 22, фиг. 1; рис. 34. Верхний триас. Донбасс.

Pterophyllum rarinerve Prynada

1934. Принада, с. 47, табл. 10, фиг. 3, 4. Верхний триас? Р. Кокуйбельсу, Памир.

1976. Иминов, с. 29, табл. 15, фиг. 3, 4. Верхний триас. Реки Варзоб, Партыш, Памир.

Pterophyllum raripinnatum Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 55, табл. 51, фиг. 1–5; табл. 52, фиг. 1–6. Верхняя юра. Грузия.

Pterophyllum rigidum (Prynada) Krassilov

1956. Bureja rigida. Принада в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 237, табл. 47, фиг. 6. Верхняя юра – нижний мел. Буреинский бассейн.

1973. Pterophyllum rigidum. Красилов, с. 46, табл. 15, фиг. 1–7. Там же.

Pterophyllum rionense Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 57, табл. 54, фиг. 4; табл. 55, фиг. 1–6; табл. 56, фиг. 1–4. Верхняя юра. Грузия.

Pterophyllum sasykense Prynada

1934. Принада, с. 46, табл. 8, фиг. 4, 5. Верхний триас? Р. Сасык, Памир.

Pterophyllum sensinovianum Heer

1876в. Heer, с. 105, табл. 24, фиг. 8. Верхняя юра. Верховье р. Амура.

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 85, табл. 40, фиг. 3, Нижний мел. Буреинский бассейн.

Pterophyllum aff. sensinovianum Heer

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 86, табл. 37, фиг. 1–7. Нижний мел. Буреинский бассейн.

Pterophyllum cf. sixteliana (Tschastnikova) Iminov

1952. Tyrmia sixteliana. Частникова, с. 6, фиг. 3. Юра. Алайская долина, Южная Фергана.

1976. Pterophyllum cf. sixteliana. Иминов, с. 30, табл. 20, фиг. 14; табл. 21, фиг. 1, 2. Средняя юра. Шураб, Южная Фергана.

1976. Самылина, с. 50, табл. 19, фиг. 4—7. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Jacutiella dentata Burakova

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 180, табл. 41, фиг. 1—4; рис. 76. Средняя юра. Таур, Туаркыр.

Jacutiella mongugaica Srebrodolskaja

1960. Сребродольская, стр. 109, табл. 1, фиг. 8, 10. Верхний триас (нижняя монгугайская свита) . Южное Приморье.

Kryshtofovichiana Tschastnikova, 1952

Kryshtofovichiana dentata Tschastnikova

1952. Частникова, с. 4, фиг. 1. Юра. Алайская долина, Южная Фергана.

Kryshtofovichiana vittaeformis Tschastnikova

1952. Частникова, с. 5, фиг. 2. Юра. Алайская долина. Южная Фергана.

Leptopterophyllum Thomas, 1930

Leptopterophyllum nathorstii (Seward) Thomas

1900. Dioonites nathorsti. Seward, с. 239. Средняя юра. Англия.

1930. Leptopterophyllum nathorsti. Thomas, с. 393, табл. 20, фиг. 1; табл. 21. Там же.

Leptopterophyllum pterophylloides (Prynada) Krassilov

1912. Dioonites sp. Новопокровский, с. 10, табл. 3, фиг. 5. Нижний мел. Буреинский бассейн.

1956. Tyrmia pterophylloides. Принада в кн. Материалы по палеонтологии, с. 242. Там же.

1967. Leptopterophyllum pterophylloides. Красилов, с. 158, табл. 44, фиг. 4—5. Нижний мел. Приморье.

Leuthardtia Krausel et Schaarschmidt, 1966

Leuthardtia ovalis Krausel et Schaarschmidt

1966. Krausel und Schaarschmidt, с. 26, табл. 8. Верхний триас. Швейцария.

Leuthardtia crassa Mogutcheva

1973. Могучева, с. 86, табл. 38, фиг. 5—8. Нижний триас. Тунгусский бассейн.

Neozamites Vakhrameev, 1962

Neozamites verchojanensis Vachrameev

1962. Вахрамеев, с. 124, табл. 12, фиг. 1—5. Нижний мел. Ленский бассейн.

1966. Василевская, с. 58, табл. 3, фиг. 1, 2. Нижний мел. Жиганский район, Ленский бассейн.

1970. Абрамова, с. 42, табл. 3, фиг. 2—6. Нижний мел (бахская свита). Жиганский район, Ленский бассейн.

1976. Самылина, с. 50, табл. 24, фиг. 5—8. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Neozamites denticulatus (Kryshtofovich et Prynada) Vachrameev

1932. Otozamites denticulatus. Криштофович, Принада, с. 369. Нижний мел. Приморье.

1962. Neozamites denticulatus. Вахрамеев, с. 125. Там же.

1967. Красилов, с. 151, табл. 40, фиг. 1. Там же.

Neozamites lebedevii Vachrameev

1962. Вахрамеев, с. 125, табл. 13, фиг. 1–3, 5–8. Нижний мел Якутия.

Neozamites (?) sp.

1970. Абрамова, с. 43, табл. 3, фиг. 7. Нижний мел (джарджанская свита). Жиганский район, Ленский бассейн.

Nilssoniopteris Nathorst, 1909

Nilssoniopteris tenuinervis Nathorst

1909. Nathorst, с. 29, табл. 6, фиг. 23–25; табл. 7, фиг. 21. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

Nilssoniopteris amurensis (Novopokrovsky) Krassilov

1912. Taeniopteris amurensis. Новопокровский, с. 6, табл. 1, фиг. 4; табл. 2, фиг. 5. Нижний мел. Р. Тырма, бассейн р. Амура.

1973. Nilssoniopteris amurensis. Красилов, с. 44, табл. 12, фиг. 1–7; табл. 14, фиг. 1–7. Нижний мел. Буреинский бассейн.

Nilssoniopteris angrenica Gomolitzky

1974. Гомолицкий, с. 1200, табл. 1, фиг. 1–4. Средняя юра (ангренская свита). Ангрен, Узбекистан.

Nilssoniopteris angustifolia Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 40, табл. 37, фиг. 1–11; табл. 38, фиг. 1–7. Верхняя юра. Грузия.

Nilssoniopteris boroldaica Orlovskaja

1976. Долуденко, Орловская, с. 53, табл. 16, фиг. 2–7; табл. 17, фиг. 1–3; рис. 23,*а–к*. Средняя юра. Боролдай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Nilssoniopteris (Sibiriophyllum) californicum (Fontaine) Samylina

1900. Macrotaeniopteris californica. Fontaine in Ward, с. 349, табл. 53, фиг. 1; табл. 54, фиг. 1, 2. Юра. США.

1963. Nilssoniopteris (Sibiriophyllum) californicum. Самылина, с. 90, табл. 13, фиг. 2, 3; табл. 17, фиг. 1–3; табл. 18, фиг. 4–7. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

Nilssoniopteris densinervis (Feistmantel) Markovitch

1876b. Taeniopteris densinervis. Feistmantel, с. 19, табл. 2, фиг. 6. Юра Кач, Индия.

1971. Маркович, с. 81, табл. 5, фиг. 6, 7; табл. 6, фиг. 1–4. Средняя юра (орская свита). Орский бассейн.

Nilssoniopteris karataviensis Orlovskaja

1976. Долуденко, Орловская, с. 54, табл. 16, фиг. 1; табл. 17, фиг. 4; табл. 18, фиг. 1–4; рис. 24,*а–ж*. Нижняя юра. Куркуреу, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Nilssoniopteris latifolium Kiritchkova

1973. Киричкова, в кн.: Новые виды. . ., с. 10, табл. 5, фиг. 2. Нижняя юра (кокалинская свита). Мангышлак.

Nilssoniopteris linearis Kiritchkova

1973. Киричкова, в кн.: Новые виды. . ., с. 11, табл. 4, фиг. 2. Нижняя юра (кокалинская свита). Мангышлак.

Nilssoniopteris longifolia Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 42, табл. 39, фиг. 1–6. Верхняя юра. Грузия.

Nilssoniopteris muchlensis Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 43, табл. 40, фиг. 1–8; табл. 41, фиг. 1–5. Верхняя юра. Грузия.

Nilssoniopteris ovalis Samylina

1963. Самылина, с. 89, табл. 19, фиг. 5; рис. 8. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

19596. Василевская, с. 59, табл. 7, фиг. 5; табл. 8, фиг. 1, 2. Нижний мел (чонгургасская свита). Сангарский район, бассейн р. Лены.

1963. Василевская, Павлов, табл. 8, фиг. 1, 2. Нижний мел. Ленский бассейн.

1966. Василевская, Абрамова, с. 76, табл. 2, фиг. 1–4. Нижний мел. Ленский бассейн.

Nilssoniopteris aff. ovalis Samylina

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 82, табл. 33, фиг. 1–4; табл. 34, фиг. 1–5. Нижний мел. Буреинский бассейн.

Nilssoniopteris papillifera Kiritchkova

1973. Киричкова, в кн.: Новые виды. . ., с. 12, табл. 4, фиг. 1. Нижняя юра (кокалинская свита). Мангышлак.

Nilssoniopteris polymorpha Sveshnikova et Budantsev

1969. Свешникова, Буданцев, с. 59, табл. 11, фиг. 2–13; табл. 12, фиг. 2–7; табл. 13, фиг. 1; табл. 15, фиг. 12а,б; рис. 10. Нижний мел. О-в Солсбери, Земля Франца-Иосифа.

Nilssoniopteris prynadae Samylina

1964б. Самылина, с. 75, табл. 16, фиг. 8; табл. 18, фиг. 4–10. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Бассейн р. Колымы.

Nilssoniopteris rhitidorachis (Kryshtofovich) Krassilov

1932. Taeniopteris rhitidorachis. Криштофович, Принада, с. 368. Нижний мел. Приморье.

1967. Nilssoniopteris rhitidorachis. Красилов, с. 139, табл. 32, фиг. 1–4; табл. 33, фиг. 1–4; рис. 18,*а,г*. Там же.

Nilssoniopteris ex gr. rhitidorachis (Kryshtofovich) Krassilov

1976. Иминов, с. 20, табл. 4, фиг. 1–3. Средняя юра (согульская свита). Шураб-2, Южная Фергана.

Nilssoniopteris robusta (Kryshtofovich et Prynada) Krassilov

1932. Nilssonia robusta. Криштофович, Принада, с. 370. Нижний мел. Приморье.

1967. Nilssoniopteris robusta. Красилов, с. 142, табл. 33, фиг. 5; табл. 34, фиг. 1–4; рис. 18,б–в. Там же.

Nilssoniopteris stenophylla Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 44, табл. 42, фиг. 1–6. Верхняя юра. Грузия.

Nilssoniopteris taeniata Samylina

1961. Самылина, с. 634, табл. 1, фиг. 1–6; табл. 2, фиг. 1. Нижний мел. Бассейн р. Раздольной. Южное Приморье.

Nilssoniopteris uarensis Iminov et Loseva

1972. Иминов, Лосева, в кн.: Новые виды. . . , с. 319, табл. 73, фиг. 7, 8. Средняя юра. Гиссарский хребет.

1976. Иминов, с. 19, табл. 3, фиг. 4–7. Средняя юра. Яккабагские горы, юго-западные отроги Гиссарского хребта.

Nilssoniopteris vittata (Brongniart) Florin

1828b. Taeniopteris vittata. Brongniart, с. 62. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

1831 (1828a–1838). Brongniart, с. 263, табл. 82, фиг. 1–4. Там же.

1933. Nilssoniopteris vittata. Florin, с. 4, 15. Там же.

1968. Орловская, с. 76, табл. 4, фиг. 1–4. Средняя юра (шолтыкольская свита). Майкюбень, Казахстан.

Nilssoniopteris aff. vittata (Brongniart) Florin

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 45, табл. 43, фиг. 1–7. Верхняя юра. Грузия.

1976. Долуденко, Орловская, с. 52, табл. 14, фиг. 1–6; табл. 15, фиг. 1–7; рис. 22,*а–г*. Средняя юра. Боролдай, Таскомырсай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Nilssoniopteris vulgaris Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 46, табл. 44, фиг. 1–10; табл. 45, фиг. 1–5; табл. 46, фиг. 1–6. Верхняя юра. Грузия.

Nilssoniopteris sp.

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 83, табл. 35, фиг. 1–6. Верхняя юра. Буреинский бассейн.

Otozamites Braun in Münster, 1843

Otozamites obtusus (Lindley et Hutton) Brongniart

1834 (1831–1837). Otopteris obtusa. Lindley, Hutton, с. 129, табл. 128. Юра. Англия.

1849. Otozamites obtusus. Brongniart, с. 104. Там же.
1933а. Криштофович, Принада, с. 15, табл. 2, фиг. 2; табл. 3, фиг. 2,а. Верхний триас. Армения.
1968а. Иминов, с. 100, табл. 35, фиг. 7—10. Верхний триас. Памир. Нижняя юра. Гиссарский хребет.

Otozamites cf. obtusus (Lindley et Hutton) Brongniart

1957. Станиславский, с. 54, табл. 9, фиг. 6. Средняя юра. Днепровско-Донецкая впадина.

Otozamites cf. obtusus (Lindley et Hutton) var. ooliticus Seward

1907. Сьюорд, с. 12, табл. 1, фиг. 13. Юра. Кавказ.

Otozamites abbreviatus Feistmantel

1876а. Feistmantel, с. 37. Юра. Индия.
1879. Feistmantel, с. 21, табл. 7, фиг. 9; табл. 8, фиг. 6, 7; табл. 9, фиг. 3, 12. Там же.
1934. Принада, с. 54, табл. 11, фиг. 2. Верхний триас? Перевал Ходжи-Джайляу, Памир.

Otozamites asiaticus Genkina

1970. Алиев, Генкина, с. 25, табл. 8, фиг. 1, 2. Нижняя юра. Тянь-Шань.

Otozamites cf. beanii (Lindley et Hutton) Brongniart

1976. Долуденко, Орловская, с. 99, табл. 58, фиг. 1—3. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Otozamites bengalensis Oldham et Morris

1976. Иминов, с. 22, табл. 4, фиг. 4—9. Средняя юра. Ташкутан, Гиссарский хребет.

Otozamites cingulatus (Burakova) Kiritchkova

1966. Tyrmia (?) cingulata. Буракова, с. 140, табл. 9, фиг. 1—22. Средняя юра (нижняя угленосная толща). Туаркыр.
1974. Otozamites cingulatus. Киричкова, с. 126, рис. 1,3—5. Средняя юра (тонашинская свита). Мангышлак.

Otozamites giganteus Thomas

1911. Томас, с. 38, табл. 6, фиг. 1, 2. Средняя юра. Каменка, Донбасс.
1957. Станиславский, с. 53, табл. 9, фиг. 8, 9. Там же.
1976. Долуденко, Орловская, с. 99, табл. 56, фиг. 1, 2; табл. 57, фиг. 1—4. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Otozamites gissaricus Iminov

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 176, табл. 9, фиг. 4—7. Нижняя юра. Кугитанг, Средняя Азия.
1976. Иминов, с. 20, табл. 5, фиг. 1—4. Средняя юра (гурудская свита). Мачайли, Гиссарский хребет.

Otozamites graphicus (Leckenby) Schimper

1864. Otopteris graphica. Leckenby, с. 78, табл. 8, фиг. 5. Средняя юра. Скарборо, Англия.

1870 (1869–1874). Otozamites graphicus. Schimper, с. 170. Там же.
1967. Делле, с. 89, табл. 15, фиг. 1–6. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.
1969. Долуденко, Сванидзе, с. 46, табл. 47, фиг. 1–7; табл. 48, фиг. 1–3. Верхняя юра. Грузия.

Otozamites cf. graphicus (Leckenby) Phillips

1976. Иминов, с. 22, табл. 5, фиг. 5–7; табл. 7, фиг. 1–6; табл. 8, фиг. 3. Средняя юра. Гулиоб, Ташкутан, Гиссарский хребет. Верхний триас. Р. Ванч, Памир.

Otozamites hislopii (Oldham) Feistmantel

1877a. Otozamites hislopi. Feistmantel, с. 12, табл. 6, фиг. 3, 4; табл. 11, фиг. 1. Юра. Джабалпур, Индия.
1930. Турутанова-Кетова, с. 146, табл. 3, рис. 20, 21, 24. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Otozamites imbricatus Feistmantel

1976. Иминов, с. 23, табл. 5, фиг. 8. Средняя юра. Бештахта, Гиссарский хребет.

Otozamites iziumensis Thomas

1911. Томас, с. 37, табл. 5, фиг. 11. Средняя юра. Изюм, Донбасс.
1957. Станиславский, с. 53, табл. 9, фиг. 5. Средняя юра. Донбасс.
1976. Иминов, стр. 23, табл. 6, фиг. 1. Средняя юра (верхняя согульская подсвита). Шураб-2, Южная Фергана.

Otozamites jarmolenkoi Vachrameev

1948. Вахрамеев, с. 13, рис. 9 в тексте. Нижний мел. Р. Кульденен-Темир, Западный Казахстан.
1952. Вахрамеев, с. 168, табл. 9, фиг. 1; рис. 29 в тексте. Нижний мел (верхний альб). Р. Кульденен-Темир, Западный Казахстан.

Otozamites kirgisicus Genkina

1970. Алиев, Генкина, с. 23, табл. 7, фиг. 6, 9. Нижняя юра. Тянь-Шань.

Otozamites klipsteinii (Dunker) Seward

1846. Cyclopteris klipsteinii. Dunker, с. 11, табл. 9, фиг. 6, 7. Нижний мел. Западная Европа.
1895. Otozamites klipsteinii. Seward, с. 60, табл. 1, фиг. 3, 4; табл. 7. Там же.
1967. Красилов, с. 150, табл. 39, фиг. 1–3. Нижний мел. Приморье.

Otozamites latior Saporta

1875 (1873–1875). Saporta, с. 130, табл. 27, фиг. 1–6; табл. 28, фиг. 1–3. Верхний триас. Франция.
1930. Турутанова-Кетова, с. 148, табл. 4, рис. 26, 27, 27,*а*. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1976. Долуденко, Орловская, с. 98, табл. 53, фиг. 1,*б, в, г*, 2; табл. 54, фиг. 1–3. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Otozamites nalivkinii Prynada

1934. Принада, с. 52, табл. 5–6, фиг. 6,*б*, 8. Верхний триас? Р. Бартанг, Памир.

1976. Иминов, с. 20, табл. 6, фиг. 2–5. Верхний триас. Реки Бартанг, Нунбиста, Сарезское озеро, Памир.

Otozamites pamiricus Prynada

1934. Принада, с. 50, табл. 1, фиг. 4. Верхний триас. Р. Танымас, Памир.

1976. Иминов, с. 21, табл. 7, фиг. 7–10; табл. 8, фиг. 1, 2. Нижняя юра (нижняя часть санджарской свиты). Ташкутан, Гиссарский хребет. Верхний триас. Памир.

Otozamites sphenozamioides Turutanova-Ketova

1930. Турутанова-Кетова, с. 149, табл. 5, фиг. 31–34. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Otozamites turkestanicus Turutanova-Ketova

1930. Турутанова-Кетова, с. 150, табл. 2, фиг. 18; табл. 5, фиг. 35. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1936б. Турутанова-Кетова, с. 185, табл. 1; табл. 2. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1976. Долуденко, Орловская, с. 98, табл. 55, фиг. 1–4. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Otozamites sp.

1912. Криштофович, с. 493, табл. 1, фиг. 5, 5,*а*. Нижняя юра. Восточный склон Урала.

1941. Брик, с. 29, табл. 8, фиг. 1. Верхний триас (нижняя свита). Камыш-Баши, Южная Фергана.

1957. Станиславский, с. 55, табл. 9, фиг. 7; рис. 19. Средняя юра. Донбасс.

1967. Красилов, с. 150, табл. 44, фиг. 1–3; рис. 19, *г–д*. Нижний мел. Приморье.

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 47, табл. 48, фиг. 4, 5. Верхняя юра. Грузия.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 177, табл. 9, фиг. 8–11. Нижняя и средняя юра. Шураб, Южная Фергана.

Otozamites? sp.

1961. Ковальчук, табл. 16, фиг. 4. Средняя юра (михайловская свита). Карагандинский бассейн.

1963. Василевская, Павлов, табл. 25, фиг. 1. Нижний мел. Ленский бассейн.

Pseudocycas Nathorst, 1907

Pseudocycas insignis Nathorst

1907. Nathorst, с. 4, табл. 1, фиг. 1–5; табл. 2, фиг. 1–9; табл. 3, фиг. 1. Нижняя юра. Швеция.

Pseudocycas baranovae Kiritchkova

1975. Баранова, Киричкова, Зауер, с. 122, табл. 21, фиг. 1, 2; табл. 22, фиг. 1–6. Средняя юра. Северная Эмба, Западный Казахстан.

Pseudocycas cessiensis Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 47, табл. 44. фиг. 1–4; табл. 50, фиг. 1–6. Верхняя юра. Грузия.

Pseudocycas colchica Prynada

1934. Криштофович. Принада, с. 68, Нижняя юра. Абхазия.

1961. Сванидзе, с. 47, табл. 1, фиг. 1, 2, 10, 11; табл. 2, фиг. 1, 2; рис. 1. Средняя юра. Ткибули, Грузия.

Pseudocycas dubius Turutanova-Ketova

1936б. Турутанова-Кетова, с. 192, табл. 3, фиг. 3. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pseudocycas polynovii (Novopokrovsky) Krassilov

1912. Dioonites polynovi. Новопокровский, с. 9, табл. 3, фиг. 6. Нижий мел. Буреинский бассейн.

1969. Pseudocycas polynovii. Красилов, с. 109, табл. 13, фиг. 6, 7; табл. 14, фиг. 1–7. Там же.

Pseudocycas saighanensis Jacob et Shukla

1955. Jacob, Shukla, с. 30, табл. 10, фиг. 82, 83, 85. Средняя юра. Северный Афганистан.

Pseudocycas cf. saighanensis Jacob et Shukla

1967. Делле, с. 92, табл. 17, фиг. 1. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

1975. Баранова, Киричкова, Зауер, с. 123, табл. 23, фиг. 1–4; табл. 24, фиг. 1–4. Средняя юра. Северная Эмба, Западный Казахстан.

Pterophyllum Brongniart, 1828

Pterophyllum longifolium Brongniart

1822 (1822–1823). Algacites filicoides. Schlotheim, табл. 4, фиг. 2. Верхний триас. Швейцария.

1828. Pterophyllum longifolium. Brongniart, с. 95. Там же.

Pterophyllum abdullaevii Iminov

1976. Иминов, с. 30, табл. 20, фиг. 5–12. Нижняя юра (санджарская свита). Мачайли, юго-западные отроги Гиссарского хребта.

Pterophyllum aequale (Brongniart) Nathorst

1825. Nilssonia aequalis Brongniart, с. 219, табл. 12, фиг. 6. Нижняя юра. Швеция.

1878b. Pterophyllum aequale. Nathorst, с. 18, табл. 2, фиг. 13. Там же.

1912. Новопокровский, с. 8, табл. 3, фиг. 3. Нижний мел. Р. Тырма, Буреинский бассейн.

1934. Принада, с. 33, табл. 2, фиг. 1; рис. 5,*а,б* в тексте. Верхний триас? Р. Кокуйбельсу, Памир.

1971. Станиславский, с. 73, табл. 19, фиг. 4; табл. 20, фиг. 1–7; рис. 35. Верхний триас. Донбасс.

1976. Иминов, с. 26, табл. 8, фиг. 11–13. Верхний триас. Реки Акджилга, Каинды, Кокуйбельсу, оз. Яшилкуль, Памир.

Pterophyllum andraeanum Schimper

1870 (1869–1874). Schimper, с. 135. Верхний триас. Банат, Румыния.

1922. Johansson, с. 33, табл. 5, фиг. 15–17; табл. 8, фиг. 22, 23. Верхний триас. Швеция.

1926. Криштофович, с. 601, табл. 12, фиг. 1в, 3. Нижняя юра. Р. Фиаг-дон, Северный Кавказ.
1934. Принада, с. 38, табл. 3, фиг. 4; табл. 5–6, фиг. 5, 10. Верхний триас? Реки Кокуйбельсу, Танымас, Памир.
1944. Турутанова-Кетова, с. 73, табл. 2, фиг. 4; табл. 4, фиг. 6. Нижняя — средняя юра. Мангышлак.
1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 190, табл. 48, фиг. 1, 3. Нижняя юра (пестроцветная свита). Туаркыр.
1971. Маркович, с. 83, табл. 6, фиг. 6; табл. 7, фиг. 1–2. Средняя юра (орская свита). Орский бассейн.
1976. Иминов, с. 24, табл. 9, фиг. 1–3. Нижняя юра. Сулюкта, Шураб-2, Южная Фергана.

Pterophyllum cf. andraeanum Schimper

1961. Просвирякова, с. 156, табл. 9, фиг. 2. Средняя юра (юхтинская свита). Р. Чульман, Южная Якутия.
1962. Сикстель, табл. 1, фиг. 2. Верхний триас (истыкская свита). Р. Танымас, Памир.
1966. Просвирякова, с. 89, табл. 15, фиг. 1. Средняя юра. Мангышлак.

Pterophyllum angrenica Gomolitzky

1074. Гомолицкий, с. 1201, табл. 1, фиг. 5–8. Средняя юра (ангренская свита). Ангрен, Узбекистан.

Pterophyllum angustilobum Prynada

1934. Принада, с. 44, табл. 2, фиг. 5; табл. 4, фиг. 4, 5. Верхний триас? Р. Танымас, Памир.

Pterophyllum angustum (Braun) Gothan

1843. Ctenis angusta. Braun in Munster, с. 39, табл. 11, фиг. 1, 3. Верхний триас. ФРГ.
1914. Pterophyllum angustum. Gothan, с. 46, табл. 26, фиг. 3. Там же.

Pterophyllum cf. angustum (Braun) Gothan

1933а. Криштофович, Принада, с. 14, табл. 2, фиг. 5. Верхний триас. Армения.

Pterophyllum bavieri Zeiller

1903. Zeiller, с. 198, табл. 49, фиг. 1–3. Верхний триас. Вьетнам.
1934. Принада, с. 35, табл. 3, фиг. 3. Верхний триас? Р. Танымас, Памир.

Pterophyllum bloedeanum Eichwald

1865 (1860–1868). Eichwald, с. 37, табл. 3, фиг. 5. Юра. Донбасс.

Pterophyllum braunianum Goeppert

1844. Goeppert, с. 134. Верхний триас. Франкония, ФРГ.
1867. Schenk, с. 164, табл. 38, фиг. 1–10. Там же.
1944. Турутанова-Кетова, с. 74, табл. 4, фиг. 7. Нижняя — средняя юра. Мангышлак.
1962а. Киричкова, с. 465, рис. 10–12. Нижний триас. Восточный Урал.
1966. Просвирякова, с. 88, табл. 14, фиг. 1–4. Средняя юра Мангышлак.

Pterophyllum aff. braunianum Goeppert

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 191, табл. 48, фиг. 2, 3. Средняя юра. Туаркыр.

Pterophyllum cf. braunianum Goeppert

1933б. Принада, с. 23, табл. 3, фиг. 10. Средняя юра. Ткибули, Грузия.

1934. Принада, с. 40. табл. 4, фиг. 1; табл. 5–6, фиг. 9. Верхний триас? Р. Танымас, Памир.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 178, табл. 7, фиг. 5. Верхний триас. Шураб, Южная Фергана.

Pterophyllum braunsii Schenk

1867. Schenk, с. 168, табл. 40, фиг. 2, 3 (?). Верхний триас — нижняя юра. Франкония, ФРГ.

1934. Принада, с. 36, рис. 6 в тексте. Верхний триас? Р. Кокуйбельсу, Памир.

Pterophyllum burejense Prynada ex Vachrameev et Doludenko

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 84, табл. 36, фиг. 1–4. Нижний мел. Буреинский бассейн.

1963. Самылина, с. 91, табл. 17, фиг. 5, 6; табл. 19, фиг. 2–4. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

Pterophyllum aff. burejense Prynada

1967. Красилов, с. 157, табл. 46, фиг. 1, 2. Нижний мел (липовецкая свита). Суйфунский бассейн, Южное Приморье.

Pterophyllum cf. burejense Prynada

1959б. Василевская, с. 60, табл. 7, фиг. 7,*а*. Нижний мел (ынгырская свита). Ленский бассейн.

Pterophyllum ctenoides Oishi

1932. Oishi, с. 314, табл. 23, фиг. 1–3; табл. 26, фиг. 1. Верхний триас. Япония.

Pterophyllum cf. ctenoides Oishi

1970. Алиев, Генкина, с. 23, табл. 7, фиг. 2–5. Нижняя юра. Тянь-Шань.

Pterophyllum filicinum Goeppert

1845. Goeppert in Murchison e. a., с. 501, табл. G, фиг. 4, A,B. Юра (мел?). Окрестности Москвы.

Pterophyllum georgiense Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 59, табл. 54, фиг. 2, 5; табл. 60, фиг. 1–4; табл. 61, фиг. 1–7. Верхняя юра. Грузия.

Pterophyllum aff. georgiense Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 59, табл. 62, фиг. 1–6. Верхняя юра. Грузия

Pterophyllum hanesianum Harris

1932b. Harris, с. 40, табл. 4, фиг. 1, 5; рис. 16–18. Верхний триас. Скоресби Саунд, Гренландия.

1962. Сикстель, с. 365, табл. 27, фиг. 6, *а,б*. Триас. Мадыген. Южная Фергана.

Pterophyllum helmersenianum Heer

1876b. Heer, с. 104, табл. 25, фиг. 2–6; табл. 29, фиг. 1,*d*. Верхняя юра. Верховье р. Амура.

Pterophyllum inconstans (Braun) Goeppert

1843. Pterozamites (Ctenis) inconstans. Braun in Münster, c. 30. Верхний триас. Франкония. ФРГ.

1843. Ctenis inconstans. Braun in Münster, c. 100, табл. 2, фиг. 6, 7. Там же.

1844. Pterophyllum inconstans. Goeppert, c. 136. Там же.

1931. Принада, с. 21, табл. 3, фиг. 29, 30. Нижняя — средняя юра. Р. Ягноб, бассейн р. Зеравшана.

1952. Сикстель, с. 27, табл. 14, фиг. 1,*а*. Нижняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.

1961б. Маркович, табл. 20, фиг. 1, 2. Средняя юра (орская и романкульская свиты). Магнитогорский синклинорий, Южный Урал.

1963б. Генкина, с. 195, табл. 2, фиг. 2. Юра (аксайская свита). Согутинский район, Иссык-Куль.

1966. Генкина, с. 83, табл. 34, фиг. 1—5. Нижняя юра. Иссык-Куль.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 179, табл. 7, фиг. 6. Средняя юра. Шураб, Южная Фергана.

1976. Иминов, с. 25, табл. 9, фиг. 4—6; табл. 10, фиг. 1, 2. Средняя юра. Дарвазский хребет, Гиссарский хребет, Южная Фергана.

Pterophyllum cf. inconstans (Braun) Goeppert

1961. Просвирякова, с. 157, табл. 8, фиг. 7. Средняя юра (дурайская свита). Р. Верхний Беркакит, Южная Якутия.

Pterophyllum insigne Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 63, табл. 66, фиг. 1—5; табл. 67, фиг. 1—3. Верхняя юра. Грузия.

Pterophyllum irkutense Prynada

1962. Принада, с. 159, табл. 8, фиг. 6. Средняя юра. Иркутский бассейн.

Pterophyllum issykkulensis Genkina

1963б. Генкина с. 194, табл. 1, фиг. 6; табл. 2, фиг. 1, 4. Юра (аксайская свита). Согутинский район, Иссык-Куль.

1966. Генкина, с. 82, табл. 33, фиг. 7—10. Нижняя юра. Иссык-Куль.

Pterophyllum jaegeri Brongniart

1828. Brongniart, c. 95. Верхний триас. Западная Европа.

Pterophyllum aff. jaegeri Brongniart

1962. Сикстель, с. 367, табл. 28, фиг. 3—6. Триас. Мадыген, Южная Фергана.

Pterophyllum kakhadzei Svanidze

1973а. Сванидзе, с. 117, табл. 1, фиг. 1—6, Сердняя юра. Западная Грузия.

Pterophyllum ketovae Sixtel

1962. Сикстель, с. 366, табл. 27, фиг. 1, 2. Триас. Мадыген, Южная Фергана.

Pterophyllum lancilobum Heer

1876b. Heer, c. 104, табл. 25, фиг. 7, 8. Верхняя юра. Верховье р. Амура.

1962. Принада, с. 160, рис. 30. Нижняя — средняя юра. Восточное Забайкалье.

Pterophyllum cf. lancilobum Heer

1912. Новопокровский, с. 8, табл. 3, фиг. 1. Нижний мел. Р. Тырма, Буреинский бассейн.

1958. Орловская, с. 136, рис. 4. Нижняя юра (шоптыкульская свита). Майкюбень, Казахстан.

1968. Орловская, с. 77, табл. 5, фиг. 2–4. Средняя юра (шоптыкульская свита). Майкюбень, Казахстан.

Pterophyllum magnum Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 62, табл. 64, фиг. 4, 5; табл. 65, фиг. 1–3. Верхняя юра. Грузия.

Pterophyllum manchurense (Oishi) Krassilov

1935. Cycadites manchurensis. Oishi, с. 85, табл. 6, фиг. 4, 4,*a*, 4,*b*. Нижний мел. Китай.

1967. Pterophyllum manchurense. Красилов, с. 158, табл. 46, фиг. 3, 4. Нижний мел. Южное Приморье.

Pterophyllum marginatum Unger

1850. Unger, с. 289. Нижняя юра. Западная Европа.

1867. Schenk, стр. 166, табл. 37, фиг. 2–4. Верхний триас. Франкония, ФРГ.

1969. Красилов, с. 106, табл. 15, фиг. 1–7. Средняя юра. Мангышлак.

Pterophyllum cf. marginatum Schenk

1931. Принада, с. 22, рис. 3,*A*. Нижняя – средняя юра. С. Кштут, бассейн р. Зеравшана.

Pterophyllum mirabile Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 58, табл. 59, фиг. 1–6. Верхняя юра. Грузия.

Pterophyllum mongugaicum Srebrodolskaja

1968. Сребродольская в кн.: Новые виды. . . , с. 67, табл. 19, фиг. 1–3. Верхний триас. Приморье.

Pterophyllum murchisonianum Goeppert

1845. Goeppert in Murchison e. a., с. 501, табл. G, фиг. 3, 5, 6,*a*. Мел? Окрестности Москвы.

Pterophyllum nathorstii Seward

1911b. Seward, с. 694, табл. 4, фиг. 60,*A*, 61, 61,*A*; табл. 5, фиг. 79, 86, 86,*A*; табл. 9, фиг. 36; табл. 10, фиг. 44; рис. 13,*A*, *B*. Верхняя юра. Шотландия.

1957. Станиславский, с. 55, табл. 11, фиг. 13; рис. 20. Средняя юра. Донбасс.

1961. Ковальчук, табл. 10, фиг. 5. Нижняя юра (дубовская свита). Карагандинский бассейн.

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 192, табл. 49, фиг. 2, 4. Нижняя юра (пестроцветная свита). Туаркыр.

1976. Иминов, с. 26, табл. 10, фиг. 3–5. Нижняя юра. Ташкутан, Гиссарский хребет; Шураб-3, Южная Фергана. Средняя юра. Ферганский хребет.

Pterophyllum papillatum Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 58, табл. 57, фиг. 1–4; табл. 58, фиг. 1–6. Верхняя юра. Грузия.

Pterophyllum paradoxum Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 64, табл. 54, фиг. 1; табл. 68, фиг. 1–5. Верхняя юра. Грузия.

Pterophyllum pectiniforme (Prynada) Krassilov

1956. Tyrmia pectiniformis Принада, в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 242, 244. Верхняя юра — нижний мел. Буреинский бассейн.

1963. Василевская, в кн.: Основы палеонтологии, с. 113, рис. 20. Там же.

1969. Pterophyllum pectiniforme. Красилов, с. 105, табл. 11, фиг. 3; табл. 12, фиг. 1–5. Там же.

Pterophyllum polonicum Makarewiczowna

1928. Makarewiczowna, с. 20, табл. 1(10), фиг. 3–5. Нижняя юра. Польша.

Pterophyllum cf. polonicum Makarewiczowna

1961б. Маркович, табл. 12, фиг. 4. Верхний триас (кызылкаинская свита). Магнитогорский синклинорий, Южный Урал.

1971. Маркович, с. 83, табл. 6, фиг. 5. Верхний триас (кызылкаинская свита). Орский бассейн.

Pterophyllum princeps Oldham et Morris

1863. Oldham, Morris, с. 23, табл. 10, фиг. 1–3; табл. 11, фиг. 1; табл. 12, фиг. 1; табл. 13, фиг. 1, 2. Юра. Раджмахал, Индия.

Pterophyllum ex gr. princeps Oldham et Morris

1934. Принада, с. 48, рис. 10 в тексте. Верхний триас? Р. Кокуйбельсу, Памир.

Pterophyllum propinquum Goeppert

1844. Goeppert, с. 132, табл. 1, фиг. 5. Юра. ФРГ.

1934. Принада, с. 40, рис. 7–9 в тексте. Верхний триас. Реки Кудары, Кокуйбельсу, Тузбель, Бахтанг, Памир.

1976. Иминов, с. 28, табл. 11; табл. 12, фиг. 1, 2; табл. 13, фиг. 1, 2. Верхний триас. Памир, Средняя юра. Юго-западные отроги Гиссарского хребта.

Pterophyllum cf. proinquum Goeppert

1961б. Маркович, табл. 21, фиг. 3. Средняя юра (орская и романкульская свиты). Магнитогорский синклинорий, Южный Урал.

Pterophyllum pshartense Prynada

1934. Принада, с. 43, табл. 8, фиг. 1; табл. 9, фиг. 1; табл. 10, фиг. 6; табл. 11, фиг. 3. Верхний триас? Р. Западный Пшарт, Памир.

1960. Сикстель, с. 76, табл. 2, фиг. 2–4. Верхний триас. Памир.

1962. Сикстель, табл. 1, фиг. 1. Верхний триас. Р. Западный Пшарт, Памир.

1976. Иминов, с. 29, табл. 14, фиг. 1–3; табл. 15, фиг. 1, 2. Верхний триас. Реки Ромсунос, Водинров, Бартанг, Кокуйбельсу, Памир.

Pterophyllum pterophylloides (Prynada) Krassilov

1956. Tyrmia pterophylloides. Принада, в кн.: Материалы по палеонтологии. . . , с. 242. Нижний мел (тырминская свита). Р. Тырма, Буреинский бассейн.

1969. Pterophyllum pterophylloides. Красилов, с. 109, табл. 13, фиг. 1–5. Там же.

Pterophyllum ptilum Harris

1932в. Harris, с. 61, табл. 5, фиг. 1–5, 11; рис. 30, 31. Верхний триас. Скоресби Саунд, Гренландия.

Pterophyllum aff. ptilum Harris

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 56, табл. 53, фиг. 1–6; табл. 54, фиг. 3. Верхняя юра. Грузия.

Pterophyllum cf. ptilum Harris

1971. Станиславский, с. 71, табл. 21, фиг. 9; табл. 22, фиг. 1; рис. 34. Верхний триас. Донбасс.

Pterophyllum rarinerve Prynada

1934. Принада, с. 47, табл. 10, фиг. 3, 4. Верхний триас? Р. Кокуйбельсу, Памир.

1976. Иминов, с. 29, табл. 15, фиг. 3, 4. Верхний триас. Реки Варзоб, Партыш, Памир.

Pterophyllum raripinnatum Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 55, табл. 51, фиг. 1–5; табл. 52, фиг. 1–6. Верхняя юра. Грузия.

Pterophyllum rigidum (Prynada) Krassilov

1956. Bureja rigida. Принада в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 237, табл. 47, фиг. 6. Верхняя юра – нижний мел. Буреинский бассейн.

1973. Pterophyllum rigidum. Красилов, с. 46, табл. 15, фиг. 1–7. Там же.

Pterophyllum rionense Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 57, табл. 54, фиг. 4; табл. 55, фиг. 1–6; табл. 56, фиг. 1–4. Верхняя юра. Грузия.

Pterophyllum sasykense Prynada

1934. Принада, с. 46, табл. 8, фиг. 4, 5. Верхний триас? Р. Сасык, Памир.

Pterophyllum sensinovianum Heer

1876в. Heer, с. 105, табл. 24, фиг. 8. Верхняя юра. Верховьер. Амура.

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 85, табл. 40, фиг. 3, Нижний мел. Буреинский бассейн.

Pterophyllum aff. sensinovianum Heer

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 86, табл. 37, фиг. 1–7. Нижний мел. Буреинский бассейн.

Pterophyllum cf. sixteliana (Tschastnikova) Iminov

1952. Tyrmia sixteliana. Частникова, с. 6, фиг. 3. Юра. Алайская долина, Южная Фергана.

1976. Pterophyllum cf. sixteliana. Иминов, с. 30, табл. 20, фиг. 14; табл. 21, фиг. 1, 2. Средняя юра. Шураб, Южная Фергана.

Pterophyllum subaequale Hartz

1896. Hartz, с. 236, табл. 15, фиг. 3, *1*. Верхний триас — нижняя юра. Гренландия.

Pterophyllum aff. subaequale Hartz

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 62, табл. 63, фиг. 1–5; табл. 64, фиг. 1–3. Верхняя юра. Грузия.

1973. Красилов, Шорохова, с. 22, табл. 6, фиг. 3–6. Нижняя юра. Приморье.

Pterophyllum sutschanense Prynada ex Samylina

1961. Самылина, с. 638, табл. 2, фиг. 5; табл. 4. Нижний мел. Южное Приморье.

1967. Красилов, с. 156, табл. 45, фиг. 1–5; рис. 20, *а, б*. Нижний мел. Приморье.

Pterophyllum tersjukense Batjaeva

1974а. Батяева, с. 63, табл. 1, фиг. 1, 2. Юра. Кузбасс.

Pterophyllum tietzei Schenk

1887. Schenk, с. 6, табл. 6, фиг. 27–29; табл. 11, фиг. 52. Верхний триас. Иран.

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 189, табл. 47, фиг. 1,2. Средняя юра. Туаркыр.

Pterophyllum aff. tietzei Schenk

1935. Принада, с. 219, рис. 3 в тексте. Нижняя юра. Бассейн р. Нарын. Средняя Азия.

Pterophyllum cf. tietzei Schenk

1976. Долуденко, Орловская, с. 62, табл. 23, фиг. 1; рис. 30. Нижняя юра. Акбулак, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pterophyllum tomiense Lebedev

1962. Лебедев И.В., с. 196, табл. 2, фиг. 2, 3. Юра. Кузбасс.

1970б. Тесленко, с. 144, табл. 31, фиг. 1. Нижняя юра (распадская свита). Кузбасс.

Pterophyllum tyrmense (Prynada) Krassilov

1912. Pterophyllum aequale. Новопокровский, с. 8, табл. 3, фиг. 3. Нижний мел. Буреинский бассейн.

1956. Turmia tyrmensis. Принада, в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 243, табл. 42, фиг. 2. Верхняя юра. Р. Тырма, Буреинский бассейн.

1969. Pterophyllum tyrmense. Красилов, с. 99, табл. 11, фиг. 1, 2, 4–7. Нижний мел. Буреинский бассейн.

Pterophyllum uzbekistanica Iminov

1976. Иминов, с. 30, табл. 21, фиг. 3–5; табл. 22; табл. 23, фиг. 1. Средняя юра (гурудская свита). Кугитанг, юго-западные отроги Гиссарского хребта.

Pterophyllum validum Hollick

1930. Hollick, с. 45, табл. 8, фиг. 1. Верхний мел. Аляска.

Pterophyllum aff. validum Hollick

1967. Красилов, с. 159, табл. 46, фиг. 5. Нижний мел. Приморье.

Pterophyllum sp.

1845. Goeppert in Murchison et al., с. 501, табл. G, фиг. 3, 5, 6, *а*. Мел? Окрестности Москвы.

1938а. Принада, с. 40, табл. 4, фиг. 1. Нижний мел. Р. Силяп — правый приток р. Ожогина, бассейн р. Колымы.

1963а. Генкина, с. 53, табл. 25, фиг. 2. Средняя юра. Восточный Урал.

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 65, табл. 69, фиг. 1—7. Верхняя юра. Грузия.

1970б. Тесленко, с. 145, табл. 31, фиг. 4, 5. Нижняя юра (осиновская свита). Кузбасс.

1971. Станиславский, с. 75, рис. 36, А. Верхний триас. Донбасс.

1971. Станиславский, с. 76, рис. 36, *В—Е*. Там же.

1976. Долуденко, Орловская, с. 103, табл. 61, фиг. 5, 6. Верхняя юра (боролсайская свита). Чохай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

1976. Станиславский, с. 123, рис. 51. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка, Донбасс.

Pterophyllum (?) sp.

1959б. Василевская, с. 60, табл. 8, фиг. 7. Нижний мел (ынгырская свита). Сангарский район, Ленский район.

1963. Василевская, Павлов, табл. 35, фиг. 4. Нижний мел. Ленский бассейн.

PTILOPHYLLUM MORRIS, 1840

Ptilophyllum acutifolium Morris

1840. Morris in Grant, с. 327, табл. 21, фиг. 1*а*—3. Юра. Кач, Индия.

1933б. Принада, с. 24, табл. 2, фиг. 1, 2; табл. 3, фиг. 7; табл. 4, фиг. 7. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

1934. Принада, с. 30, табл. 9, фиг. 2, 4. Верхний триас? Р. Бартанг, Памир.

1944. Турутанова-Кетова, с. 75, табл. 1, фиг. 5; табл. 4, фиг. 5. Нижняя — средняя юра. Мангышлак.

1966. Просвирякова, с. 90, табл. 15, фиг. 2. Средняя юра. Мангышлак.

1967. Делле, с. 90, табл. 16, фиг. 1—10. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 177, табл. 7, фиг. 9. Средняя юра. Кугитанг, Шураб, Средняя Азия.

1976. Иминов, с. 33, табл. 16, фиг. 1—7. Средняя юра. Южная Фергана, Гиссарский хребет.

Ptilophyllum aff. acutifolium Morris

1963а. Генкина, с. 55, табл. 27, фиг. 2. Средняя юра. Восточный Урал.

Ptilophyllum cf. acutifolium Morris

1961б. Маркович, табл. 15, фиг. 4. Средняя юра (катынадырская свита). Магнитогорский синклинорий, Южный Урал.

Ptilophyllum acutifolium Morris f. latum Delle

1967. Делле, с. 91, табл. 15, фиг. 7, 8. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

Ptilophyllum bajulae Krassilov

1967. Красилов, с. 148, табл. 38, фиг. 1—4; рис. 20,*е—з*. Нижний мел. Приморье.

Ptilophyllum brevilatiphyllum Feistmantel

1876с. Feistmantel, с. 15, табл. 4, фиг. 6. Юра. Кач, Индия.

Ptilophyllum aff. brevilatiphyllum Feistmantel

1936. Брик, с. 170, табл. 1, фиг. 8. Средний — верхний триас. Мадыген, Средняя Азия.

Ptilophyllum caucasicum Doludenko et Svanidze

1964. Долуденко, Сванидзе, с. 113, табл. 1, фиг. 1—13; табл. 2, фиг. 1—10. Средняя, верхняя юра. Грузия.

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 65, табл. 70, фиг. 1—10; табл. 71, фиг. 1—9. Верхняя юра. Грузия.

1975. Баранова, Киричкова, Зауер, с. 124, табл. 23, фиг. 5, 6; табл. 25, фиг. 1—6. Средняя юра. Бассейн р. Эмбы, Южная Фергана.

1976. Долуденко, Орловская, с. 96, табл. 49, фиг. 1—6; табл. 50, фиг. 1—6; табл. 51, фиг. 1—9; табл. 52, фиг. 17; табл. 53, фиг. 1, а. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Ptilophyllum cutchense Morris

1840. Morris in Grant, с. 327, табл. 21, фиг. 4. Юра. Кач, Индия.

1930. Турутанова-Кетова, с. 144, табл. 2, фиг. 14—17; табл. 3, фиг. 22, 23. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1933б. Принада, с. 25, табл. 2, фиг. 3, 11; табл. 3, фиг. 8, 11. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

1952. Брик, с. 60, табл. 21, фиг. 1, 2. Средняя юра. Бассейн р. Илека. Западный Казахстан.

1953б. Сикстель, с. 131, табл. 4, фиг. 5*а*; табл. 7, фиг. 6*в*. Средняя юра (свита А). Ягман, Средняя Азия.

1961б. Маркович, табл. 20, фиг. 3, 4. Средняя юра (орская и романкульская свиты). Магнитогорский синклинорий, Южный Урал.

1961а. Маркович, табл. 29, фиг. 1—5,7. Средняя юра (илецкая свита). Яйсан, бассейн р. Илека.

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 181, табл. 38, фиг. 8, 9; табл. 39, фиг. 1—6; табл. 40, фиг. 1—4; рис. 77. Средняя юра. Туаркыр.

1963а. Генкина, с. 54, табл. 25, фиг. 3—9; табл. 26, фиг. 1—7; табл. 27, фиг. 1. Средняя юра. Восточный Урал.

1966. Просвирякова, с. 90, табл. 15, фиг. 3. Средняя юра. Мангышлак.

1967. Делле, с. 91, табл. 15, фиг. 11—13. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

1971. Маркович, с. 84, табл. 7, фиг. 3—8. Средняя юра (илецкая свита). Бассейн р. Илека.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 177, табл. 9, фиг. 3. Средняя юра. Кугитанг и Шураб, Средняя Азия.

1976. Иминов, с. 34, табл. 17, фиг. 1—7; табл. 18, фиг. 1—10. Средняя юра. Северная и Южная Фергана, Гиссарский хребет.

Ptilophyllum (?) dahuricum Prynada

1962. Принада, с. 156, табл. 8, фиг. 5. Юра. Восточное Забайкалье.

Ptilophyllum kazachstanicum Genkina

1963а. Генкина, с. 57, табл. 27, фиг. 3—7. Средняя юра. Восточный Урал.

Ptilophyllum marginatum Prosvirjakova

1966. Просвирякова, с. 91, табл. 15, фиг. 4—7. Средняя юра. Мангышлак.

Ptilophyllum okribense Doludenko et Svanidze

1964. Долуденко, Сванидзе, с. 116, табл. 3, фиг. 1–12; табл. 4, фиг. 8. Средняя юра. Грузия.

Ptilophyllum okribense f. ratchiana Doludenko et Svanidze

1964. Долуденко, Сванидзе, с. 118, табл. 4, фиг. 1–12. Верхняя юра. Грузия.

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 67, табл. 73, фиг. 1–11. Там же.

Ptilophyllum pecten (Phillips) Morris

1829. Cycadites pecten. Phillips, табл. 7, фиг. 22. Средняя юра. Англия.

1841. Ptilophyllum pecten. Morris, стр. 117. Там же.

1962. Принада, с. 156, рис. 27,*Б*. Верхняя юра – нижний мел. Восточное Забайкалье.

Ptilophyllum sibiricum Samylina

1968. Полевой атлас ..., с. 140, табл. 58, фиг. 1–8. Нижняя юра. Бассейн р. Омолон, Северо-Восток СССР.

Ptilophyllum sokalense Doludenko

1963а. Долуденко, с. 798, табл. 1, фиг. 1–13; табл. 2, фиг. 7. Верхи средней – низы верхней юры. Украина.

Ptilophyllum ukrainense Doludenko

1963а. Долуденко, с. 801, табл. 2, фиг. 1–6; табл. 3, фиг. 1–5. Верхи средней – низы верхней юры. Украина.

Ptilophyllum sp.

1963а. Долуденко, с. 802, табл. 4, фиг. 1–10. Верхи средней – низы верхней юры. Украина.

Sphenozamites (Brongniart) Miquel, 1851

Sphenozamites beanii (Lindley et Hutton) Miquel

1832 (1831–1837). Cyclopteris beanii Lindley and Hutton, с. 127, табл. 44. Средняя юра. Англия.

1851. Sphenozamites beanii Miquel, с. 210. Там же.

Sphenozamites sphenozamioides (Turutanova–Ketova) Doludenko

1930. Otozamites sphenozamioides. Турутанова-Кетова, с. 149, табл. 5, фиг. 31–34. Верхняя юра. Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

1974. Sphenozamites sphenozamioides. Долуденко, с. 562, табл. 1, фиг. 1–6. Там же.

1976. Долуденко, Орловская, с. 101, табл. 60, фиг. 1–6. Верхняя юра (карабастауская свита) Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Sphenozamites surakaicus Prynada ex Brick

1952. Брик, стр. 41, табл. 14, фиг. 8,9. Верхи среднего – верхний триас (курашайская свита). Р. Илек, Западный Казахстан.

Sphenozamites vachrameevii Doludenko

1974. Долуденко, с. 563, табл. 2, фиг. 1–6. Верхняя юра. Краснодар.

Sphenozamites sp.

1967. Красилов, с. 152, табл. 43, фиг. 4, 5. Нижний мел. Приморье.

Tyrmia[1] Prynada, 1956

Tyrmia tyrmensis Prynada

1912. Pterophyllum aequale. Новопокровский, с. 8, табл. 3, фиг. 3. Нижний мел. Р. Тырма, Буреинский бассейн.

1956. Tyrmia tyrmensis. Принада, в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 243, табл. 42, фиг. 2. Верхняя юра. Р. Тырма, Буреинский бассейн.

1959б. Василевская, с. 62, табл. 10, фиг. 1. Нижний мел (чонгургасская свита). Сангарский район, Ленский бассейн.

Tyrmia aff. tyrmensis Prynada

1963. Самылина, с. 92, табл. 21, фиг. 4; рис. 9. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

Tyrmia abdullaevii Iminov

1968б. Иминов, с. 80, рис. *а–г* в тексте. Нижняя юра. Кугитанг, Средняя Азия.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 178, табл. 8, фиг. 4–7. Нижняя юра. Кугитанг, Средняя Азия.

Tyrmia acuta Vassilevskaja

1959б. Василевская, с. 61, табл. 9, фиг. 1. Нижний мел (чонгургасская свита). Сангарский район, Ленский бассейн.

Tyrmia angustiloba Brick ex Sixtel

1952. Сикстель, с. 37, табл. 9, фиг. 5; табл. 13, фиг. 6. Нижняя – средняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.

Tyrmia (?) cingulata Burakova

1966. Буракова, с. 140, табл. 9, фиг. 1–22. Средняя юра (нижняя угленосная толща). Туаркыр.

Tyrmia pectiniformis Prynada

1956. Принада, в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 242, 244. Верхняя юра – нижний мел. Буреинский бассейн.

1971. Маркович, с. 85, табл. 7, фиг. 9, 10. Средняя юра (орская свита). Орский бассейн.

Tyrmia polynovii (Novopokrovsky) Prynada

1912. Dioonites polynovii. Новопокровский, с. 9, табл. 3, фиг. 6. Нижний мел. Буреинский бассейн.

1956. Tyrmia polynovii. Принада, в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 242. Верхняя юра – нижний мел. Буреинский бассейн.

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 87, табл. 38, фиг. 1, 2. Нижний мел. Буреинский бассейн.

1963. Самылина, с. 92, табл. 22, фиг. 5, 6. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

Tyrmia cf. polynovii (Novopokrovsky) Prynada

1962. Тесленко, с. 127, табл. 17, фиг. 7; рис. 32. Верхняя юра (верхи тюменской свиты). Томская обл., Западная Сибирь.

---

[1] В.А. Красилов (1969) указал на ошибочность выделения рода Tyrmia. Вид T. polynovii он перевел в род Pseudocycas, а все остальные виды этого рода, в том числе и типовой, включил в состав Pterophyllum.

1970б. Тесленко, с. 145, табл. 31, фиг. 2; табл. 50, фиг. 16. Юра (верхи тюменской свиты). Западно-Сибирская низменность.

Tyrmia prynadae Vassilevskaja

1966. Василевская, Абрамова, с. 77, табл. 1, фиг. 6, 7. Нижний мел. Ленский бассейн.

Tyrmia pterophylloides Prynada

1912. Dioonites sp. Новопокровский, с. 10, табл. 3, фиг. 5. Нижний мел. Буреинский бассейн.

1956. Tyrmia pterophylloides. Принада в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 242. Верхняя юра — нижний мел. Буреинский бассейн.

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 88, табл. 38, фиг. 3—5; рис. 25. Нижний мел. Буреинский бассейн.

Tyrmia sixteliana Tschastnikova

1952. Частникова, с. 6, фиг. 3. Юра. Алайская долина. Южная Фергана.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 178, табл. 9, фиг. 1, 2. Нижняя юра. Шураб, Средняя Азия.

Tyrmia solsberiensis Budantsev et Sveshnikova

1969. Свешникова, Буданцев, с. 60, табл. 12, фиг. 8—11; табл. 13, фиг. 2—12; табл. 14, фиг. 1—7; табл. 15; табл. 19, фиг. 1; табл. 20, фиг. 1; рис. 11. Нижний мел. О-в Солсбери, Земля Франца Иосифа.

Tyrmia sp.

1963. Самылина, с. 93, табл. 16, фиг. 6. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

Weltrichia C.F.W. Braun, 1848

Weltrichia mirabilis Braun C.F.W.

1847. Braun C.F.W., с. 86. Верхний триас — нижняя юра. ФРГ.

1849. Braun C.F.W., с. 710, табл. 2, фиг. 1—3. Там же.

Weltrichia auliensis Doludenko

1976. Долуденко, Орловская, с. 95, табл. 48, фиг. 1—5. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Weltrichia sp.

1971. Станиславский, с. 63, табл. 34, фиг. 2—4; рис. 27. Верхний триас. Донбасс.

Wielandiella Nathorst, 1910=Wielandia Nathorst, 1909

Wielandiella angustifolia Nathorst

1880. Williamsonia angustifolia. Nathorst, с. 50, табл. 8, фиг. 8—10. Верхний триас. Швеция.

1909. Wielandia angustifolia. Nathorst, с. 22, табл. 5, 6; рис. 4. Там же.

1910. Wielandiella angustifolia. Nathorst.

Wielandiella dubia Turutanova—Ketova

1963. Турутанова-Кетова, с. 38, табл. 1, фиг. 11; табл. 3, фиг. 11, 12; рис. 12. Верхний триас. Бассейн р. Илека, Казахстан.

Wielandiella kryshtofovichii Prynada

1932. Криштофович, Принада, с. 371, табл. 1, фиг. 3. Нижний мел. Южное Приморье.

Wielandiella masculina (Turutanova-Ketova) Turutanova-Ketova

1930. Bennettitanthus masculinus. Турутанова-Кетова, с. 151, табл. 5, фиг. 38, 38*а*. Верхняя юра. Пос. Галкино (Успенское), хребет Каратау, Южный Казахстан.

1963. Wielandiella masculina. Турутанова-Кетова, с. 38, табл. 1, фиг. 18. Там же.

Wielandiella sp.

1975. Баранова, Киричкова, Зауер, с. 125, табл. 26, фиг. 7—11. Средняя юра. Северная Эмба, Западный Казахстан.

Williamsonia Carruthers, 1870

Williamsonia gigas (Lindley et Hutton) Carruthers

1835 (1831—1837). Zamia gigas. Lindley, Hutton, с. 45, табл. 165. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

1870b. Williamsonia gigas. Carruthers, с. 693. Там же.

Williamsonia armenica Prynada in Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова, с. 16, табл. 1, фиг. 7, 8; табл. 3, фиг. 18. Верхний триас. Армения.

Williamsonia brickae Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова, с. 17, табл. 3, фиг. 2—6. Юра — нижний мел. Ташкутан, Таджикистан. Бассейн р. Буреи.

Williamsonia haydenii Seward

1912. Seward, с. 26, табл. 3, фиг. 44; табл. 8, фиг. 8,*В*. Средняя юра. Нарынский район, Киргизия.

1934. Криштофович, Принада, с. 65, рис. 27, 2. Юра. Нарынский район. Киргизия.

1963. Турутанова-Кетова, с. 18, табл. 2, фиг. 8, 9. Средняя юра (нижняя продуктивная свита). Бассейн р. Нарына, Киргизия.

1968б. Иминов, с. 98, табл. 35, фиг. 1—4. Верхний триас. Памир. Нижняя юра. Гиссарский хребет.

1976. Долуденко, Орловская, с. 57, табл. 19, фиг. 9, 10. Средняя юра. Боролдай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

1976. Иминов, с. 16, табл. 1, фиг. 1—6. Верхний триас. Р. Бартанг, Памир, Нижняя юра. Реки Нарын, Ташкумыр, Средняя Азия.

Williamsonia cf. haydenii Seward

1963. Турутанова-Кетова, с. 19, табл. 2, фиг. 7. Верхний триас. Р. Бартанг, Памир.

Williamsonia kazachstanica Turutanova-Ketova

1944. Williamsonia sp. Турутанова-Кетова, с. 78, табл. 1, фиг. 1. Средняя юра. Мангышлак.

1963. Williamsonia kazachstanica. Турутанова-Кетова, с. 19, табл. 3, фиг. 1, 16; табл. 7, фиг. 7, 8. Средняя юра. Мангышлак. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Williamsonia pacifica Kryshtofovich

1919. Williamsonia sp. Kryshtofovich, с. 3, рис. 1. Нижний мел (никанский ярус). Мыс Фирсова к северу от Владивостока, Приморье.

1932. Williamsonia pacifica. Криштофович, Принада, с. 371. рис. 1 в тексте. Нижний мел. Южное Приморье.
1933. Криштофович, с. 134, табл. 15, фиг. 1. Нижний мел. Сибирь.
1934. Криштофович, Принада, с. 65, рис. 27. Нижний мел. Южное Приморье.
1963. Турутанова-Кетова, с. 20, табл. 5, фиг. 3; табл. 6, фиг. 1. Нижний мел. Окрестности г. Владивостока.

Williamsonia pecten (Phillips) Carruthers

1829. Cycadites pecten. Phillips, с. 148, табл. 7, фиг. 22. Средняя юра. Йоркшир, Англия.
1870b. Williamsonia pecten. Carruthers, с. 694. Там же.
1907. Сьюорд, с. 10, табл. 3, фиг. *Д, Е*. Юра. Кавказ.
1907. Сьюорд, с. 31, табл. 8, фиг. 74. Юра. Средняя Азия.
1911. Томас, с. 35, табл. 5, фиг. 8, 9; табл. 8, фиг. 4. Средняя юра. Каменка, Донбасс.
1913. Криштофович, с. 43, рис. 5. Юра. Крым.
1957. Станиславский, с. 51, табл. 9, фиг. 1–3. Средняя юра. Донбасс. Днепровско-Донецкая впадина.

Williamsonia philatovii Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова, с. 21, табл. 3, фиг. 14, 15. Нижний мел. Магаданская обл.
1976. Самылина, с. 51. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Williamsonia prynadae Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова, с. 22, табл. 1, фиг. 9, 10. Верхняя юра – нижний мел. Бассейн р. Буреи.

Williamsonia samylinae Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова, с. 23, табл. 5, фиг. 1. Нижний мел. Бассейн р. Алдана, Якутия.

Williamsonia subtilis Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова, с. 24, табл. 2, фиг. 15–17; рис. 3. Верхний триас. Бассейн р. Илека, Казахстан.

Williamsonia turkomanica Prynada ex Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова, с. 24, табл. 1, фиг. 20; табл. 2, фиг. 1–6. Нижняя средняя юра. Мангышлак.

Williamsonia whitbiensis Nathorst

1911a. Nathorst, с. 9, табл. 2, фиг. 1–15; табл. 3, фиг. 2–7. Средняя юра. Уитби, Англия.
1963. Турутанова-Кетова, с. 26, табл. 4, фиг. 12. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.
1967. Делле, с. 87, табл. 14, фиг. 3*а*. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

Williamsonia sp.

1944. Турутанова-Кетова, с. 78, табл. 1, фиг. 1. Нижняя – средняя юра. Мангышлак.
1962. Лебедев И.В., с. 189, табл. 4, фиг. 4–6. Юра. Р. Томь, Кузбасс.
1963. Турутанова-Кетова, с. 27, табл. 1, фиг. 16, 17; рис. 4, 5. Верхний триас. Армения.

1963. Турутанова-Кетова, с. 28, табл. 4, фиг. 10, 11; рис. 6. Нижняя юра. Шураб, Южная Фергана.
1963. Турутанова-Кетова, с. 28, табл. 3, фиг. 13; рис. 7. Нижний мел. Бассейн р. Алдана.
1967. Делле, с. 88, табл. 14, фиг. 4, 5. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

Williamsonia (?) sp.

1963а. Генкина, с. 57, табл. 24, фиг. 5, 6; табл. 25, фиг. 1. Средняя юра. Восточный Урал.

Williamsoniella Thomas, 1915

Williamsoniella coronata Thomas

1915. Thomas, с. 115, табл. 12, фиг. 1—3, 5—10; табл. 13, фиг. 11—20; табл. 14, фиг. 21—29; рис. 1—5. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

Williamsoniella burakovae Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова, с. 30, табл. 2, фиг. 10—14. Средняя юра (угленосная толща). Туаркыр, Туркмения.

Williamsoniella czochaiensis Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова, с. 31, табл. 1, фиг. 19. Верхняя юра. Чохай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Williamsoniella elegans Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова, с. 32, табл. 1, фиг. 12, 13; рис. 8. Нижняя юра. Туаркыр, Туркмения.

Williamsoniella ferganensis Brick in Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова, с. 32, табл. 1, фиг. 1—6; табл. 3, фиг. 7, 8, 10. Нижняя юра. Шураб, Южная Фергана.
1971. Худайбердыев, Гомолицкий, Лобанова, с. 14, табл. 3, фиг. 1*а*—4. Нижняя — средняя юра. Сулюкта, Южная Фергана.

Williamsoniella karataviensis Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова, с. 34, табл. 4, фиг. 1—9; табл. 7, фиг. 1—6; рис. 9. Верхняя юра. Чохай, хребет Каратау, Южный Казахстан.
1976. Долуденко, Орловская, с. 95, табл. 47, фиг. 1—10. Верхняя юра (боролсайская свита). Чохай (карабастауская свита) Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Williamsonia minima Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова, с. 35, табл. 1, фиг. 14, 15; рис. 10. Средняя — верхняя юра. Канский бассейн, бассейн р. Амура.

Williamsoniella sibirica Teslenko

1964. Тесленко, с. 161, рис. 1. Верхняя юра. Тюменская обл. Западная Сибирь.
1970б. Тесленко, с. 142, табл. 30, фиг. 1. Верхняя юра (половинкинская свита). Западно-Сибирская низменность.

Williamsoniella vachrameevii Orlovskaja

1976. Долуденко, Орловская, с. 56, табл. 18, фиг. 5—7; рис. 25, *а—д*. Нижняя юра. Куркурей, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Williamsoniella sp.

1919. Kryshtofovish, с. 2, фиг. 1. Юра. Мыс Фирсова, Южное Приморье.
1973. Могучева, с. 85, табл. 38, фиг. 2—4. Нижний триас. Тунгусский бассейн.

Williamsoniella sp. A

1963. Турутанова-Кетова, с. 36, табл. 3, фиг. 17. Верхняя юра. Чохай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Williamsoniella sp. B

1963. Турутанова-Кетова, с. 36, табл. 3, фиг. 9; рис. 11. Нижняя юра. Шураб, Южная Фергана.

Zamiophyllum Nathorst, 1890

Zamiophyllum buchianum (Ettingshausen) Nathorst

1852a. Pterophyllum buchianum. Ettingshausen, с. 21, табл. 1, фиг. 1. Нижний мел. Западная Европа.
1890. Zamiophyllum buchianum. Nathorst, с. 46, табл. 2, фиг. 1, 2. Нижний мел. Япония.
1967. Красилов, с. 145, табл. 35, фиг. 1, 2; табл. 37, фиг. 1. Нижний мел. Приморье.
1976. Долуденко, Орловская, с. 99, табл. 58, фиг. 4—6; табл. 59, фиг. 1. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Zamiophyllum ivanovii (Kryshtofovich et Prynada) Krassilov

1932. Zamites ivanovii. Криштофович, Принада, с. 369. Нижний мел. Приморье.
1967. Zamiophyllum ivanovii. Красилов, с. 145, табл. 35, фиг. 1, 2; табл. 37, фиг. 1. Там же.

Zamites Brongniart, 1828

Zamites gigas (Lindley et Hutton) Morris

1835 (1831—1837). Zamia gigas. Lindley, Hutton, с. 45, табл. 165. Средняя юра. Скарборо, Англия.
1841. Zamites gigas. Morris, с. 116. Там же.

Zamites bechei Brongniart

1825. Filicites bechei. Brongniart, с. 422, табл. 19, фиг. 4. Юра. Англия.
1828. Zamites bechei. Brongniart, с. 94, 195, 199. Там же.

Zamites aff. bechei Brongniart

1865 (1860—1868). Eichwald, с. 38, табл. 2, фиг. 9. Средняя юра. Изюм, Каменка, Донбасс.

Zamites (Subzamites) borealis Heer

1883. Heer, с. 66, табл. 14, 15. Нижний мел. Гренландия.
1967. Красилов, с. 146, табл. 37, фиг. 2—4; рис. 19, *б—в*. Нижний мел (липовецкая свита). Приморье.

Zamites buchianus (Ettingshausen) Seward

1852a. Pterophyllum buchianum. Ettingshausen, с. 21, табл. 1, фиг. 1. Нижний мел. Силезия.

1895. Zamites buchianus. Seward, с. 79, табл. 3, фиг. 1—5; табл. 4, фиг. 1—5; табл. 8, фиг. 1. Нижний мел. Англия.
1930. Турутанова-Кетова, с. 152, табл. 6, фиг. 39—42. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Zamites corrugatus Prynada ex Stanislavsky

1971. Станиславский, с. 77, табл. 21, фиг. 1—5; рис. 36,*3*. Верхний триас. Донбасс.

Zamites dahuricus Prynada

1962. Принада, с. 158, табл. 8, фиг. 1—3; рис. 28, 29. Верхняя юра — нижний мел. Восточное Забайкалье.

Zamites denticulatus (Thomas) Stanislavsky

1911. Nilssonia denticulata. Томас, с. 12, табл. 7, фиг. 3, 4. Средняя юра. Каменка, Донбасс.
1957. Zamites denticulatus. Станиславский, с. 64, табл. 9, фиг. 10. Средняя юра. Каменка, Донбасс.

Zamites ivanovvi Kryshtofovich et Prynada

1932. Криштофович, Принада, с. 369. Нижний мел. Южное Приморье.
1961. Самылина, с. 636, табл. 2, фиг. 2—4. Нижний мел. Бассейн р. Раздольной. Южное Приморье.

Zamites lanceolatus (Lindley et Hutton) Braun

1837 (1831—1837) Zamia lanceolata. Lindley et Hutton, с. 194. Средняя юра. Англия.
1840. Zamites lanceolatus. Braun, с. 100. Там же.
1865 (1860—1868). Eichwald, с. 40, табл. 3, фиг. 1. Юра. Бассейн р. Зеравшана, Средняя Азия.

Zamites longipennulis Samylina

1961. Самылина, с. 637, табл. 3, фиг. 5—7. Нижний мел. Бассейн р. Раздольной. Южное Приморье.

Zamites vachrameevii Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 67, табл. 74, фиг. 1—3; табл. 75, фиг. 1—5; табл. 76, фиг. 1—4. Верхняя юра. Грузия.

Zamites weberi Seward

1907. Сьюорд, с. 11, табл. 2, фиг. 19; табл. 3, фиг. F. Юра. Кавказ.

Zamites sp.

1930. Турутанова-Кетова, с. 153, табл. 6, фиг. 45. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1948. Вахрамеев, с. 14, рис. 10. Нижний мел. Р. Кульденен-Темир, Западный Казахстан.
1976. Иминов, с. 32, табл. 23, фиг. 4. Средняя юра. Ташкутан, Гиссарский хребет.

Zamites (?) sp.

1952. Вахрамеев, с. 169, табл. 9, фиг. 11. Нижний мел. Р. Кульденен-Темир, Западный Казахстан.

ПОРЯДОК CYCADALES. ЦИКАДОВЫЕ

Aldania Samylina, 1956

Aldania vachrameevii Samylina

1956б. Самылина, с. 1339, табл. 1, фиг. 1; рис. 2. Нижний мел. Р. Алдан.

1963. Самылина, с. 82, табл. 16, фиг. 7; рис. 6. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

Aldania aff. vachrameevii Samylina

1959б. Василевская, с. 50, табл. 1, фиг. 2, 3. Нижний мел (ынгырская свита). Сангарский район, Ленский бассейн.

Aldania auriculata Samylina

1956б. Самылина, с. 1337, табл. 1, фиг. 6, 7; рис. 1 в тексте. Нижний мел. Р. Алдан.

1963. Василевская, Павлов, табл. 6, фиг. 7–10, Нижний мел. Ленский бассейн.

1963. Самылина, с. 81, табл. 16, фиг. 8–10; рис. 5. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

1966. Василевская, с. 59, табл. 2, фиг. 5, 6. Нижний мел. Жиганский район, Ленский бассейн.

Aldania umanskii Vachrameev et E. Lebedev

1968. Лебедев Е.Л., с. 52, табл. 2, фиг. 2, 4, 5; табл. 3, фиг. 2, 3; рис. 10, 11. Нижний мел. Западное Приохотье, Якутия.

1970. Абрамова, с. 44, табл. 4, фиг. 6–8. Нижний мел. (кюсюрская свита). Жиганский район, Ленский бассейн.

Aldania sp.

1959б. Василевская, с. 51, табл. 1, фиг. 4–7. Нижний мел (ынгырская свита). Сангарский район, Ленский бассейн.

Aldania (?) sp.

1970. Абрамова, с. 45, табл. 4, фиг. 1. Нижний мел (кюсюрская свита. Жиганский район, Ленский бассейн.

Amuriella Prynada, 1956[1]

Amuriella extra Prynada

1956. Принада, в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 230, табл. 35, фиг. 5. Верхняя юра. Буреинский бассейн.

Androstrobus Schimper, 1870

Androstrobus zamioides Saporta in Schimper

1870 (1869–1874). Schimper, с. 199, табл. 72, фиг. 1, 2. Средняя юра. Франция.

Androstrobus jamnitschenkoi Stanislavsky

1957. Станиславский, с. 65, табл. 11, фиг. 1, 2. Средняя юра. Днепровско-Донецкая впадина.

---

[1] Рассматривается как синоним рода Heilungia.

Androstrobus sibiricus Heer

1876b. Heer, с. 47, табл. 4, фиг. 14, 15. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

Anthrophyopsis Nathorst, 1878

Anthrophyopsis nilssonii Nathorst

1878a. Nathorst, с. 43, табл. 7, фиг. 5; табл. 8, фиг. 6. Верхний триас. Франция.

Anthrophyopsis crassinervis Nathorst

1878a. Nathorst, с. 44, табл. 7, фиг. 3, 4 (?); табл. 11, фиг. 5?, 6. Верхний триас. Швеция.

1958. Владимирович, с. 1761, табл. 1, фиг. 1, 2. Верхний триас. Западный Памир.

Anthrophyopsis miassica Vladimirovich

1958. Владимирович, с. 1762, табл. 1, фиг. 3. Верхний триас. Челябинский бассейн, Восточный Урал.

Anthrophyopsis narulensis Doludenko et Svanidze

1970. Долуденко, Сванидзе, с. 560, табл. 1, фиг. 1–5; табл. 2, фиг. 1–7; рис. 1. Нижняя юра. Грузия.

Beania Carruthers, 1869.

Beania gracilis Carruthers

1869. Carruthers, с. 97, табл. 4, фиг. 1. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

Beania sp.

1957. Станиславский, с. 67, табл. 11, фиг. 5. Средняя юра. Сухая Каменка, Донбасс.

Ctenis Lindley et Hutton, 1834

Ctenis falcata Lindley et Hutton

1834 (1831–1837). Lindley, Hutton, с. 63, табл. 103. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

Ctenis angrenica Gomolitzky

1974. Гомолицкий, с. 1202, табл. 2, фиг. 1–6. Средняя юра (ангренская свита). Ангрен, Узбекистан.

Ctenis anyuensis Philippova

1972в. Филиппова, с. 279, табл. 1, фиг. 1; табл. 2, фиг. 1; табл. 3, фиг. 1, 2. Верхняя юра. Северо-восток СССР.

Ctenis aff. borealis (Dawson) Bell

1972в. Филиппова, с. 282, табл. 4, фиг. 1. Верхняя юра. Северо-Восток СССР.

Ctenis burejensis Prynada

1934. Криштофович, Принада, с. 70. рис. 25, *2*. Верхняя юра (талынжанская свита). Буреинский бассейн.

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 89, табл. 39, фиг. 1, 2; табл. 40, фиг. 2; рис. 26 в тексте. Верхняя юра. Буреинский бассейн.

Ctenis burejensis f. typica Prynada

1963. Самылина, с. 82, табл. 16, фиг. 7, рис. 6. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

Ctenis dahurica Prynada

1962. Принада, с. 165, рис. 33. Нижняя — средняя юра. Восточное Забайкалье.

Ctenis formosa Vachrameev

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 91, табл. 41, фиг. 1, 2; рис. 27. Нижний мел. Буреинский бассейн.

Ctenis gigantea Brick ex Sixtel

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 179, табл. 10, фиг. 2. Нижняя и средняя юра. Шураб, Южная Фергана.

1976. Иминов, с. 35, табл. 24, фиг. 1—4. Средняя юра. Шураб, Южная Фергана.

Ctenis harrisii Vachrameev

1971. Вахрамеев, Блинова, с. 93, табл. 10, фиг. 2, 3. Нижний мел (ундытканская свита). Бассейн р. Сутам, Становой хребет.

Ctenis intermedia (Kryshtofovich et Prynada) Samylina

1932. Ctenophyllum intermedium. Криштофович, Принада, с. 369. Нижний мел. Южное Приморье.

1963. Ctenis intermedia. Самылина, с. 84, табл. 14, фиг. 4. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

Ctenis jacutensis Vassilevskaja

1959б. Василевская, с. 51, табл. 1, фиг. 8; табл. 2, фиг. 1—4; табл. 3, фиг. 1, 2; табл. 4, фиг. 1, 2. Нижний мел (чонгургасская свита). Сангарский район, Ленский бассейн.

Ctenis kaneharai Yokoyama

1906. Yokoyama, с. 29, табл. 9, фиг. 1, 1*A*. Средняя юра. Китай.

1961б. Маркович, табл. 20, фиг. 1. Средняя юра (орская и романкульская свиты). Магнитогорский синклинорий, Южный Урал.

1973. Красилов, с. 48, табл. 16, фиг. 1—5. Нижний мел (солонийская и чемчукинская свиты). Буреинский бассейн.

Ctenis kirgisica Brick ex Gomolitzky

1961. Гомолицкий, с. 398, табл. 4, фиг. 1—4. Нижняя юра (туюкская свита). Ферганский хребет.

1976. Иминов, с. 36, табл. 24, фиг. 5, 6; табл. 25, фиг. 1, 2; табл. 26, фиг. 1—3. Нижняя юра (туюкская свита). Р. Туюк, Ферганский хребет.

Ctenis kushlinii Iminov

1971. Иминов, с. 11, табл. 1, фиг. 5. Верхний триас. Сарезское озеро, Памир.

1976. Иминов, с. 36, табл. 27, фиг. 1. Верхний триас. Р. Водинров, Сарезское озеро, Памир.

Ctenis latiloba Kryshtofovich et Prynada

1932. Криштофович, Принада, с. 368, табл. 2, фиг. 1. Нижний мел. Приморье.

1967. Красилов, с. 165, табл. 53, фиг. 4, 5. Нижний мел. Приморье.
1963. Самылина, с. 83, табл. 13, фиг. 1. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

Ctenis nana Samylina

1963. Самылина, с. 83, табл. 18, фиг. 1; табл. 20, фиг. 8,*б*. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

Ctenis orientalis Heer

1876b. Heer, с. 105, табл. 22, фиг. 2. Верхняя юра. Р. Бурея.

Ctenis orovilensis Fontaine

1900. Fontaine in Ward, с. 357, табл. 58, фиг. 4. Нижний мел. США.

Ctenis cf. orovillensis Fontaine

1961. Вахрамеев, Долуденко, стр. 92, табл. 40, фиг. 1. Нижний мел. Буреинский бассейн.

Ctenis paljavaensis Philippova

1972б. Филиппова, с. 38, табл. 1, фиг. 6, табл. 2, фиг. 1. Мел. Северо-Восток СССР.

Ctenis parvifolia Iminov

1972. Иминов, в кн.: Новые виды. . . , с. 321, табл. 74, фиг. 3, 4. Средняя юра. Гиссарский хребет.
1976. Иминов, с. 37, табл. 27, фиг. 2–4; табл. 28, фиг. 1–4. Средняя юра. Гиссарский хребет.

Ctenis pleschkovii Genkina

1963а. Генкина, с. 69, табл. 35, фиг. 4; табл. 36, фиг. 1, 2. Средняя юра. Восточный Урал.

Ctenis pontica Delle

1967. Делле, с. 93, табл. 17, фиг. 7, 8; табл. 18, фиг. 1–3. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

Ctenis rarinervis Kiritchkova

1966. Киричкова, Сластенов, с. 163, табл. 1, фиг. 1. Нижний мел (батылыхская свита). Р. Леписке, Западное Приохотье.

Ctenis stanovensis Vachrameev et Blinova

1971. Вахрамеев, Блинова, с. 91, табл. 10, фиг. 1. Нижний мел (ундытканская свита). Бассейн р. Сутам, Становой хребет.

Ctenis sulcicaulis (Phillips) Ward

1829. Cycadites sulcicaulis. Phillips, с. 119, табл. 7, фиг. 21,*а*. Средняя юра. Йоркшир, Англия.
1905. Ctenis sulcicaulis. Ward, с. 113, табл. 25, фиг. 9; табл. 26. Юра. Орегон, США.
1944. Турутанова-Кетова, с. 78, табл. 3, фиг. 1. Нижняя–средняя юра. Мангышлак.
1963. Самылина, с. 85, табл. 15, фиг. 1. Нижний мел. Низовья р. Алдана.
1973. Красилов, Шорохова, с. 20, табл. 7, фиг. 1, 2; табл. 8, фиг. 3. Нижняя юра. Приморье.

Ctenis cf. sulcicaulis (Phillips) Ward

1961. Просвирякова, с. 156, табл. 8, фиг. 8; табл. 9, фиг. 5. Нижний мел (холодниканская свита). Южная Якутия.

1971. Маркович, с. 86, табл. 8, фиг. 2, 3. Средняя юра (орская свита). Орский бассейн.

Ctenis tigyensis Vassilevskaja

1963. Василевская, Павлов, табл. 7, фиг. 1, 2. Нижний мел (кюсюрская свита). Ленский бассейн.

1966. Василевская, Абрамова, с. 78, табл. 3, фиг. 4; табл. 4, фиг. 1–5. Нижний мел. Ленский бассейн.

Ctenis tutujassica Batjaeva

1974в. Батяева, с. 114, табл. 1, фиг. 1, *а–в*. Средняя юра. Кузбасс.

Ctenis uralensis Genkina

1963а. Генкина, с. 69, табл. 35, фиг. 2, 3. Средняя юра. Восточный Урал.

Ctenis yokoyamae Kryshtofovich

1932. Криштофович, Принада, с. 368, табл. 2, фиг. 2. Нижний мел. Приморье.

1967. Красилов, с. 167, табл. 52, фиг. 2. Нижний мел. Приморье.

1961. Просвирякова, с 155, табл. 9, фиг. 1. Нижний мел (холодниканская свита). Южная Якутия.

Ctenis cf. yokoyamae Kryshtofovich

1973. Красилов, Шорохова, с. 21, табл. 8, фиг. 2. Нижняя юра. Приморье.

Ctenis zeuschneri Raciborski

1894. Raciborski, с. 60, табл. 16, фиг. 1. Средняя юра. Польша.

Ctenis cf. zeuschneri Raciborski

1926. Криштофович, с. 601, табл. 13, фиг. 1. Нижняя юра. Р. Фиаг-дон, Северный Кавказ.

Ctenis aff. zeuschneri Raciborski

1971. Маркович, с. 88, табл. 8, фиг. 1. Средняя юра (орская свита). Орский бассейн.

Ctenis sp.

1931. Принада, с. 28, рис. 3, *б*. Нижняя–средняя юра. Бассейн р. Зеравшана. Зауpон-сай, Средняя Азия

1952. Сикстель, с. 37, рис. 17 в тексте. Нижняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.

1957. Станиславский, с. 63, табл. 6, фиг. 4. Средняя юра. Днепровско-Донецкая впадина.

1957. Станиславский, с. 63, рис. 22. Средняя юра. Донбасс.

1960. Сикстель, с. 70, табл. 9, фиг. 8. Верхний триас. Гиссарский хребет.

1962. Принада, с. 164, рис. 32. Нижняя–средняя юра. Восточное Забайкалье.

1963. Василевская, Павлов, табл. 6, фиг. 6. Нижний мел. Ленский бассейн.

1963а. Генкина, с. 70, табл. 37, фиг. 2. Средняя юра. Восточный Урал.

1963а. Генкина, с. 71, табл. 37, фиг. 1. Средняя юра. Восточный Урал.

1970. Алиев, Генкина, с. 25, табл. 8, фиг. 3, 4. Нижняя юра, Тянь-Шань.
1970б. Тесленко, с. 146, табл. 51, фиг. 2. Средняя юра (осиновская свита). Кузбасс.

Ctenis (?) acuminata Stanislavsky

1976. Станиспавский, с. 124, табл. 63, фиг. 7; табл. 73, фиг. 1, 2; рис. 52. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка, Донбасс.

Dioonites Miquel, 1851

Dioonites feneonis (Brongniart) Miquel

1828. Zamia feneonis. Brongniart, с. 99. Иллюстрации у Miller, 1857, с. 69, рис. 36. Юра. Западная Европа.
1851. Dioonites feneonis. Miquel, стр. 211. Там же.

Dioonites inflexus (Eichwald) Schimper

1860 (1860–1868). Pterophyllum inflexum. Eichwald, с. 215, табл. 15, фиг. 5, 6. Пермь? Кузбасс.
1870–1872 (1869–1874). Dioonites inflexus. Schimper, с. 147. Там же.
1879. Schmalhausen, с. 28, табл. 5, фиг. 2. Юра. Кузбасс.
1881. Шмальгаузен, с. 108, табл. 5, фиг. 2. Юра. Кузбасс.
1948. Голова, с. 96, табл. 6, фиг. 45–47. Средняя юра. Чулымо-Енисейский бассейн.

Dioonites kotoi Yokoyama

1889. Yokoyama, с. 44, табл. 8, фиг. 1, *a, b, c, e;* табл. 14, фиг. 14. Нижний мел. Япония.
1916. Криштофович, с. 108, табл. 10, фиг. 1, 2. Нижний мел. Бухта Бражникова, Южное Приморье.

Dioonites polynovii Novopokrovsky

1912. Новопокровский, с. 9, табл. 3, фиг. 6. Нижний мел. Р. Тырма, Буреинский бассейн.
1916. Криштофович, с. 110, табл. 10, фиг. 3. Нижний мел. Бухта Бражникова, Южное Приморье.

Dioonites sp.

1912. Новопокровский, с. 10, табл. 3, фиг. 5. Нижний мел. Р. Тырма, Буреинский бассейн.

Dirhopalostachys Prynada ex Krassilov, 1975

Dirhopalostachys rostrata Krassilov

1975. Krassilov, с. 103, табл. 1, фиг. 1–17; табл. 2, фиг. 18–30; табл. 3, фиг. 31–43; табл. 5, фиг. 60–64. Верхняя юра — неоком. Буреинский бассейн.

Doratophyllum Harris, 1932

Doratophyllum astartensis Harris

1932a. Harris, с. 36, табл. 2, фиг. 6; табл. 3, фиг. 7, 12, 14; рис. 21. Верхний триас. Залив Скорсби, Гренландия.

Doratophyllum acuminatus Chramova

1977. Храмова, с. 56, табл. 21, фиг. 1–4; табл. 22, фиг. 6–8. Верхний триас (сероцветная толща). Бассейн р. Печоры.

Doratophyllum multinervis Chramova

[illegible]7. Храмова, с. 58, табл. 21, фиг. 5–9; табл. 22, фиг. 1–5. Верхний [illegible] (сероцветная толща). Бассейн р. Печоры.

Doratophyllum synensis Chramova

[illegible]7. Храмова, с. 58, табл. 23, фиг. 1–6. Верхний триас (большесынинская свита, сероцветная толща). Бассейн р. Печоры.

Doratophyllum vjatkensis Chramova

1977. Храмова, с. 59, табл. 24, фиг. 1–6. Верхний триас (большесынинская свита). Бассейн р. Печоры.

Doratophyllum sp.

1963. Самылина, с. 85, табл. 18, фиг. 2, 3. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

Подрод Neodoratophyllum Krassilov, 1967

Neodoratophyllum sulcatum (Prynada) Krassilov

1967. Neodoratophyllum sulcatum. Красилов, с. 163, табл. 50, фиг. 1–5; табл. 51, фиг. 1–4. Нижний мел (липовецкая свита). Южное Приморье.

Heilungia Prynada, 1956

Heilungia amurensis (Novopokrovsky) Prynada

1912. Pseudoctenis amurensis. Новопокровский, с. 10, табл. 1, фиг. 2, 3,*в*; табл. 2, фиг. 1; рис. 1. Нижний мел. Р. Тырма, Буреинский бассейн.

1956. Heilungia amurensis. Принада, в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 234, табл. 41, фиг. 1. Там же.

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 98, табл. 44, фиг. 1; табл. 45, фиг. 1, 2; рис. 28. Верхняя юра — нижний мел. Буреинский бассейн.

1963. Самылина, с. 86, табл. 10, фиг. 7. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

1965. Лебедев Е.Л., с. 97, табл. 16, фиг. 1; табл. 17, фиг. 1; табл. 18, фиг. 1,*а*; табл. 19, фиг. 1; табл. 21, фиг. 1–4; табл. 22, фиг. 1; рис. 26–28. Верхняя юра, нижний мел. Р. Зея, бассейн р. Амура.

1968. Полевой атлас. . ., с. 139, табл. 112, фиг. 1, 2. Верхняя юра. Р. Большой Анюй. Нижний мел. Р. Алдан. Якутия.

Heilungia aldanensis Samylina

1963. Самылина, с. 85, табл. 10, фиг. 2; рис. 7. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

1968. Полевой атлас. . ., с. 139, табл. 113, фиг. 1. Верхняя юра. Р. Алдан, Якутия.

Heilungia auriculata (Samylina) Samylina

1956б. Aldania auriculata. Самылина, с. 1337, табл. 1, фиг. 7, 8; рис. 1. Нижний мел. Р. Алдан.

1973. Heilungia auriculata. Самылина, Филиппова, с. 82. Там же.

Heilungia bagonoensis E. Lebedev

1965. Лебедев Е.Л., с. 104, табл. 20, фиг. 2; табл. 21, фиг. 2; табл. 22, фиг. 2; рис. 31, 32. Верхняя юра. Р. Зея, бассейн р. Амура.

Heilungia indigirkensis Samylina

1973. Самылина, Филиппова, с. 84, табл. 11, фиг. 1. Нижний мел. Бассейн р. Индигирки.

Heilungia oloensis Samylina et Philippova

1973. Самылина, Филиппова, с. 80, табл. 11, фиг. 1. Нижний мел. Бассейн р. Колымы.

Heilungia ponomarevii (Prynada) E. Lebedev

1956. Subzamites ponomarevii. Принада, в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 235. Верхняя юра. Буреинский бассейн.

1968. Лебедев Е.Л., с. 49, табл. 1, фиг. 7,*а, в*. Там же.

Heilungia sangarensis Vassilevskaja

19596. Василевская, с. 57, табл. 5, фиг. 5. Нижний мел (чонгургасская свита). Сангарский район, Ленский бассейн

1976. Самылина, с. 52, табл. 25, фиг. 3. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Heilungia sobopolensis E. Lebedev

1968. Лебедев Е.Л., с. 50, табл. 3, фиг. 1; рис. 8. Нижний мел. Якутия.

Heilungia tchuktchorum Samylina et Philippova

1973. Самылина, Филиппова, с. 86, табл. 11, фиг. 5–7. Нижний мел (саламахинская свита). Бассейн р. Анадырь.

Heilungia udensis Koschman

1970. Кошман, с. 127, рис. 1. Нижний мел (боконская свита). Р. Уда, Хабаровский край.

Heilungia zejensis E. Lebedev

1965. Лебедев Е.Л., с. 102, табл. 20, фиг. 1, 3, 4; рис. 29, 30. Верхняя юра. Р. Зея, бассейн р. Амура.

Heilungia sp.

1969. Свешникова, Буданцев, с. 61, табл. 14, фиг. 8,*а*–10. Нижний мел. Земля Франца Иосифа.

Nilssonia Brongniart, 1825

Nilssonia brevis Brongniart

1825. Brongniart, с. 218, табл. 12, фиг. 4, 5. Верхний триас. Швеция.

1976. Иминов, с. 37, табл. 30, фиг. 3; табл. 31, фиг. 1–3. Верхний триас. Реки Бартанг, Водинров, Памир.

Nilssonia brevis Brongniart f. sulcata Prynada

1934. Принада, с. 58, табл. 2, фиг. 2; табл. 3, фиг. 5; табл. 4, фиг. 3; табл. 5–6, фиг. 4, 6,*а*. Верхний триас? Реки Кудара, Кокуйбельсу, Памир.

Nilssonia brevis Brongniart f. truncana Nathorst

1934. Принада, с. 56, табл. 3, фиг. 1; табл. 4, фиг. 2; табл. 5–6, фиг. 1–3. Верхний триас? Реки Бартанг, Танымас, Кудара, Памир.

Nilssonia acuminata (Presl) Goeppert

1838 (1820–1838). Zamites acuminatus. Presl in Sternberg, с. 199, табл. 43, фиг. 2, 4, 5. Юра. Западная Европа.

1844. Nilssonia acuminata. Goeppert, с. 141. Там же.

1931. Принада, с. 27, табл. 3, фиг. 32; табл. 4, фиг. 34, 35, 39; табл. 6, фиг. 64. Нижняя – средняя юра. Р. Ягноб, Средняя Азия.

1933а. Криштофович, Принада, с. 16, табл. 1, фиг. 7,*в*, 9; табл. 2, фиг. 4. Верхний триас. Армения.
1944. Турутанова-Кетова, с. 76, рис. 3 в тексте. Нижняя — средняя юра. Мангышлак.
1952. Сикстель, с. 31, табл. 4, фиг. 5; рис. 12 в тексте. Средняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.
1961б. Маркович, табл. 19, фиг. 3. Средняя юра (орская и романкульская свиты). Магнитогорский синклинорий, Южный Урал.
1961а. Маркович, табл. 29, фиг. 8. Средняя юра (илецкая свита). Яйсан, бассейн р. Илека.
1966. Генкина, с. 84, табл. 34, фиг. 6. Нижняя юра. Иссык-Куль.
1966. Просвирякова, с. 95, табл. 18, фиг. 6, 7. Средняя юра. Мангышлак.
1971. Маркович, с. 90, табл. 8, фиг. 4. Средняя юра. Орский бассейн.
1973. Красилов, Шорохова, с. 21, табл. 9, фиг. 1–3. Нижняя юра. Приморье.

Nilssonia cf. acuminata (Presl) Goeppert

1962. Тесленко, с. 128, табл. 19, фиг. 1, 2,*а*, 3; рис. 33. Верхняя юра (верхи тюменской свиты). Красноярский край.
1970б. Тесленко, с. 147, табл. 32, фиг. 4, 5; табл. 33, фиг. 1,*а*; табл. 51, фиг. 5. Средняя — верхняя юра. Западно-Сибирская низменность.
1976. Долуденко, Орловская, с. 64, табл. 24, фиг. 5, 6; рис. 33,*а–г*. Нижняя юра. Куркурей, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Nilssonia acutiloba (Heer) Kryshtofovich et Prynada

1876б. Anomozamites acutilobus. Heer, с. 102, табл. 23, фиг. 1; табл. 24, фиг. 1–3. Верхняя юра — нижний мел. Р. Бурея, бассейн р. Амура.
1932. Nilssonia acutiloba. Криштофович, Принада, с. 370. Нижний мел. Южное Приморье.
1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 93, табл. 41, фиг. 3–5. Нижний мел. Буреинский бассейн.
1963. Самылина, с. 86, табл. 17, фиг. 4. Нижний мел. Низовья р. Алдана.
1965. Лебедев Е.Л., с. 90, табл. 16, фиг. 2, 3. Верхняя юра. Р. Зея, бассейн р. Амура.

Nilssonia alaskensis (Fontaine) Prynada

1905. Pterophyllum alaskense. Fontaine in Ward, с. 152, табл. 38, фиг. 19, 20. Нижний мел. США.
1938а. Nilssonia alaskensis. Принада, с. 42, табл. 4, фиг. 4. Нижний мел. Р. Силян, бассейн р. Колымы.

Nilssonia amurensis Dobruskina

1964. Добрускина, с. 137, табл. 13, фиг. 1,*а, б*. Верхняя юра. Бассейн р. Амура.

Nilssonia baisunensis Iminov

1968а. Иминов, с. 102, табл. 36, фиг. 3; табл. 37, фиг. 1, 2. Средняя юра. Гиссарский хребет.
1976. Иминов, с. 37, табл. 30, фиг. 1, 2. Средняя юра. Гиссарский хребет.

Nilssonia baranovae Burakova

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 203, табл. 54, фиг. 5–9; табл. 55, фиг. 2–4. Средняя юра. Туаркыр.

Niissonia borealis Samylina

1964б. Самылина, с. 70, табл. 18, фиг. 1–3. Нижний мел (ожогинская свита). Бассейн р. Колымы.

Nilssonia brongniartii (Mantell) Bronn

1833. Cycadites brongniarti. Mantell, с. 238, табл. 39. Юра. Англия.

1848. Bronn, с. 577, табл. 28, фиг. 14. Там же.

Nilssonia ex gr. brongniartii (Mantell) Bronn

1967. Красилов, с. 168, табл. 55, фиг. 1–6. Нижний мел. Приморье.

Nilssonia canadensis Bell

1956. Bell, с. 104, табл. 51, фиг. 2–4; табл. 52, фиг. 5; табл. 54, фиг. 6, 8. Нижний мел. Западная Канада.

1963. Василевская, Павлов, табл. 35, фиг. 1. Нижний мел. Ленский бассейн.

1967. Красилов, с. 172, табл. 56, фиг. 1–3. Нижний мел. Приморье.

Nilssonia compta (Phillips) Bronn

1829. Cycadites comptus. Phillips, с. 148, табл. 7, фиг. 20. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

1848. Nilssonia compta. Bronn, с. 812. Там же.

1907. Сьюорд, с. 13, табл. 2, фиг. 20. Юра. Кавказ.

1911. Томас, с. 39, табл. 6, фиг. 3. Средняя юра. Каменка, Донбасс.

1957. Станиславский, с. 58, табл. 6, фиг. 2, 3; табл. 7, фиг. 4, 5. Средняя юра. Донбасс.

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 198, табл. 1, фиг. 8. Нижняя – средняя юра. Туаркыр.

1963а. Генкина, с. 61, табл. 30, фиг. 3–5; табл. 31, фиг. 1, 2; табл. 32, фиг. 1, 1,*а*. Средняя юра. Восточный Урал.

1976. Иминов, с. 37, табл. 29, фиг. 7–16; табл. 32, фиг. 1–3. Средняя юра (согульская свита). Шураб, Южная Фергана.

Nilssonia comtula Heer

1878а. Heer, с. 19, табл. 4, фиг. 10–16. Нижний мел. Низовья р. Лены.

1962. Лебедев И.В., с. 197, табл. 3, фиг. 2; табл. 4, фиг. 10–16. Юра. Р. Томь, Кузбасс.

1963. Василевская, Павлов, табл. 23, фиг. 2, 3; табл. 29, фиг. 2,*а*. Нижний мел. Ленский бассейн.

1964б. Самылина, с. 71, табл. 13, фиг. 4, 5,*а*, 6. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Бассейн р. Колымы.

1966. Василевская, Абрамова, с. 80, табл. 1, фиг. 8, 9; табл. 3, фиг. 2, 3; рис. 2 в тексте. Нижний мел. Ленский бассейн.

1976. Самылина, с. 47, табл. 32, фиг. 1. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Nilssonia cf. comtula Heer

1962. Принада, с. 163, табл. 8, фиг. 7. Юра. Иркутский бассейн.

Nilssonia ex gr. comtula Heer

1974. Лебедев Е.Л., с. 52, рис. 20. Нижний мел. Западное Приохотье.

Nilssonia cycaditaeformis Prynada

1934. Принада, с. 59, табл. 5–6, фиг. 7; табл. 8, фиг. 2. Верхний триас? Реки Бартанг, Кокуйбельсу, Памир.

Nilssonia decursiva Samylina

1976. Самылина, с. 47, табл. 24, фиг. 1–3. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Nilssonia densinervis (Fontaine) Berry

1889. Platypteridium densinerve. Fontaine, с. 169, табл. 30, фиг. 8; табл. 31, фиг. 1–4; табл. 32, фиг. 1–2; табл. 33, фиг. 1; табл. 34, фиг. 1; табл. 35, фиг. 1, 2. Мел. США.

1911. Nilssonia densinerve. Berry, с. 362, табл. 57, 58. Там же.

1967. Nilssonia densinervis. Красилов, с. 171, табл. 6, фиг. 4, 5. Нижний мел. Приморье.

Nilssonia dentata Brick

1933. Брик, с. 13, табл. 1, фиг. 5, 6. Нижняя – средняя юра. Бассейн р. Зеравшан, Средняя Азия.

1952. Сикстель, с. 36, табл. 7, фиг. 4; табл. 8, фиг. 4, *в*; табл. 15, фиг. 1; рис. 16 в тексте. Нижняя – средняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 201, табл. 3, фиг. 5–8. Нижняя – средняя юра. Туаркыр.

1975. Баранова, Киричкова, Зауер, с. 126, табл. 26, фиг. 4–6. Средняя юра. Бассейн р. Эмбы, Западный Казахстан.

1976. Иминов, с. 38, табл. 33, фиг. 1–4. Средняя юра (согульская свита). Шураб-2, Южная Фергана. Средняя юра (гурудская свита). Гиссарский хребет. Средняя юра. Устюрт.

Nilssonia cf. dentata Brick

1971. Маркович, с. 91, табл. 8, фиг. 5. Средняя юра. Орский бассейн.

Nilssonia denticulata Thomas

1911. Томас, с. 42, табл. 7, фиг. 3–5. Средняя юра. Каменка, Донбасс.

Nilssonia donetziana Stanislavsky

1957. Станиславский, с. 60, табл. 7, фиг. 1–3. Средняя юра. Мангышлак.

1966. Просвирякова, с. 96, табл. 18, фиг. 4, 5. Средняя юра. Мангышлак.

Nilssonia formosa Vachrameev et Vasina

1959. Вахрамеев, Васина, с. 131, табл. 9, фиг. 1–3. Средняя юра. Р. Чирах-Чай, Дагестан.

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 203, табл. 54, фиг. 3, 4. Нижняя юра (пестроцветная свита). Туаркыр.

1963а. Генкина, с. 63, табл. 32, фиг. 4–7. Средняя юра. Восточный Урал.

Nilssonia gagarinii Iminov

1971. Иминов, с. 12, табл. 2, фиг. 1; рис. 3 в тексте. Средняя юра. Шураб-2, Южная Фергана.

1971. Сикстель, Савицкая и др.; с. 181, табл. 12, фиг. 4. Юра. Шураб, Южная Фергана.

1976. Иминов, с. 40, табл. 34, фиг. 1. Средняя юра (согульская свита). Шураб-2, Южная Фергана.

Nilssonia gigantea (Schenk) Prynada

1867. Taeniopteris gigantea. Schenk, с. 146, табл. 28, фиг. 12. Верхний триас — нижняя юра. Франкония, ФРГ.

1933б. Nilssonia gigantea. Принада, с. 19, табл. 4, фиг. 5. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

Nilssonia gigantea Kryshtofovich et Prynada (non Nilssonia gigantea (Schenk) Prynada)

1932. Криштофович, Принада, с. 370. Нижний мел. Южное Приморье.

1958. Вахрамеев, с. 104, табл. 24, фиг. 7; табл. 25, фиг. 1. Нижний мел. Вилюйская впадина.

1963. Василевская, Павлов, табл. 23, фиг. 4. Нижний мел. Ленский бассейн.

Nilssonia gracillima Prynada

1938б. Принада, с. 388, рис. 9 в тексте. Средняя юра. Эмбинский район.

1963а. Генкина, с. 62, табл. 32, фиг. 2, 3. Средняя юра. Восточный Урал.

1971. Сикстель, Савицкая и др. с. 181, табл. 12, фиг. 3. Нижняя юра. Южная Фергана, Гиссарский хребет.

1975. Баранова, Киричкова, Зауер, с. 126, табл. 26, фиг. 1—3. Средняя юра. Южная Эмба, Западный Казахстан.

1976. Иминов, с. 40, табл. 34, фиг. 2—4. Средняя юра. Южная Фергана, Гиссарский хребет.

Nilssonia grandifolia Delle

1967. Делле, с. 94, табл. 19, фиг. 1, 2. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

Nilssonia grandifolia Delle f. rarinervis Delle

1967. Делле, с. 95, табл. 19, фиг. 3. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

Nilssonia grossinervis Prynada

1938а. Принада, с. 41, табл. 4, фиг. 2. Нижний мел. Р. Силян, бассейн р. Колымы.

1964б. Самылина, с. 72, табл. 14, фиг. 1—7; рис. 9,*а*. Нижний мел (силянская свита). Бассейн р. Колымы.

1975. Филиппова, с. 31, табл. 2, фиг. 4; фиг. 6. Нижний мел. Северо-Восток СССР.

Nilssonia aff. grossinervis Prynada

1964б. Самылина, с. 72, табл. 14, фиг. 8. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Бассейн р. Колымы.

Nilssonia inaequalis Genkina

1963а. Генкина, с. 67, табл. 33, фиг. 4. Средняя юра. Восточный Урал.

Nilssonia iniqua Kiritchkova

1975. Баранова, Киричкова, Зауер, с. 127, табл. 27, фиг. 1,*а*—6. Средняя юра. Бассейн р. Эмбы, Западный Казахстан.

Nilssonia inouyei Yokoyama

1905. Yokoyama, с. 9, табл. 1, фиг. 4; табл. 2, фиг. 4. Верхний триас — юра. Япония.

1911. Томас, с. 40, табл. 6, фиг. 4, 4,*а*, 5. Средняя юра. Каменка, Донбасс.

1933б. Принада, с. 20, табл. 3, фиг. 4,*в*. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.
1944. Турутанова-Кетова, с. 76, рис. 2 в тексте. Нижняя — средняя юра. Мангышлак.
1957. Станиславский, с. 58, табл. 6, фиг. 5; табл. 10, фиг. 3. Средняя юра. Днепровско-Донецкая впадина.
1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 202, табл. 54, фиг. 1, 2; рис. 83. Средняя юра. Туаркыр.
1966. Просвирякова, с. 95, табл. 18, фиг. 1—3. Средняя юра. Мангышлак.

Nilssonia jacutica Samylina

19566. Самылина, с. 8. Нижний мел (батылыхская свита). Низовья р. Алдан.
1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 94, табл. 40, фиг. 4. Нижний мел. Буреинский бассейн.
1963. Самылина, с. 87, табл. 16, фиг. 1—5; табл. 21, фиг. 1. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

Nilssonia jagnobensis Sixtel

1960. Сикстель, с. 73, табл. 10, фиг. 4. Верхний триас. Р. Ягноб, Гиссарский хребет.

Nilssonia kazachstanica Vachrameev

1948. Вахрамеев, с. 10, рис. 5—8. Нижний мел. Р. Кульденен-Темир, Западный Казахстан.
1952. Вахрамеев, с. 165, табл. 8, фиг. 1—5; рис. 27, 28. Нижний мел. Р. Кульденен-Темир, Западный Казахстан.

Nilssonia kempirsaica Genkina

1963а. Генкина, с. 66, табл. 33, фиг. 3. Средняя юра. Восточный Урал.

Nilssonia kendallae Harris

1964. Harris, с. 55, рис. 24, 25. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

Nilssonia cf. kendallae Harris

1967. Делле, с. 95, табл. 19, фиг. 4. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

Nilssonia korotcovii Genkina

1963а. Генкина, с. 65, табл. 33, фиг. 5; табл. 34, фиг. 1, 2. Средняя юра. Восточный Урал.

Nilssonia laciniata Sixtel

1962. Сикстель, с. 368, табл. 28, фиг. 7—9. Средний — верхний триас. Мадыген, Южная Фергана.

Nilssonia laxipinnata Prynada ex Sixtel

1952. Сикстель, с. 32, рис. 13. Средняя (?) юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.

Nilssonia linearis Sze

1933. Sze, с. 32, табл. 9, фиг. 1—3. Средняя юра. Китай.

Nilssonia aff. linearis Sze

1962. Тесленко, с. 130, табл. 19, фиг. 2,*б*. Верхняя юра (верхи тюменской свиты. Красноярский край, Западная Сибирь.

Nilssonia lobatidentata Vassilevskaja

1963. Василевская, Павлов, табл. 6, фиг. 1–3. Нижний мел. Ленский бассейн.

1970. Абрамова, с. 45, табл. 4, фиг. 2–5. Нижний мел (кюсюрская свита). Жиганский район, Ленский бассейн.

1972. Василевская, в кн.: Новые виды. . ., с. 322, табл. 74, фиг. 1, 2. Нижний мел (кюсюрская свита). Ленский бассейн.

Nilssonia magnifolia Samylina

1964б. Самылина, с. 73, табл. 13, фиг. 1–3; табл. 15, фиг. 1, 2; табл. 16, фиг. 6, 7; табл. 17, фиг. 1. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Бассейн р. Колымы.

1976. Самылина, с. 48, табл. 22, фиг. 2. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Nilssonia aff. magnifolia Samylina

1974. Лебедев Е.Л., с. 53, табл. 12, фиг. 1. Нижний мел. Западное Приохотье.

Nilssonia mediana (Leckenby ex Bean MS) Fox-Strangways

1864. Pterophyllum medianum. Leckenby, с. 77, табл. 8, фиг. 3. Средняя юра. Скарборо, Англия.

1892. Nilssonia mediana. Fox-Strangways, Barrow, с. 139, Там же.

1912. Сьюорд, с. 12, табл. 2, фиг. 13. Нижний мел. Р. Тырма, бассейн р. Буреи.

1933б. Принада, с. 21, табл. 2, фиг. 9. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 94, табл. 42, фиг. 1, 2; табл. 43, фиг. 4. Верхняя юра. Нижний мел. Буреинский бассейн.

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 196, табл. 50, фиг. 1. Нижняя юра. Туаркыр.

1963а. Генкина, с. 60, табл. 29, фиг. 6; табл. 30, фиг. 1, 2; табл. 31, фиг. 3, 4. Средняя юра. Восточный Урал.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 181, табл. 13, фиг. 3, 4. Средняя юра. Кугитанг, юго-западные отроги Гиссарского хребта; Шураб, Южная Фергана.

Nilssonia menneri E. Lebedev

1974. Лебедев Е.Л., с. 53, табл. 12, фиг. 2, 3; табл. 15, фиг. 4; рис. 21. Нижний мел. Западное Приохотье.

Nilssonia mesentheriformis Sixtel

1960. Сикстель, с. 72, табл. 10, фиг. 3. Верхний триас. Ранг-Куль, Памир.

Nilssonia morrisiana (Oldham) Seward et Sahni

1863. Pterophyllum morrisianum. Oldham in Oldham and Morris, с. 20, табл. 15, фиг. 1; табл. 17, фиг. 2. Юра, Раджмахал, Индия.

1920. Nilssonia morrisiana. Seward, Sahni, с. 30, табл. 5, фиг. 44. Там же.

1952. Сикстель, с. 34, табл. 7, фиг. 1, 3. Нижняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.

Nilssonia muensteri (Presl) Nathorst

1838 (1820–1838). Zamites muensteri. Presl in Sternberg, с. 199, табл. 43, фиг. 1, 3.

1881. Nilssonia muensteri. Nathorst, с. 81. Верхний триас — нижняя юра. Швеция.
1961а. Маркович, табл. 28, фиг. 7, 8; табл. 29, фиг. 9. Средняя юра (илецкая свита). Яйсан, бассейн р. Илека.
1971. Маркович, с. 92, табл. 8, фиг. 6; табл. 9, фиг. 2. Средняя юра. Бассейн р. Илека.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 181, табл. 13, фиг. 2. Средняя юра. Шураб, Южная Фергана.
1976. Иминов, с. 41, табл. 35, фиг. 1. Средняя юра. Шураб. Южная Фергана.

Nilssonia naucatica Nikishova

1970. Никишова, с. 35, табл. 13, фиг. 7—9. Средняя юра. Южная Фергана.

Nilssonia nicanica Prynada

1932. Криштофович, Принада, с. 371. Нижний мел (липовецкая свита). Южное Приморье.
1967. Красилов, с. 166, табл. 4, фиг. 1—5; рис. 21,*а—д*. Нижний мел. Южное Приморье.

Nilssonia nipponensis Yokoyama

1889. Yokoyama, с. 42, табл. 6, фиг. 8,*d*; табл. 7, фиг. 2—7, 8,*а*; табл. 12, фиг. 6; табл. 13, фиг. 1. Нижний мел. Япония.
1963. Василевская, Павлов, табл. 23, фиг. 1. Нижний мел. Ленский бассейн.

Nilssonia aff. obtusa (Nathorst) Harris

1976. Долуденко, Орловская, с. 106, табл. 65, фиг. 3; табл. 66, фиг. 1—8. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Nilssonia olebebsis E. Lebedev

1974. Лебедев Е.Л., с. 54, табл. 12, фиг. 4—6; рис. 22. Нижний мел. Западное Приохотье.

Nilssonia omutensis E. Lebedev

1974. Лебедев Е.Л., с. 56, табл. 13, фиг. 1—3. Нижний мел. Западное Приохотье.

Nilssonia orientalis Heer

1878а. Heer, с. 18, табл. 4, фиг. 5—9. Нижний мел. Низовья р. Лены.
1882. Гуров, с. 246, фиг. 1—3. Юра. Каменка, Донбасс.
1907. Сьюорд, с. 13, табл. 2, фиг. 21. Юра. Кавказ.
1910. Криштофович, с. 12, табл. 2, фиг. 6. Верхний триас. Р. Песчанка, Южное Приморье.
1911. Томас, с. 40, табл. 7, фиг. 1. Средняя юра. Каменка, Донбасс.
1916. Криштофович, с. 113, табл. 10, фиг. 4. Нижний мел. Бухта Бражникова, Южное Приморье.
1957. Станиславский, с. 56, табл. 7, фиг. 6; табл. 10, фиг. 1, 2. Средняя юра. Днепровско-Донецкая впадина, Донбасс.
1959б. Василевская, с. 53, табл. 6, фиг. 1. Нижний мел (чонгургасская свита). Сангарский район, бассейн р. Лены.
1961. Просвирякова, с. 155, табл. 8, фиг. 3. Средняя юра (дурайская свита). Южная Якутия.

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 199, табл. 52, фиг. 1; табл. 53, фиг. 1–3; рис. 81. Средняя юра. Туаркыр.
1963. Василевская, Павлов, табл. 23, фиг. 5. Нижний мел. Ленский бассейн.
1963а. Генкина, с. 57, табл. 27, фиг. 8–10; табл. 28, фиг. 1. Средняя юра. Восточный Урал.
1970. Абрамова, с. 46, табл. 4, фиг. 10. Нижний мел (кюсюрская свита). Жиганский район, Ленский бассейн.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 180, табл. 11, фиг. 8. Юра. Шураб, Южная Фергана.

Nilssonia ex gr. orientalis Heer

1952. Вахрамеев, с. 164, табл. 7, фиг. 1–3. Нижний мел (кызылшенская свита). Чушкакульская антиклиналь, Западный Казахстан.
1962. Принада, с. 164, рис. 31,*а*. Верхняя юра. Восточное Забайкалье.
1963а. Генкина, с. 58, табл. 28, фиг. 2–4. Средняя юра. Восточный Урал.
1967. Красилов, с. 172, табл. 55, фиг. 7, 8. Нижний мел. Приморье.
1976. Долуденко, Орловская, с. 106, табл. 67, фиг. 1, 6. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Nilssonia orientalis Heer var. minor Fontaine

1966. Просвирякова, с. 93, табл. 17, фиг. 1–4. Средняя юра. Мангышлак.

Nilssonia типа orientalis Heer

1931. Принада, с. 25, табл. 5, фиг. 50. Нижняя — средняя юра. Реки Кштут, Гизен-пайон, бассейн р. Зеравшана.
1944. Турутанова-Кетова, с. 75, табл. 2, фиг. 7. Нижняя — средняя юра. Мангышлак.
1948. Вахрамеев, с. 7, рис. 2, 3. Нижний мел. Горы Кызылшен, Западный Казахстан.

Nilssonia orskica Genkina

1963а. Генкина, с. 64, табл. 32, фиг. 8, 9; табл. 33, фиг. 1, 2. Средняя юра. Восточный Урал.
1961б. Маркович, табл. 19, фиг. 2. Средняя юра (орская и романкульская свиты). Магнитогорский синклинорий, Южный Урал.

Nilssonia ozoana Yokoyama

1889. Yokoyama, с. 41, табл. 10, фиг. 2,*b*, 11–14. Верхняя юра. Япония.
1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 194, табл. 49, фиг. 1. Средняя юра. Туаркыр.

Nilssonia pilifera Samylina

1976. Самылина, с. 48, табл. 23, фиг. 1–7. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Nilssonia polymorpha Schenk

1867. Schenk, с. 127, табл. 29, фиг. 1–9; табл. 30, фиг. 1. Верхний триас — нижняя юра. Франкония, ФРГ.
1953б. Сикстель, с. 131, табл. 2, фиг. 4,*с*; табл. 6, фиг. 1,*а*. Средняя юра (свита А). Ягман, Средняя Азия.
1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 200, табл. 52, фиг. 2; табл. 53, фиг. 4; рис. 82. Средняя юра. Туаркыр.

1975. Баранова, Киричкова, Зауер, с. 128, табл. 27, фиг. 7–9. Средняя юра. Северная Эмба, Западный Казахстан.
1976. Иминов, с. 42, табл. 36, фиг. 1–3; табл. 37, фиг. 1–6; табл. 38, фиг. 3. Нижняя юра. Гиссарский хребет. Средняя юра. Гиссарский хребет Южная Фергана.

Nilssonia ex gr. polymorpha Schenk

1952. Сикстель, с. 31, табл. 6, фиг. 2. Нижняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.

Nilssonia типа polymorpha Schenk

1931. Принада, с. 26, табл. 3, фиг. 33; табл. 4, фиг. 38, 40. Нижняя — средняя юра. Реки Кштут, Заурон-сай, бассейн р. Зеравшана.

Nilssonia polymorpha Schenk var. regularis Kryshtofovich et Prynada

1933а. Криштофович, Принада, с. 17, табл. 2, фиг. 3; табл. 3, фиг. 6. Верхний триас. Армения.

Nilssonia princeps (Oldham et Morris) Seward

1863. Pterophyllum princeps. Oldham, Morris, с. 23, табл. 10, фиг. 1–3; табл. 11, фиг. 1; табл. 13, фиг. 1, 2. Средняя юра. Раджмахал, Индия.
1917. Nilssonia princeps. Seward, с. 576, рис. 623.
1933б. Принада, с. 21, табл. 3, фиг. 9. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.
1961б. Маркович, табл. 19, фиг. 1. Средняя юра (орская и романкульская свиты). Магнитогорский синклинорий, Южный Урал.
1967. Делле, с. 96, табл. 19, фиг. 10. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.
1976. Иминов, с. 43, табл. 38, фиг. 1, 2. Верхний триас. Р. Варзоб, Памир.

Nilssonia prynadae Vachrameev

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 95, табл. 42, фиг. 3; табл. 43, фиг. 1. Нижний мел. Буреинский бассейн.
1963. Василевская, Павлов, табл. 35, фиг. 2. Нижний мел. Ленский бассейн.

Nilssonia pseudomediana Dobruskina

1964. Добрускина, с. 138, рис. 2. Верхняя юра, нижний мел. Бассейн р. Амура.
1967. Красилов, с. 169, табл. 53, фиг. 9, 10. Нижний мел (сабайгинская толща). Южное Приморье.

Nilssonia rajmahalensis (Morris) Seward et Sahni

1863. Cycadites rajmahalensis. Oldham and Morris, с. 15, табл. 7, фиг. 1, 2; табл. 8, фиг. 1. Юра. Индия.
1920. Nilssonia rajmahalensis. Seward and Sahni, с. 32, табл. 3, фиг. 34. Там же.
1960. Сикстель, с. 75, табл. 10, фиг. 5; табл. 11, фиг. 1. Верхний триас, нижняя юра. Реки Бартанг, Кокуйбельсу, Чаштюбе, Памир.
1962. Сикстель, табл. 1, фиг. 3, 4. Верхний триас (истыкская свита). Р. Бартанг, Памир.

Nilssonia rara Sixtel

1952. Сикстель, с. 33, табл. 13, фиг. 4; рис. 14. Средняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.

Nilssonia aff. rara Sixtel

1971. Маркович, с. 92, табл. 8, фиг. 7; табл. 9, фиг. 1. Средняя юра. Орский бассейн.

Nilssonia cf. rara Sixtel

1976. Иминов, с. 44, табл. 48, фиг. 6. Средняя юра. Гиссарский хребет.

Nilssonia rarinervis Prynada

1934. Принада, с. 61, рис. 11. Верхний триас? Р. Кокуйбельсу, Памир.

Nilssonia rectangulalobata Teslenko

1962. Тесленко, с. 129, табл. 19, фиг. 4, 5. Нижняя юра. Бассейн р. Томи, Кузбасс.

1970б. Тесленко, с. 146, табл. 32, фиг. 1—3. Нижняя юра. Кузбасс.

Nilssonia recurvata Thomas

1911. Томас, с. 41, табл. 7, фиг. 2, 2,*а*. Средняя юра. Каменка, Донбасс.

1957. Станиславский, с. 60, табл. 10, фиг. 4. Средняя юра. Днепровско-Донецкая впадина, Донбасс.

Nilssonia saighanensis Seward

1912. Seward, с. 11, табл. 4, фиг. 50—53; табл. 8, фиг. 106—108. Юра. Афганистан.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 180, табл. 11, фиг. 5. Средняя юра. Шураб, Южная Фергана.

1976. Иминов, с. 44, табл. 39, фиг. 1—3. Средняя юра (гурудская свита). Гиссарский хребет. Средняя юра (верхняя подсвита согульской свиты). Шураб, Южная Фергана.

Nilssonia schaumburgensis (Dunker) Nathorst

1846. Pterophyllum schaumburgense. Dunker, с. 45, табл. 1, фиг. 7; табл. 2, фиг. 1; табл. 6, фиг. 5—10. Нижний мел. Западная Европа.

1890. Nilssonia cf. schaumburgensis. Nathorst, с. 5, табл. 1, фиг. 6—9,*а*. Нижний мел. Япония.

1964б. Самылина, с. 73, табл. 14, фиг. 9. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Бассейн р. Колымы.

1967. Красилов, с. 170, табл. 57, фиг. 1—7. Нижний мел. Приморье.

Nilsonia aff. schaumburgensis (Dunker) Nathorst

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 97, табл. 43, фиг. 2, 3. Верхняя юра. Нижний мел. Буреинский бассейн.

1965. Лебедев Е.Л., с. 92, табл. 20, фиг. 5: табл. 22, фиг. 3*а*. Верхняя юра. Р. Зея, бассейн р. Амура.

Nilssonia cf. schaumburgensis (Dunker) Nathorst

1932. Криштофович, Принада, с. 370. Нижняя юра. Южное Приморье.

1963. Василевская, Павлов, табл. 6, фиг. 5. Нижний мел. Ленский бассейн.

1974. Лебедев Е.Л., с. 57, табл. 13, фиг. 4, 5. Нижний мел. Западное Приохотье.

Nilssonia schmidtii (Heer) Seward

1876 b. Anomozamites schmidtii. Heer, с. 100, табл. 23, фиг. 2, 3: табл. 24, фиг. 4—7. Верхняя юра — нижний мел (талынжанская и ургальская свиты). Буреинский бассейн.

1912. Nilssonia schmidtii. Сьюорд, с. 11, табл. 2, фиг. 11, 12, 14. Верхняя юра, нижний мел. Р. Тырма, Буреинский бассейн.
1916. Криштофович, с. 114, табл. 10, фиг. 5. Нижний мел. Бухта Бражникова, Южное Приморье.
1924. Хахлов, с. 16, фиг. 21—23. Нижняя — средняя юра. Правый берег р. Ангары, Иркутский бассейн.
1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 96, табл. 43, фиг. 5, 6. Верхняя юра, нижний мел. Буреинский бассейн.
1963а. Генкина, с. 63, табл. 31, фиг. 5: табл. 32, фиг. 1. Средняя юра. Восточный Урал.
1965. Лебедев Е.Л., с. 92, табл. 22, фиг. 3, *б*; табл. 23, фиг. 2; табл. 24, фиг. 1. Верхняя юра. Р. Зея, бассейн р. Амура.
1975. Krassilov, с. 106, табл. 4, фиг. 44—48, 50—54; табл. 5, фиг. 55—60. Верхняя юра — нижний мел. Буреинский бассейн.
1975. Филиппова, с. 30, табл. 3, фиг. 1; табл. 4, фиг. 4. Нижний мел. Северо-Восток СССР.

Nilssonia aff. schmidtii (Heer) Seward

19596. Василевская, с. 54, табл. 6, фиг. 2—4. Нижний мел (ынгырская свита). Сангарский район, Ленский бассейн.
1974. Лебедев Е.Л., с. 57, рис. 23. Нижний мел. Западное Приохотье

Nilssonia schurabensis Nikishova

1970. Никишова, с. 36, табл. 13, фиг. 10. Средняя юра. Шураб, Южная Фергана.

Nilssonia serotina Heer

1878b. Heer, с. 19, табл. 2, фиг. 1—5. Верхний мел. Сахалин.

Nilssonia aff. serotina Heer

19646. Самылина, с. 74, табл. 16, фиг. 1—3; табл. 17, фиг. 2, *а, б*. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Бассейн р. Колымы.

Nissonia serrata Prynada

1931. Принада, с. 24, табл. 4, фиг. 36, 37. Нижняя — средняя юра. Зауран-сай, бассейн р. Зеравшана.
1952. Сикстель, с. 30, табл. 6, фиг. 4; рис. 11. Средняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.
1953а. Сикстель, ч. 48, табл. 2, фиг. 3, *а*. Нижняя юра (угленосная свита). Ангрен, Средняя Азия.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 182, табл. 11, фиг. 4. Нижняя и средняя юра. Шураб, Южная Фергана.
1976. Долуденко, Орловская, с. 65, табл. 24, фиг. 3, 3, *а*. Средняя юра. Иссыктас, хребет Каратау, Южный Казахстан.
1976. Иминов, с. 44, табл. 39, фиг. 4—8. Средняя юра. Южная Фергана. Средняя юра (гурудская свита). Гиссарский хребет.

Nilssonia sixteliana Iminov

1971. Иминов, с. 14, табл. 2, фиг. 4, 5; рис. 4. Нижняя юра. Шураб-2, Южная Фергана.
1976. Иминов, с. 45, табл. 39, фиг. 9—11. Средняя юра. Шураб, Южная Фергана.

Nilssonia spinosa Krassilov

1973. Красилов, Шорохова, с. 22, табл. 10, фиг. 1–6. Нижняя юра. Приморье.

Nilssonia taeniopteroides Halle

1913. Halle, с. 47, табл. 5; табл. 6, фиг. 1–7; рис. 11. Верхняя юра. Земля Грэма, Антарктида.

1930. Турутанова-Кетова, с. 153, табл. 6, фиг. 43, 44. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Nilssonia taeniopteroides Halle var.bifurcata Prosvirjakova

1966. Просвирякова, с. 92, табл. 16, фиг. 1–6. Средняя юра. Мангышлак.

Nilssonia tenuicaulis (Phillips) Fox-Strangways

1829. Cycadites tenuicaulis. Phillips, с. 148, 189, табл. 7, фиг. 19. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

1892. Nilssonia tenuicaulis. Fox-Strangways, Barrow, с. 219. Там же.

1976. Иминов, с. 41, табл. 34, фиг. 5–9. Нижняя юра. Ферганский хребет. Средняя юра. Южная Фергана, Гиссарский хребет.

Nilssonia tenuinervis Seward

1880. Nathorst, с. 35, 83. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

1900. Seward, с. 230, рис. 41. Там же.

1976. Иминов, с. 42, табл. 35, фиг. 2–6. Средняя юра. Гиссарский хребет, Южная Фергана, Устюрт.

Nilssonia tenuissima Genkina

1963а. Генкина, с. 67, табл. 34, фиг. 3, 4; табл. 35, фиг. 1. Средняя юра. Восточный Урал.

1970б. Тесленко, с. 148, табл. 33, фиг. 1, *б*. Средняя — верхняя юра. Западно-Сибирская низменность.

Nilssonia cf. tenuissima Genkina

1961б. Маркович, табл. 19, фиг. 4, 5. Средняя юра (орская и романкульская свиты). Магнитогорский синклинорий, Южный Урал.

Nilssonia undulata Harris

1932а. Harris, с. 41, табл. 3, фиг. 3, 8, 9, 11; рис. 23. Нижняя юра. Залив Скорсби, Гренландия.

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 196, табл. 49, фиг. 3. Нижняя юра (пестроцветная свита). Туаркыр.

Nilssonia ex gr. undulata Harris

1976. Иминов, с. 45, табл. 40, фиг. 1–4. Средняя юра (гурудская свита). Гиссарский хребет.

Nilssonia valentinae Iminov

1971. Иминов, с. 13, табл. 2, фиг. 2, 3. Нижняя юра. Шураб-2, Южная Фергана.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 180, табл. 12, фиг. 1, 2. Нижняя юра. Шураб, Южная Фергана.

1976. Иминов, с. 46, табл. 40, фиг. 5, 6. Средняя юра. Шураб, Южная Фергана.

Nilssonia variabilis Prynada

1933б. Принада, с. 22, табл. 2, фиг. 10. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.
1967. Делле, с. 96, табл. 20, фиг. 1—5; табл. 23, фиг. 9. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.
1976. Иминов, с. 46, табл. 40, фиг. 7; табл. 41, фиг. 1—4. Средняя юра (верхняя подсвита согульской свиты). Шураб, Южная Фергана.

Nilssonia cf. variabilis Prynada

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 182, табл. 13, фиг. 1. Нижняя юра. Шураб, Южная Фергана.

Nilssonia villosa Dervis in Teslenko

1962. Тесленко, с. 129, табл. 19, фиг. 6, 7; рис. 34. Средняя юра (тюменская свита). Колпашево, Западная Сибирь.

Nilssonia viluensis Vassilevskaja

1959б. Василевская, с. 55, табл. 5, фиг. 1—4. Нижний мел (ынгырская свита). Сангарский район, Ленский бассейн.

Nilssonia vittaeformis Prynada

1931. Принада, с. 24, табл. 5, фиг. 51. Нижняя — средняя юра. Гизен-пайон, бассейн р. Зеравшана.
1952. Брик, с. 61, табл. 21, фиг. 4; табл. 22, фиг. 8, *б*. Средняя юра. Бассейн р. Илека.
1952. Сикстель, с. 35, табл. 7, фиг. 2; табл. 8, фиг. 1, 6, *в*; табл. 13, фиг. 1, *с*; рис. 15. Средняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.
1961а. Маркович, табл. 29, фиг. 6, 7. Средняя юра (илецкая свита). Яйсан, бассейн р. Илека.
1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 197, табл. 1, фиг. 1—7. Средняя юра. Туаркыр.
1963а. Генкина, с. 59, табл. 28, фиг. 5—7; табл. 29, фиг. 1—5. Средняя юра. Восточный Урал.
1966. Просвирякова, с. 94, табл. 17, фиг. 5—7. Средняя юра. Мангышлак.
1967. Делле, с. 97, табл. 19, фиг. 5—9. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.
1967. Иминов, с. 43, рис. 1, 2. Юра. Средняя Азия.
1975. Баранова, Киричкова, Зауер, с. 128, табл. 13, фиг. 3, *б*; табл. 28, фиг. 1, 2. Средняя юра. Бассейн р. Эмбы, Западный Казахстан.
1976. Иминов, с. 47, табл. 41, фиг. 5—11; табл. 42, фиг. 1—6. Средняя юра. Гиссарский хребет, Шураб-2, Южная Фергана.

Nilssonia (Zamites) weberi (Seward) Chachlov

1907. Zamites weberi. Сьюорд, с. 11, табл. 2, фиг. 19; табл. 3, фиг. F. Юра. Кавказ.
1931. Nilssonia (Zamites) weberi. Хахлов, с. 18, фиг. 33. Юра. Кузбасс.

Paracycas Harris, 1964

Paracycas cteis (Harris) Harris

1951. Cycadites cteis. Harris, с. 614, рис. 1, 2. Средняя юра. Англия.
1964. Paracycas cteis. Harris, с. 67, рис. 29. Там же.

1968. Долуденко, Делле, Сванидзе, с. 916, табл. 4, фиг. 5–7; табл. 5, фиг. 1–6. Средняя юра. Грузия.

Paracycas brevipinnata Delle

1976. Делле, с. 98, табл. 21, фиг. 7–11. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.
1968. Долуденко, Делле, Сванидзе, с. 913, табл. 1, фиг. 1–6, 10; табл. 2, фиг. 1–8; табл. 3, фиг. 1–7. Средняя и верхняя юра. Грузия.
1969. Долуденко, Сванидзе, с. 27, табл. 20, фиг. 1–7; табл. 21, фиг. 1–7; табл. 22, фиг. 1–4. Верхняя юра. Грузия.

Paracycas harrisii Doludenko

1976. Долуденко, Орловская, с. 104, табл. 62, фиг. 1, 2; табл. 63, фиг. 1–3; табл. 64, фиг. 1–5; табл. 65, фиг. 1, 2, 4, 5. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, Чугурчак, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Paracycas intermedia Doludenko

1968. Долуденко, Делле, Сванидзе, с. 915, табл. 3, фиг. 8–10; табл. 4, фиг. 1–4. Верхняя юра. Грузия.
1969. Долуденко, Сванидзе, с. 29, табл. 23, фиг. 1–8. Верхняя юра. Грузия.

Paracycas raripinnata Doludenko

1968. Долуденко, Делле, Сванидзе, с. 917, табл. 6, фиг. 1–9. Верхняя юра. Грузия.
1969. Долуденко, Сванидзе, с. 31, табл. 24, фиг. 1–6; табл. 25, фиг. 1–7. Верхняя юра. Грузия.

Pseudoctenis Seward, 1911

Pseudoctenis eathiensis (Richards) Seward

1911b. Seward, с. 692, табл. 4, фиг. 62, 67; табл. 7, фиг. 11, 12; табл. 8, фиг. 32. Верхняя юра. Шотландия.

Pseudoctenis aff. eathiensis (Richards) Seward

1967. Красилов, с. 165, табл. 3, фиг. 1–3. Нижний мел. Приморье.
1969. Долуденко, Сванидзе, с. 34, табл. 28, фиг. 1–5. Верхняя юра. Грузия.

Pseudoctenis aksajensis Genkina

1966. Генкина, с. 87, табл. 38, фиг. 4; табл. 39, фиг. 1–5. Нижняя юра. Иссык-Куль.

Pseudoctenis amurensis Novopokrovsky

1912. Новопокровский, с. 10, табл. 1, фиг. 2, 3, *в*; табл. 2, фиг. 1; рис. 1. Нижний мел. Р. Тырма, Буреинский бассейн.

Pseudoctenis ex gr. ballii Feistmantel

1976. Иминов, с. 48, табл. 43, фиг. 4, 5. Верхний триас. Сарезкое озеро, Памир.

Pseudoctenis barulensis Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 33, табл. 26, фиг. 1–6; табл. 27, фиг. 1–6. Верхняя юра. Грузия.

Pseudoctenis ensiformis Halle

1913. Halle, с. 51, табл. 6, фиг. 8. Верхняя юра. Земля Грэма, Антарктида.

Pseudoctenis cf. ensiformis Halle

1961б. Маркович, табл. 19, фиг. 6. Средняя юра (орская и романкульская свиты). Магнитогорский синклинорий, Южный Урал.

Pseudoctenis ensiformis Halle var. minor Markovitch

1971. Маркович, с. 89, табл. 7, фиг. 11. Средняя юра (орская свита). Орский бассейн.

Pseudoctenis lanei Thomas

1913а. Thomas, с. 242, табл. 24, фиг. 4; табл. 26. Юра. Йоркшир, Англия.

Pseudoctenis aff. lanei Thomas

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 36, табл. 31, фиг. 4. Верхняя юра. Грузия.

Pseudoctenis latus Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 35, табл. 29, фиг. 1–4; табл. 30, фиг. 1–5. Верхняя юра. Грузия.

Pseudoctenis locusta Harris

1964. Harris, с. 76, рис. 33. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

1976. Долуденко, Орловская, с. 62, табл. 23, фиг. 3, 4; рис. 31, *а–в*. Нижняя юра. Куркурей, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pseudoctenis oleosa Harris

1949. Harris, с. 580, рис. 8, *A*, *B*, 9. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 37, табл. 33, фиг. 1–4; табл. 34, фиг. 1–4. Верхняя юра. Грузия.

Pseudoctenis sogutensis Genkina

1963б. Генкина, с. 197, табл. 2, фиг. 3; табл. 3, фиг. 2; табл. 4. Юра (аксайская свита). Согутинский район, Иссык-Куль.

1966. Генкина, с. 86, табл. 34, фиг. 10; табл. 35, фиг. 2–5; табл. 36, фиг. 1, 3; табл. 37, фиг. 1, 2; табл. 38, фиг. 1–3. Нижняя юра. Иссык-Куль.

Pseudoctenis cf. sogutensis Genkina

1976. Иминов, с. 49, табл. 43, фиг. 6, 7. Средняя юра. Караунгур, Северная Фергана.

Pseudoctenis weberi (Seward) Prynada

1907. Zamites weberi. Сьюорд, с. 11, табл. 2, фиг. 19; табл. 3, фиг. F. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

1934. Pseudoctenis weberi. Криштофович, Принада, с. 70. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

1967. Делле, с. 99, табл. 22, фиг. 1–7; табл. 23, фиг. 1, *а*. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

Pseudoctenis zamiophylloides Vassilevskaja

1959б. Василевская, с. 63, табл. 7, фиг. 6; табл. 8, фиг. 3–6; табл. 9, фиг. 2. Нижний мел (чонгургасская свита). Сангарский район, Ленский бассейн.

Pseudoctenis zamiophylloides Vassilevskaja forma rarinervis Vassilevskaja

1966. Василевская, Абрамова, с. 82, табл. 3, фиг. 1. Нижний мел. Ленский бассейн.

Pseudoctenis sp.

1931. Турутанова-Кетова, стр. 5, фиг. 8. Нижняя — средняя юра. Иссык-Куль.

1941. Брик, с. 29, табл. 9, фиг. 4. Верхний триас (нижняя свита). Камыш-Баши, Южная Фергана.

1957. Станиславский, с. 64, табл. 11, фиг. 3. Средняя юра. Днепровско-Донецкая впадина.

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 38, табл. 35, фиг. 1—7. Верхняя юра. Грузия.

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 39, табл. 36, фиг. 1—3. Верхняя юра. Грузия.

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 39, табл. 36, фиг. 4, 5. Верхняя юра. Грузия.

1976. Долуденко, Орловская, с. 63, табл. 23, фиг. 2; рис. 32. Нижняя юра. Куркурей, хребет Каратау, Южный Казахстан.

1977. Храмова, с. 62, табл. 21, фиг. 10. Верхний триас (сероцветная толща). Бассейн р. Печоры.

Pseudoctenis (?) magnifolius Doludenko

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 36, табл. 31, фиг. 1—3; табл. 32, фиг. 1—7. Верхняя юра. Грузия.

ФИЛЛОСПЕРМИДЫ БЛИЖЕ НЕ УСТАНОВЛЕННОГО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ (ЦИКАДОФИТЫ)

Butefia Dobruskina, 1964

Butefia ensiformis (Heer) Dobruskina

1878a. Podozamites ensiformis. Heer, с. 6, табл. 2, фиг. 5, 6. Юра. Иркутский бассейн.

1964. Butefia ensiformis. Добрускина, с. 135, табл. 12, фиг. 1—3; рис. 1. Там же.

Butefia burejensis (Prynada) E. Lebedev

1939. Glossozamites burejensis. Принада, в кн. Хераскова и др., с. 115. Верхняя юра. Буреинский бассейн.

1965. Butefia burejensis. Лебедев Е.Л., с. 93, табл. 25, фиг. 1; рис. 25. Верхняя юра (депская свита). Р. Зея, бассейн р. Амура.

Butefia obliqua Samylina

1976. Самылина, с. 51, табл. 35, фиг. 2,3. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Butefia (?) sp.

1976. Иминов, с. 50, табл. 44, фиг. 1, 2. Верхний триас Сарезкое озеро, Памир.

Cycadites Sternberg, 1825

Cycadites nilsoni Sternberg

1825 (1820—1838). Sternberg, т. 1, с. 32, табл. 47. Мел. Швеция.

Cycadites acinaciformis Trautschold

1870. Trautschold, с. 34, табл. 21, фиг. 1. Нижний мел. Татарово, Московская обл.

Cycadites affinis Eichwald

1865 (1860—1868). Eichwald, с. 40, 41, табл. 3, фиг. 3. Нижний мел. Окрестности г. Клина, Московская обл.

Cycadites brongniartii Roemer

1839. Roemer, с. 9, табл. 17, фиг. 1, в, д. Нижний мел. ФРГ.

1847. Rouilliers, Vossinsky, с. 446, фиг. 46. Нижний мел. Окрестности Москвы.

Cycadites gramineus Heer

1876a. Heer, с. 34, табл. 8, фиг. 7, 8. Нижний мел. Шпицберген.

1876b. Heer, с. 100. табл. 23, фиг. 1, *b*, табл. 24, фиг. 4. Верхняя юра. Р. Бурея, верховья р. Амура.

1878a. Heer, с. 17, табл. 4, фиг. 2. Нижний мел. Низовья р. Лены.

Cycadites longifolius Nathorst

1876. Nathorst, с. 47, табл. 13. Верхний триас — нижняя юра. Швеция.

1878 (1878—1890). Романовский, с. 162, табл. 22, фиг. 1, *в*, 2, *в*. Юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Cycadites rectangularis Brauns

1862. Brauns, с. 56, табл. 14, фиг. 1. Верхний триас — нижняя юра. Западная Европа.

1933б. Принада, с. 17, табл. 2, фиг. 6. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 193, табл. 46, фиг. 1—4, 6; рис. 80. Средняя юра. Туаркыр.

1967. Делле, с. 100, табл. 21, фиг. 1—6. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

1976. Иминов, с. 50, табл. 28, фиг. 6. Средняя юра. Гиссарский хребет.

Cycadites saladinii Zeiller

1903. Zeiller, с. 154, табл. 41, фиг. 1—4. Верхний триас. Вьетнам.

1933б. Принада, с. 17, табл. 2, фиг. 4, 5; табл. 3, фиг. 11; табл. 4, фиг. 8. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

Cycadites saportae Seward

1895. Seward, с. 29, табл. 3, фиг. 7; табл. 6, фиг. 5, 5, а; табл. 8, фиг. 2. Нижний мел. Англия.

1976. Долуденко, Орловская, с. 108, табл. 68, фиг. 1, 2. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Cycadites sibiricus Heer

1878a. Heer, с. 16, табл. 4, фиг. 1. Нижний мел. Низовья р. Лены.

Cycadites sulcatus Kryshtofovich et Prynada

1916. Dioonites polynovii. Криштофович, с. 30, табл. 5, фиг. 3. Нижний мел. Приморье.

1932. Cycadites sulcatus. Криштофович, Принада, с. 369. Там же.

1967. Красилов, с. 159, табл. 47, фиг. 2—4; табл. 48, фиг. 1, 4. Там же.

Cycadites tenuilobus Prynada

1934. Принада, с. 28, табл. 9, фиг. 3. Верхний триас? Р. Пшарт, Памир.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 180, табл. 10, фиг. 1. Средняя юра. Кугитанг, Гиссарский хребет.

Cycadites cf. Pseudocycas dicksonii (Heer) Nathorst

1967. Красилов, с. 160, табл. 47, фиг. 1. Нижний мел. Уссурийский залив, Приморье.

Cycadites (?) planicosta Heer

1876b. Heer, с. 44, табл. 4, фиг. 16. Юра. Иркутский бассейн.
1880. Heer, с. 10, табл. 7, фиг. 12, *b*. Там же.

Cycadospadix Schimper, 1870

Cycadospadix hennocquei (Pomel) Schimper

1849. Crossozamia hennocquei. Pomel, с. 353. Нижняя юра. Франция.
1870 (1869–1874). Cycadospadix hennocquei. Schimper, с. 207, табл. 72, фиг. 18. Там же.

Cycadospadix sp.

1976. Станиславский, с. 123, табл. 73, фиг. 4, 5. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка, Донбасс.

Encephalartites Vachrameev, 1962

Encephalartites leipzigii Vachrameev

1962. Вахрамеев, с. 128, табл. 12, фиг. 6, 7; табл. 13, фиг. 4; рис. 1, *а, б*. Нижний мел (батылыхская свита). Якутия.

Glossozamites Schimper, 1870

Glossozamites oblongifolius (Kurr) Schimper

1870 (1869–1874). Schimper, с. 163, табл. 71. Нижняя юра. Вюртемберг, ФРГ.

Glossozamites kryshtofovichi Prynada et Radczenko

1960. Принада, Радченко, в кн.: Новые виды..., с. 80, табл. 17, фиг. 5–7. Нижний триас (нижнемальцевская подсвита). Кузбасс.

Glossozamites multinervis Pomerantzeva

1968. Померанцева, в кн.: Новые виды..., с. 68, табл. 20, фиг. 7, 8. Средняя юра (шоптыкульская свита). Майкюбень, Казахстан.

Macrotaeniopteris Schimper, 1869

Macrotaeniopteris major (Lindley et Hutton) Schimper

1833 (1831–1837). Taeniopteris major. Lindley and Hutton, с. 31, табл. 92. Средняя юра. Англия.
1869 (1869–1874). Macrotaeniopteris major. Schimper, с. 610. Там же.

Macrotaeniopteris californica Fontaine

1900. Fortaine in Ward, с. 349, табл. 53, фиг. 1; табл. 54, фиг. 1, 2. Юра (?). США.

Macrotaeniopteris cf. californica Fontaine

1965. Лебедев Е.Л., с. 106, табл. 21, фиг. 3. Верхняя юра. Р. Зея, бассейн р. Амура.

Macrotaeniopteris lata (Oldham et Morris) Schimper

1863. Taeniopteris lata. Oldham, Morris, с. 41, табл. 1; табл. 2, фиг. 1; табл. 3, фиг. 2; табл. 5. Юра. Раджмахал, Индия.

1869 (1869—1874). Macrotaeniopteris lata. Schimper, с. 612. Там же.

1934. Принада, с. 17, рис. 2. Верхний триас? Р. Западный Пшарт, Памир.

Macrotaeniopteris cf. richthofenii Schenk

1910. Криштофович, с. 11, табл. 2, фиг. 5. Верхний триас. Р. Песчанка, Южное Приморье.

Macrotaeniopteris subtilis Pomerantzeva

1968. Померанцева в кн.: Новые виды..., с. 69, табл. 21, фиг. 1. Верхи нижней — низы средней юры (сарыкульская и талдыкульская свиты). Майкюбень, Казахстан.

Macrotaeniopteris virgulata (Zeiller) Prynada

1903. Taeniopteris virgulata. Zeiller, с. 72, табл. 14, фиг. 1—3. Верхний триас. Вьетнам.

1934. Macrotaeniopteris virgulata. Принада, с. 19, табл. 10, фиг. 1, 2. Верхний триас? Р. Кокуйбельсу, Памир.

Macrotaeniopteris sp.

1968. Орловская, с. 80, табл. 19, фиг. 13. Верхний триас. Кетмень, Казахстан.

Nikania Prynada, 1956

Nikania pectinata Prynada

1956. Принада в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 239, табл. 40, фиг. 4, 5, 5, *а*, 5, *в*, 6. Нижний мел. Приморье.

Parajacutiella Srebrodolskaja, 1968

Parajacutiella mongugaica (Srebrodolskaja) Srebrodolskaja

1958. Jacutiella mongugaica. Сребродольская, с. 172. Верхний триас (монгугайская свита). Приморье.

1960. Сребродольская, с. 109, табл. 1, фиг. 8, 10. Там же.

1968. Parajacutiella mongugaica. Сребродольская в кн.: Новые виды, с. 66, табл. 20, фиг. 2—4. Там же.

Parajacutiella mongugaica (Srebrodolskaja) Srebrodolskaja var. rarinervis Srebrodolskaja

1968. Сребродольская в кн.: Новые виды..., с. 66, табл. 20, фиг. 5, 6. Верхний триас (нижняя монгугайская свита). Приморье.

Parajacutiella angusta Mogutcheva

1973. Могучева, с. 91, табл. 40, фиг. 5—8. Нижний триас (корвунчанская свита). Тунгусский бассейн.

Parajacutiella parva Mogutcheva

1973. Могучева, с. 91, табл. 41, фиг. 5—9. Нижний триас (корвунчанская свита). Тунгусский бассейн.

Sarmatiella Prynada, 1956

Sarmatiella brevifolia Prynada

1956. Принада в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 240, табл. 42, фиг. 1. Нижняя юра. Донбасс.

Taeniopteridium Sixtel, 1962

Taeniopteridium grossopteroides Sixtel

1962. Сикстель, с. 364, табл. 26, фиг. 4–6; табл. 27, фиг. 4, 5; рис. 35. Триас. Мадыген, Южная Фергана.

Taeniopteris Brongniart, 1832

Taeniopteris vittata Brongniart

1828. Brongniart, с. 62. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

1831? (1828–1838). Brongniart, с. 263, табл. 82, фиг. 1–4. Средняя юра. Англия.

1911. Томас, с. 23, табл. 4, фиг. 2, 3. Средняя юра. Каменка, Донбасс.

1944. Турутанова-Кетова, с. 70, табл. 3, фиг. 3, 4.Нижняя – средняя юра. Мангышлак.

1957. Станиславский, с. 50, табл. 8, фиг. 1–3. Средняя юра. Днепровско-Донецкая впадина, Донбасс.

1958. Орловская, с. 135, табл. 3, фиг. 1. Нижняя юра (шоптыкульская свита). Майкюбень, Казахстан.

1961. Просвирякова, с. 154, табл. 8, фиг. 1, 2, 4–6. Средняя юра (дурайская свита). Южная Якутия.

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 183, табл. 41, фиг. 5, 6; табл. 42, фиг. 1, 3. Средняя юра. Туаркыр, Средняя Азия.

1963а. Генкина, с. 50, табл. 19, фиг. 3–5; табл. 20, фиг. 1, 2. Средняя юра. Восточный Урал.

1966. Просвирякова, с. 98, табл. 19, фиг. 3, 4. Средняя юра. Мангышлак.

Taeniopteris cf. vittata Brongniart

1907. Сьюорд, с. 31, табл. 6, фиг. 45, 46. Юра. Средняя Азия.

1967. Делле, с. 101, табл. 23, фиг. 2–4. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

Taeniopteris vittata Brongniart = Oleandridium vittatum (Brongniart) Schimper

1878 (1878–1890). Романовский, с. 160, табл. 22, фиг. 1, *а*. Юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Taeniopteris aborigena E. Lebedev

1974. Лебедев Е.Л., с. 59, табл. 14, фиг. 1, 2; табл. 15, фиг. 1–3,5; рис. 25. Нижний мел. Западное Приохотье.

Taeniopteris ambabiraensis Srebrodoiskaja

1968. Сребродольская в кн.: Новые виды..., с. 64, табл. 19, фиг. 9–11. Верхний триас. Приморье.

Taeniopteris amurensis Novopokrovsky

1912. Новопокровский, с. 6, табл. 1, фиг. 5; табл. 2, фиг. 5. Нижний мел. Р. Тырма, Буреинский бассейн.

1914. Криштофович, с. 98, табл. 4, фиг. 1–7; табл. 5, фиг. 1. Верхи верхней юры– низы мела. Р. Тырма, Буреинский бассейн.
1958. Вахрамеев, с. 103, табл. 24, фиг. 4. Нижний мел. Вилюйская впадина.

Taeniopteris angustifolia Schenk

1864. Schenk, с. 103, табл. 2, фиг. 5. Средний – верхний триас. Франкония, ФРГ.
1952. Брик, с. 40, табл. 1, фиг. 4. Верхи среднего – верхний триас (курашайская свита) . Р. Илек, Западный Казахстан.

Taeniopteris asiatica Brick ex Sixtel

1952. Сикстель, с. 27, табл. 6, фиг. 1; рис. 9. Нижняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.
1961б. Маркович, табл. 12, фиг. 1–3. Верхний триас (кызылкаинская свита) . Магнитогорский синклинорий, Южный Урал.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 183, табл. 10, фиг. 5. Средняя юра. Шураб, Южная Фергана.
1976. Иминов, с. 51, табл. 44, фиг. 3, 4; табл. 45, фиг. 1, 2. Средняя юра. Южная Фергана, Гиссарский хребет.

Taeniopteris cf. asiatica Brick ex Sixtel

1968. Орловская, с. 80, табл. 19, фиг. 14–18; табл. 20, фиг. 8–11. Верхний триас. Кетмень, Казахстан.

Taeniopteris asiatica Brick ex Sixtel
var. rarinervis Markovitch

1971. Маркович, с. 93, табл. 9, фиг. 5, 6. Верхний триас (кызылкаинская свита) . Орский бассейн.

Taeniopteris bomnakensis E. Lebedev

1974. Лебедев Е.Л., с. 61, табл. 13, фиг. 8; рис. 27. Нижний мел. Западное Приохотье.

Taeniopteris brickianae Iminov

1971. Иминов, с. 9, табл. 1, фиг. 4; рис. 2. Нижняя юра. Шураб, Южная Фергана.
1971. Сикстель, Савицкая и др.,. с. 183, табл. 10, фиг. 3, 4. Нижняя юра. Шураб, Южная Фергана.
1976. Иминов, с. 52, табл. 45, фиг. 3, 4. Средняя юра. Шураб, Южная Фергана.

Taeniopteris cordata E. Lebedev

1974. Лебедев Е.Л., с. 61, табл. 13, фиг. 7; табл. 14, фиг. 3; рис. 26. Нижний мел. Западное Приохотье.

Taeniopteris crassinervis (Feistmantel) Arber

1877b. Macrotaeniopteris crassinervis. Feistmantel, с. 51, табл. 38, фиг. 1, 2, 2a, 2b, 3. Юра. Раджмахал, Индия.
1917. Taeniopteris crassinervis. Arber, с. 45, табл. 9, фиг. 4; табл. 10, фиг. 1, 3, 5. Средняя юра. Новая Зеландия.
1953б. Сикстель, с. 130, табл. 2, фиг. 4, *а*; табл. 6, фиг. 1, *в*, 2, *в*, 4. Средняя юра (свита А) . Ягман, Средняя Азия.

1966. Просвирякова, с. 98, табл. 19, фиг. 5, 6. Средняя юра (тонашинская свита) . Мангышлак.

Taeniopteris crassinervis Stanislavsky
(non Taeniopteris crassinervis (Feistmantel) Arber)

1971. Станиславский, с. 82, табл. 22, фиг. 4–6. Верхний триас. Донбасс.

Taeniopteris densinervis Feistmantel

1876b. Feistmantel, с. 19, табл. 2, фиг. 6. Юра. Кач, Индия.
1911. Томас, с. 24, табл. 4, фиг. 4, 5. Средняя юра. Каменка, Донбасс.
1944. Турутанова-Кетова, с. 71, рис. 1. Нижняя – средняя юра. Мангышлак.
1961б. Маркович, табл. 21, фиг. 4. Средняя юра (орская и романкульская свиты) . Магнитогорский синклинорий, Южный Урал.

Taeniopteris dongurmensis Genkina

1970. Алиев, Генкина, с. 26, табл. 8, фиг. 7–11. Верхний триас. Кавак-Тау, Тянь-Шань.

Taeniopteris ensis (Oldham) Zeiller

1863. Stangerites (Taeniopteris) ensis. Oldham, Morris. с. 35, табл. 6, фиг. 8–10. Юра. Раджмахал, Индия.
1882. Taeniopteris ensis. Zeiller, с. 306, табл. 12, фиг. 2. Верхний триас. Вьетнам.
1910. Криштофович, с. 8, табл. 2, фиг. 1, 1, *а*. Верхний триас. Р. Заломная, Южное Приморье.
1952. Брик, с. 39, табл. 1, фиг. 5. Верхи среднего –верхний триас (курайлинская свита) . Р. Илек, Западный Казахстан.
1961. Романова, с. 114, табл. 2, фиг. 5. Нижняя юра. Боролдайское месторождение, хребет Каратау, Южный Казахстан.
1969. Киричкова, с. 292, табл. 7, фиг. 1–5. Верхний триас (копейская свита) , нижняя юра (карьерная свита) . Челябинский бассейн.
1970. Принада, с. 61, табл. 6, фиг. 2, 3; рис. 24, 25. Нижний триас. Р. Нижняя Тунгуска.

Taeniopteris eurychoron (Schenk) Kawasaki

1899. Oleandridium eurychoron. Schenk, с. 312, табл. 1, фиг. 3–5; табл. 2, фиг. 2. Мезозой. Китай.
1925. Taeniopteris eurychoron. Kawacaki, с. 31, табл. 20, фиг. 61. Юра. Корейский полуостров.
1931. Принада, с. 18, табл. 5, фиг. 52. Нижняя, средняя юра. Заурон-сай, бассейн р. Зеравшана, Средняя Азия.
1933а. Криштофович, Принада, с. 9, табл. 3, фиг. 3–5. Верхний триас. Армения.
1938а. Принада, с. 37, рис. 14, С, Д. Нижний мел. Р. Зырянка, бассейн р. Колымы.
1961б. Маркович, табл. 22. Средняя юра (орская и романкульская свиты) . Магнитогорский синклинорий, Южный Урал.

Taeniopteris cf. eurychoron (Schenk) Kawacaki

1971. Маркович, с. 94, табл. 9, фиг. 3, 4. Средняя юра (орская свита) . Орский бассейн.

Taeniopteris ferganensis Brick ex Sixtel

1952. Сикстель, с. 26, рис. 8. Средняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.
1953б. Сикстель, с. 132, табл. 3, фиг. 3, *а*; табл. 7, фиг. 6, *с*. Средняя юра (свита А). Ягман, Средняя Азия.
1971. Худайбердыев, Гомолицкий, Лобанова, с. 15, табл. 3, фиг. 1, *б*, 5. Нижняя – средняя юра. Сулюкта, Южная Фергана.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 183, табл. 10, фиг. 6. Средняя юра. Шураб, Южная Фергана.
1976. Долуденко, Орловская, с. 66, табл. 23, фиг. 5–8; табл. 24, фиг. 1, 2; рис. 34, *а–г*. Нижняя юра. Акбулак, хребет Каратау, Южный Казахстан.
1976. Иминов, с. 52, табл. 45, фиг. 5–9; табл. 46. Средняя юра (верхняя подсвита сагульской свиты). Южная Фергана. Средняя юра. Гиссарский хребет.

Taeniopteris cf. ferganensis Brick ex Sixtel

1963б. Генкина, с. 195, табл. 1, фиг. 7–10; табл. 3, фиг. 1. Юра (аксайская свита). Согутинский район, Иссык-Куль.
1966. Генкина, с. 88, табл. 40, фиг. 1–8. Нижняя юра. Иссык-Куль.

Taeniopteris incrassata Jongmans et Gothan

1935. Jongmans, Gothan, с. 155, табл. 55, фиг. 1. Верхний карбон. О-в Суматра.
1962. Сикстель, с. 357, табл. 25, фиг. 6. Триас. Мадыген, Южная Фергана.

Taeniopteris jimboana Kryshtofovich

1932. Криштофович, Принада, с. 368, табл. 1, фиг. 6. Нижний мел. Южное Приморье.
1963а. Самылина, с. 93, табл. 21, фиг. 2. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

Taeniopteris jourdyi Zeiller

1903. Zeiller, с. 66, табл. 10, фиг. 1–6; табл. 11, фиг. 1–4; табл. 12, фиг. 1–4, 6; табл. 13, фиг. 1–5. Верхний триас. Вьетнам.

Taeniopteris cf. jourdyi Zeiller

1934. Принада, с. 21, табл. 1, фиг. 2. Верхний триас? Р. Бартанг, Памир.

Taeniopteris kamyschbaschensis Brick

1941. Брик, с. 25, табл. 8, фиг. 2; рис. 6. Верхний триас (нижняя свита). Камыш-Баши, Южная Фергана.
1960. Сикстель, с. 71, табл. 10, фиг. 2. Верхний триас. Камыш-Баши, Южная Фергана.
1969. Киричкова, с. 293, рис. 4. Верхний триас (буланашская свита). Восточный Урал.
1970. Алиев, Генкина, с. 26, табл. 8, фиг. 5, 6. Верхний триас. Кавак-Тау. Тянь-Шань.
1976. Иминов, с. 52, табл. 47, фиг. 1. Верхний триас. Камыш-Баши, Южная Фергана.

Taeniopteris kazachstanica Turutanova-Ketova

1944. Турутанова-Кетова, с. 72, табл. 2, фиг. 5, 6. Нижняя – средняя юра. Мангышлак.

Taeniopteris lanceolata Oishi

1932. Oishi, с. 325, табл. 43 (25), фиг. 5—9. Верхний триас. Япония.

1973. Красилов, Шорохова, с. 25, табл. 10, фиг. 7—10. Нижняя юра. Приморье.

Taeniopteris latecostata Halle

1927. Halle, с. 145, табл. 38, фиг. 1—6. Пермь. Юго-восточный Китай.

1960. Сикстель, с. 71, табл. 10, фиг. 1. Верхний триас. Р. Бахруф, Памир.

1962. Сикстель, с. 358, табл. 25, фиг. 1, 2. Средний — верхний триас. Мадыген, Южная Фергана.

Taeniopteris lingulata Srebrodoiskaja

1968. Сребродольская в кн.: Новые виды..., с. 61, табл. 20, фиг. 1. Верхний триас (нижняя монгугайская свита). Приморье.

Taeniopteris lundgrenii Nathorst

1897. Nathorst, с. 50, табл. 3, фиг. 1—5. Нижний мел. Шпицберген.

1976. Самылина, с. 52, табл. 24, фиг. 4; табл. 25, фиг. 7. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Taeniopteris minuscula Srebrodoiskaja

1968. Сребродольская в кн.: Новые виды. . . , с. 62, табл. 19, фиг. 4. Верхний триас (нижняя монгугайская свита). Приморье.

Taeniopteris multinervis Weiss

1869. Weiss, с. 98, табл. 6, фиг. 13. Пермь. ФРГ.

1962. Сикстель, с. 356, табл. 24, фиг. 2—5. Триас. Мадыген, Южная Фергана.

Taeniopteris norinii Halle

1927. Halle, с. 157, табл. 41, фиг. 8, 9. Пермь. Центральный Шаньси, Китай.

Taeniopteris norinii Halle (?) f. magna Radczenko

1936. Радченко, с. 10, табл. 2, фиг. 3; рис. 9. Нижний триас. Осташкинские горы, Кузбасс.

Taeniopteris nystroemii Halle

1927 Halle, с. 148, табл. 39. Пермь. Центральный Шаньси, Китай.

Taeniopteris cf. nystroemii Halle

1941. Брик, с. 26, табл. 8, фиг. 3. Верхний триас (нижняя свита). Камыш-Баши, Южная Фергана.

Taeniopteris obliquus Vassilevskaja

1966. Василевская, с. 59, табл. 4, фиг. 2. Нижний мел. Жиганский район, Ленский бассейн.

Taeniopteris parvula Heer

1876b. Heer, с. 98, табл. 21, фиг. 5. Верхняя юра. Верховья р. Амура.

Taeniopteris platyrachis Samylina

1976. Самылина, с. 53, табл. 25, фиг. 4—6. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Taeniopteris pocrovskii Vassilevskaja

1966. Василевская, с. 61, табл. 3, фиг. 3—5; табл. 4, фиг. 1. Нижний мел. Жиганский район, Ленский бассейн.

Taeniopteris prynadae Mogutcheva

1973. Могучева, с. 87, табл. 38, фиг. 9—11. Нижний триас (хаканчанская свита). Р. Горбиачин, Тунгусский бассейн.

Taeniopteris reversa Prynada

1934. Принада, с. 22, табл. 10, фиг. 5; рис. 3. Верхний триас. Р. Кокуйбельсу, Памир.

Taeniopteris rhitidorhachis Kryshtofovich ex Samylina

1932. Криштофович. Принада, с. 368. Нижний мел. Южное Приморье.

1963. Самылина, с. 93, табл. 22, фиг. 3, 4. Нижний мел. Низовья р. Алдана.

Taeniopteris spathulata McClelland

1850. McClelland, с. 53, табл. 16, фиг. 1. Юра. Индия.

1910. Криштофович, с. 9, табл. 2, фиг. 2, 2*а*. Верхний триас. Р. Песчанка, Южное Приморье.

1931. Хахлов, с. 16, фиг. 30. Юра. Кузбасс.

1936. Брик, с. 169, табл. 1, фиг. 6. Триас. Мадыген, Южная Фергана.

1954. Полевой атлас. . . , с. 31, табл. 23, фиг. 2. Верхний триас (нижняя и верхняя монгугайская свиты). Приморье.

Taeniopteris stenophylla Kryshtofovich

1910. Криштофович, с. 11, табл. 2, фиг. 3, 3, *а*, 4, 4,*а*. Верхний триас. Р. Заломная, Южное Приморье.

1969. Киричкова, с. 294, табл. 16, фиг. 4; рис. 5. Нижняя юра (карьерная свита). Челябинский бассейн.

Taeniopteris stenophylla Kryshtofovich
var. mongugaica Srebrodolskaja

1968. Сребродольская в кн.: Новые виды. . . , с. 63, табл. 19. фиг. 5—8. Верхний триас (нижняя монгугайская свита). Приморье.

Taeniopteris tenuinervis Brauns

1862. Brauns, с. 50, табл. 13, фиг. 1—3. Верхний триас. ФРГ.

1890 (1878—1890). Романовский, с. 127, 135, табл. 19, фиг. 3,*с*; табл. 20, фиг. 4,*а*. Триас — юра. Средняя Азия.

1926. Криштофович, с. 600, табл. 12, фиг. 2. Нижняя юра. Северный Кавказ.

1934. Принада, с. 20, табл. 2, фиг. 4. Верхний триас. Реки Танымас, Кокуйбельсу, Памир.

1976. Иминов, с. 53, табл. 47, фиг. 2, 3. Верхний триас. Памир. Средняя юра (верхняя подсвита согульской свиты). Южная Фергана.

Taeniopteris cf. tenuinervis Brauns

1971. Станиславский, с. 83, табл. 23, фиг. 1—6. Верхний триас. Донбасс.

Taeniopteris virgulata Zeiller

1976. Иминов, с. 53, табл. 47, фиг. 4, 5; табл. 48, фиг. 1—3. Верхний триас. Памир. Средняя юра (верхняя подсвита согульской свиты). Южная Фергана.

Taeniopteris (?) gorbiachinii Mogutcheva

1972. Могучева в кн.: Новые виды. . . , с. 322, табл. 74, фиг. 5, 6. Нижний триас (хаканчанская свита). Р. Горбиачин, Тунгусский бассейн.

Taeniopteris (?) laceratimarginale Sixtel

1962. Сикстель, с. 359, табл. 26, фиг. 1–3. Триас. Мадыген, Южная Фергана.

Taeniopteris (?) plicata Sixtel

1962. Сикстель, с. 362, табл. 25, фиг. 7; рис. 34. Триас. Мадыген, Южная Фергана.

Taeniopteris (?) stankevichii Sixtel

1962. Сикстель, с. 360, табл. 25, фиг. 3–5; рис. 33. Триас. Мадыген, Южная Фергана.

Tanaidia Prynada, 1956

Tanaidia mirabilis Prynada

1956. Принада в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 225, табл. 39, фиг. 6. Верхний триас. Донбасс.

Tanaidia ferganensis Brick

1941. Брик. с. 28, табл. 8, фиг. 4–6. Верхний триас (нижняя свита). Камыш-Баши, Южная Фергана.

Tanaidocarpidium Prynada, 1956

Tanaidocarpidium triphyllum Prynada

1956. Принада в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 254, табл. 41, фиг. 3, 4. Верхний триас. Донбасс.

Tanaidocarpidium diphyllum Vladimirovich

1960. Владимирович, в кн.: Новые виды. . . , с. 126, табл. 24, фиг. 12. Верхний триас – нижняя юра. Убаганский бассейн, Казахстан.

Tomia Srebrodoiskaja, 1960

Tomia radczenkoi Srebrodolskaja

1960. Сребродольская в кн.: Новые виды. . . , с. 82, табл. 17, фиг. 1, 2. Нижний триас (нижнемальцевская подсвита). Кузбасс.

Tomia malzevskiana Srebrodoiskaja

1960. Сребродольская в кн.: Новые виды. . . , с. 83, табл. 17, фиг. 3, 4. Нижний триас (нижнемальцевская подсвита). Кузбасс.

Yavorskyia Radczenko, 1936

Yavorskyia mungatica Radczenko

1936. Радченко, с. 13, табл. 2, фиг. 6, 9, 10; рис. 11–14. Пермь. Кузбасс.

Yavorskyia arctica Schvedov

1963. Шведов, с. 64, табл. 2, фиг. 3б, 5; табл. 3, фиг. 1. Нижний триас. Норильский район.

1973. Могучева, с. 89, табл. 39, фиг. 1–4; табл. 40, фиг. 4. Нижний триас (хонна-макитская свита). Тунгусский бассейн.

Yavorskyia radczenkoi Schvedov

1963. Шведов, с. 63, табл. 2, фиг. 1, 2, 3,*а*, 4. Нижний триас. Норильский район.

1973. Могучева, с. 88, табл. 38, фиг. 12; табл. 39, фиг. 5, 6. Нижний триас (тутончанская и хонна-макитская свиты). Тунгусский бассейн.

Yavorskyja serrata Mogutcheva

1973. Могучева, с. 90, табл. 40, фиг. 1–3. Нижний триас (хонна-макитская свита). Тунгусский бассейн.

ПОДКЛАСС STACHYOSPERMIDAE (CONIFEROPHYTA). СТАХИОСПЕРМИДЫ.

ПОРЯДОК GINKGOALES. ГИНКГОВЫЕ

Baiera C.F.W. Braun, 1843

Baiera muensteriana (Presl) Saporta

1838 (1820–1838). Sphaerococcites muensterianus. Presl in Sternberg, с. 105, табл. 28, фиг. 3. Триас. ФРГ.

1884. Baiera muensteriana. Saporta, с. 272, табл. 155, фиг. 10–12; табл. 156, фиг. 1–6; табл. 157, фиг. 1–3. Юра. Франция.

Baiera ahnertii Kryshtofovich

1932. Криштофович, Принада, с. 371, табл. 1, фиг. 4. Нижний мел. Южное Приморье.

1933. Криштофович, табл. 1, фиг. 4. Нижний мел. Южное Приморье.

1952. Сикстель, с. 46, табл. 10, фиг. 6. Юра (угленосная свита). Фан-Ягноб. Средняя Азия.

1958. Вахрамеев, с. 109, табл. 26, фиг. 4, 5. Юра. Р. Лена.

1962. Тесленко, с. 135, табл. 20, фиг. 8. Нижняя юра (макаровская свита). Р. Чулым, Западная Сибирь.

1970б. Тесленко, с. 156, табл. 37, фиг. 5, 6. Нижняя юра (макаровская свита). Р. Чулым, Западная Сибирь.

1971. Маркович, с. 96, табл. 11, фиг. 4. Средняя юра (орская свита). Южный Урал.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 186, табл. 16, фиг. 5; табл. 21, фиг. 6, 7. Нижняя и средняя юра. Шураб, Кугитанг, Средняя Азия.

1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 89, табл. 58, фиг. 4, 5; табл. 60, фиг. 1–3. Нижняя и средняя юра. Кугитанг, Шураб, реки Фан и Ягноб, Средняя Азия.

1972. Быстрицкая, с. 57, табл. 3, фиг. 3. Юра. Кузбасс.

Baiera cf. ahnertii Kryshtofovich

1967а. Самылина, с. 142, табл. 2, фиг. 1; рис. 1. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Р. Зырянка, бассейн р. Колымы.

Baiera alakulica Orlovskaja

1968. Орловская, табл. 6, фиг. 4, 5; табл. 7, фиг. 1, 2. Юра. Алакуль, Казахстан.

Baiera angustiloba Heer

1878а. Heer, с. 24, табл. 7, фиг. 2. Нижний мел. Р. Лена.

1880. Heer, с. 14, табл. 3, фиг. 1–3. Юра. Иркутский бассейн.
1934. Криштофович, Принада, с. 73. Юра. Иркутский бассейн.
1905. Krasser, с. 605, табл. 2, фиг. 10; табл. 3, фиг. 1. Юра. Забайкалье.

Baiera cf. angustiloba Heer

1931. Принада, с. 30, табл. 2, фиг. 15. Юра. Кштут, Средняя Азия.

Baiera asadai Yabe et Oishi

1928. Yabe, Oishi, с. 9, табл. 3, фиг. 2. Юра. Китай.
1952. Сикстель, с. 45, табл. 2, фиг. *3в*; табл. 9, фиг. 5; табл. 10, фиг. 5; рис. 23. Юра (угленосная свита). Фан-Ягноб. Средняя Азия.

Baiera cf. asadai Yabe et Oishi

1961б. Маркович, табл. 23, фиг. 5. Средняя юра (орская и романкульская свиты). Южный Урал.

Baiera canaliculata Harris

1944. Harris, с. 680, фиг. 6,*b,c*; 7,8. Средняя юра. Йоркшир, Англия.
1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 105, табл. 50, фиг. 1–8. Нижний мел. Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Baiera colchica Prynada

1933б. Принада, с. 26, табл. 3, фиг. 5, 6. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.
1976. Долуденко, Орловская, с. 109, табл. 70, фиг. 2–6. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Baiera concinna (Heer) Kawasaki

1876b. Ginkgo concinna. Heer, с. 63, табл. 13, фиг. 6–8; табл. 7, фиг. 8. Юра. Иркутский бассейн.
1925. Baiera concinna. Kawasaki, с. 48, табл. 27, фиг. 80, *a,b,d*. Юра. Корейский полуостров.
1944. Турутанова-Кетова, с. 82, табл. 3, фиг. 6. Юра. Мангышлак.
1962. Тесленко, с. 135, табл. 21, фиг. 5. Нижняя юра. Р. Томь, Кузбасс.
1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 207, табл. 60, фиг. 3, 4; рис. 85. Юра. Туаркыр, Западная Туркмения.
1963а. Генкина, с. 77, табл. 40, фиг. 1–6. Средняя юра. Орский бассейн.
1963. Самылина, с. 94, табл. 21, фиг. 5, 6; табл. 26, фиг. 1–3; рис. 11. Нижний мел. Бассейн р. Алдана.
1966. Просвирякова, с. 102, табл. 20, фиг. 3, 4. Средняя юра (сарыдиирменская свита). Мангышлак.
1969. Киричкова, с. 305, табл. 10, фиг. 7, 8. Триас (буланашская и бобровская свиты). Восточный Урал.
1970б. Тесленко, с. 155, табл. 37, фиг. 1–4. Средняя юра (абашевская и эрбекская свиты). Кузбасс, Тува.
1971. Маркович, с. 98, табл. 11, фиг. 1, 2. Средняя юра (орская и романкульская свиты). Южный Урал.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 187, табл. 16, фиг. 3. Средняя юра. Кугитанг, Средняя Азия.
1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 89, табл. 58, фиг. 2, 3; табл. 59, фиг. 1, 2. Юра. Кугитанг, Туаркыр, Мангышлак, реки Фан и Ягноб, Средняя Азия.

Baiera cf. concinna (Heer) Kawasaki

1963а. Нейбург, с. 145, табл. 2, фиг. 7, 8; табл. 3, фиг. 1, 2. Юра. Тува.

Baiera czekanowskiana Heer

1876b. Heer, с. 56, табл. 10, фиг. 1–5; табл. 7, фиг. 1. Юра. Иркутский бассейн.

1880. Heer, с. 13, табл. 1, фиг. 12; табл. 2, фиг. 1–3; табл. 3, фиг. 4–8. Юра. Иркутский бассейн.

1923. Хахлов, с. 8, табл. 4, фиг. 16–20; табл. 5, фиг. 21, 22. Юра. Иркутский бассейн.

1934. Криштофович, Принада, с. 73. Иркутский бассейн.

Baiera gracilis Bunbury

1851. Bunbury, с. 182, табл. 12, фиг. 3. Средняя юра. Англия.

1923. Хахлов, с. 9, табл. 7, фиг. 27, 28. Юра. Иркутский бассейн.

1934. Криштофович, Принада, с. 74, рис. 35–7. Юра. Иркутский бассейн. Нижний мел. Р. Бурея, бассейн р. Амура.

1944. Турутанова-Кетова, с. 31, рис. 6, 7. Юра. Мангышлак.

1958. Вахрамеев, с. 112, табл. 26, фиг. 6; табл. 27, фиг. 4. Верхняя юра и нижний мел. Р. Лена.

1961б. Маркович, табл. 16, фиг. 4; табл. 23, фиг. 6–9. Юра (катынадырская, орская и романкульская свиты). Южный Урал.

1961. Просвирякова, с. 159. Средняя юра (чульманская свита). Южная Якутия.

1962. Принада, с. 192. табл. 10, фиг. 8. Юра. Иркутский бассейн.

1962. Тесленко, с. 136, табл. 21, фиг. 4. Юра. Кузбасс.

1965. Лебедев Е.Л., с. 113, табл. 26, фиг. 6–8. Верхняя юра (депская свита). Р. Зея, бассейн р. Амура.

1970б. Тесленко, с. 155, табл. 36, фиг. 7. Средняя юра (осиновская свита). Кузбасс.

1971. Маркович, с. 97, табл. 11, фиг. 3. Нижняя (?) юра (катынадырская свита). Южный Урал.

1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 90, табл. 58, фиг. 1. Юра. Гиссарский хребет, Южная Фергана.

Baiera cf. gracilis Bunbury

1948. Голова, с. 99, табл. 7, фиг. 53. Юра. Чулымо-Енисейский бассейн.

1966. Ефимова, Терехова, с. 73, табл. 4, фиг. 1, 2. Мел. Бухта Угольная, Северо-Восток СССР.

1976. Долуденко, Орловская, с. 73, табл. 29, фиг. 3; рис. 39. Нижняя юра. Куркуреу, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Baiera ex gr. gracilis Bunbury

1938а. Принада. с. 46, табл. 5, фиг. 4, 5; рис. 17,*А*. Нижний мел. Бассейн р. Колымы.

Baiera inaequilobata Delle

1959а. Делле, с. 88, табл. 1, фиг. 8, 9; рис. 1, 2. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

1967. Делле, с. 101, табл. 24, фиг. 1, 2. Средняя юра. Ткварчели. Грузия.

Baiera kidoi Yabe et Oishi

1933. Yabe, Oishi, с. 218, табл. 33, фиг. 3. Юра?. Китай.

1972. Красилов, с. 36, табл. 9, фиг. 1–5; рис. 4,*л*. Нижний мел (тырминская свита). Бассейн р. Буреи.

Baiera leptophyila Harris

1935. Harris, с. 30, табл. 5, фиг. 6, 7; рис. 15. Верхний триас. Гренландия.

Baiera aff. leptophylla Harris

1966. Генкина, с. 96, табл. 44, фиг. 3–7. Верхний триас (акташская свита). Иссык-Куль.

Baiera lindleyana (Schimper) Seward

1869 (1869–1874). Jeanpaulia lindleyana. Schimper, с. 683. Юра. Англия.

1900. Baiera lindleyana. Seward, с. 266, табл. 9, фиг, 6, 7; рис. 46. Юра. Англия.

1971. Маркович, стр. 10, фиг. 5, 6. Нижняя и средняя юра (катынадырская и орская свиты). Южный Урал.

Baiera longifolia Pomel

1849. Dicropteris longifolia. Pomel, с. 339.

1876b. Baiera longifolia. Heer, с. 52, табл. 7, фиг. 2, 3; табл. 8; табл. 9, фиг. 1–11; табл. 10, фиг. 6, 7; табл. 15, фиг. 11,*b*; стр. 114, табл. 23, фиг, 1,*d*, 4; табл. 28, фиг. 1. Юра. Иркутский бассейн, верховья р. Амура.

1880. Heer, с. 11, табл. 1, фиг. 10,*a*, 11,*a*; табл. 2, фиг. 4; табл. 4, фиг. 1, 2; табл. 5, фиг. 1,*b*, 3,*b*, *c*. Юра. Иркутский бассейн.

1905. Krasser, с. 606, табл. 1, фиг. 16. Юра. Забайкалье.

1914. Криштофович, с. 110, табл. 6, фиг. 1, 2. Нижний мел. Р. Тырма, бассейн р. Буреи.

1923. Хахлов, с. 6, табл. 2, фиг. 10, 12; табл. 3, фиг. 11, 13–15. Юра. Иркутский бассейн.

1926. Хахлов, с. 12, фиг. 10, 11. Юра. Иркутский бассейн.

1931. Турутанова-Кетова, с. 330, табл. 4, фиг. 9. Юра. Иссык-Куль.

1931. Хахлов, с. 10, 18, 20, 21, 23, 25, табл. 1, фиг. 4; табл. 8, фиг. 20; табл. 13, фиг. 37; табл. 19, фиг. 49. Юра. Кузбасс.

1932. Криштофович, Принада, с. 371. Нижний мел. Южное Приморье.

1934. Криштофович, Принада, с. 73, рис. 35,*1*. Юра. Иркутский бассейн, верховья р. Амура.

1936a. Турутанова-Кетова, с. 100,табл. 1, фиг. 10. Юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Baiera cf. longifolia Pomel

1935. Принада, с. 222, рис. 4, 6,*c*. Юра. Бассейн р. Нарына, Средняя Азия.

1954. Голова, с.54, табл. 1, фиг. 15, 16. Юра. Чулымо-Енисейский бассейн.

Baiera longifolia Pomel var. czekanowskiana Kryshtofovich

1933. Криштофович, табл. 1, фиг. 2. Юра. Иркутский бассейн.

Baiera luppovii Burakova

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 206, табл. 10, фиг. 1, 2. Юра. Туаркыр, Западная Туркмения.

Baiera manchurica Yabe et Oishi

1933. Yabe, Oishi, с. 218, табл. 32, фиг. 12, 13,*в*; табл. 33, фиг. 1. Юра (?). Китай.

1972. Красилов, с. 34, табл. 7, фиг. 1–6: табл. 8, фиг. 6–11; рис. 4, *з–к*. Верхняя юра и нижний мел (талынжанская и ургальская свиты). Бассейн р. Буреи.

Baiera minuta Nathorst

1886. Nathorst, с. 93, табл. 1, фиг. 3; табл. 13, фиг. 1, 2; табл. 20, фиг. 14–16. Верхний триас. Швеция.

1971. Станиславский, с. 84, табл. 10, фиг. 2, 3; табл. 11, фиг. 2, 3; табл. 26, фиг. 2; табл. 27, фиг. 1–8; рис. 42, 43. Верхний триас. Донбасс.

Baiera palmata Heer

1876b. Heer, с. 115, табл. 28, фиг. 2,*а–d*. Юра. Р. Амур.

1880. Heer, с. 15. Юра. Иркутский бассейн.

Baiera polymorpha Samylina

1956б. Самылина, с. 1525, табл. 1, фиг. 1–7. Нижний мел. Р. Алдан.

1959а. Василевская, с. 62, табл. 2, фиг. 5–7,*а*. Нижний мел (ынгырская и чонгургасская свиты). Сангарский район, бассейн р. Лены.

1963. Самылина, с. 95, табл. 23, фиг. 1–5; табл. 24; табл. 25, фиг. 2–6. Нижний мел. Бассейн р. Алдана.

1976а. Самылина, с. 142, табл. 1, фиг. 1, 2. Нижний мел (ожогинская свита). Р. Силяп, бассейн р. Колымы.

1976. Самылина, с. 57, табл. 27, фиг. 1, 2. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Baiera pulchella Heer

1876b. Heer, с. 114, табл. 20, фиг. 3,*с*; табл. 22, фиг. 1,*а*; табл. 28, фиг. 3. Юра. Бассейн р. Амура.

1878а. Heer, с. 24, табл. 7, фиг. 2. Нижний мел. Р. Лена.

1880. Heer, с. 15, табл. 4, фиг. 3, 4. Юра. Иркутский бассейн.

1923. Хахлов, с. 8, табл. 5, фиг. 23, 24; табл. 6, фиг. 25, 26. Юра. Иркутский бассейн.

1931. Хахлов, с. 25, табл. 19, фиг. 48, 49. Юра. Кузбасс.

1933б. Криштофович, табл. 4, фиг. 1. Нижний мел. Южное Приморье.

1934. Криштофович, Принада, с. 72, рис. 35, *8*. Нижний мел. Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Baiera setacea (Heer) Prynada

1876b. Trichopitys setacea. Heer, с. 64, табл. 1, фиг. 9, 9,*а*. Юра. Иркутский бассейн.

1962. Baiera setacea. Принада, с. 192, табл. 10, фиг. 11; табл. 11, фиг. 5. Юра. Иркутский бассейн.

1962. Тесленко, с. 136, табл. 16, фиг. 7. Юра. Р. Томь, Кузбасс.

1970б. Тесленко, с. 157, табл. 36, фиг. 8, 9. Средняя юра (осиновская свита). Р. Томь, Западная Сибирь.

Baiera spectabilis Nathorst

1906. Nathorst, с. 4, табл. 1, фиг. 1–8; табл. 2, фиг. 1; рис. 1–8. Триас. Швеция.

1931. Принада, с. 29, табл. 3, фиг. 27. Юра. Рават, Средняя Азия.
1935. Принада, с. 221, рис. 5. Юра. Бассейн р. Нарына, Средняя Азия.
1936а. Нейбург, с. 147, табл. 3, фиг. 3. Юра. Тува.

Baiera cf. spectabilis Nathorst

1936а. Турутанова-Кетова, с. 101, табл. 1, фиг. 9, Юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Baiera taeniata Braun

1843. Braun in Münster, с. 21. Триас. Западная Европа.
1933б. Криштофович, Принада, с. 19, табл. 5, фиг. 1. Верхний триас — нижняя юра. Челябинский бассейн.
1962. Сикстель, с. 369, табл. 30, фиг. 1–4. Триас. Мадыген, Южная Фергана.
1966. Генкина, с. 95, табл. 43, фиг. 11, 12; табл. 44, фиг. 1, 2. Верхний триас (коктуйская свита). Иссык-Куль.

Baiera tripartita Vassilevskaja

1960. Василевская, с. 163, табл. 5, фиг. 1, 2. Нижний мел (огонер-юряхская свита). Низовья р. Лены.
1963. Василевская, Павлов, табл. 25, фиг. 4. Нижний мел (огонер-юряхская свита). Низовья р. Лены.

Baiera uninervis Prynada

1934. Криштофович, Принада, с. 74. Нижний мел. Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Baiera sp.

1907. Сьюорд, с. 13, табл. 2, фиг. 22. Юра. Бассейн р. Аракса, Кавказ.
1911. Сьюорд, Томас, с. 8, табл. 2, фиг. 13. Юра. Иркутский бассейн.
1923. Хахлов, с. 9, табл. 6, фиг. 29; табл. 7, фиг. 30. Юра. Иркутский бассейн.
1926. Хахлов, с. 13, фиг. 12. Юра. Иркутский бассейн.
1930. Турутанова-Кетова, с. 156. Юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1932. Нейбург, с. 76, табл. 1, фиг. 10. Верхняя юра. Р. Омолон, Северо-Восток СССР.
1933б. Принада, с. 27, табл. 2, фиг. 7. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.
1934. Принада, с. 63, рис. 12. Триас. Памир.
1936б. Нейбург, с. 495. Юра. Р. Томь, Западная Сибирь.
1938б. Принада, с. 39. Средняя юра. Эмбинский район, Западный Казахстан.
1948. Голова, с. 100, табл. 7, фиг. 54. Юра. Чулымо-Енисейский бассейн.
1960. Василевская, с. 165, табл. 4, фиг. 8, 9; табл. 5, фиг. 3. Нижний мел (булунская свита). Низовья р. Лены.
1963. Василевская, Павлов, табл. 13, фиг. 5; табл. 15, фиг. 1. Нижний мел (кюсюрская и булунская свиты). Р. Лена.

Baierella R. Potonie, 1933

Baierella bohnei R. Potonie

1933. Potonie R., с. 249, рис. 2,3. Юра. Иран.

Baierella uninervis (Samylina) Krassilov

1956в. Sphenobaiera uninervis. Самылина, с. 538, рис. 3, *1*. Нижний мел. Р. Алдан.

1972. Baierella uninervis. Красилов, с. 48, табл. 14, фиг. 1—5; рис. 7,*р—с*. Нижний мел (чемчукинская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Eretmophyllum Thomas, 1913

Eretmophyllum pubescens Thomas

1913а. Thomas, с. 259, табл. 6. Юра. Англия.

Eretmophyllum baikonuricum Orlovskaja

1962. Орловская, с. 1443, табл. 4, фиг. 6; рис. 3. Юра. Байконур, Казахстан.

Eretmophyllum cf. baikonuricum Orlovskaja

1970б. Тесленко, с. 165, табл. 44, фиг. 8. Юра (распадская свита). Р. Томь, Западная Сибирь.

Eretmophyllum boroldaicum Orlovskaja

1976. Долуденко, Орловская, с. 70, табл. 26, фиг. 5—7; табл. 27, фиг. 1—6; табл. 28, фиг. 1—6; рис. 37*а—л*. Средняя юра. Боролдай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Eretmophyllum glandulosum (Samylina) Krassilov

1956а. Ginkgodium glandulosum. Самылина, с. 1526, табл. 1, фиг. 8—10. Нижний мел. Р. Алдан.

1972. Eretmophyllum glandulosum. Красилов, с. 50, табл. 15, фиг. 1—10; рис. 7, *а—л*. Нижний мел (чагдамынская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Eretmophyllum ketovae Gomolitzky

1965. Гомолицкий, с. 129, табл. 11, фиг. 8; табл. 12, фиг. 3—7. Юра (гурудская свита). Гиссарский хребет.

Eretmophyllum magnum Doludenko

1976. Долуденко, Орловская, с. 113, табл. 71, фиг. 1; табл. 72, фиг. 1—7. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Eretmophyllum ovatum Teslenko

1970б. Тесленко, с. 166, табл. 44, фиг. 6, 7. Средняя юра (осиновская свита). Р. Томь, Западная Сибирь.

Eretmophyllum (?) rigens Savizkaja

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 190, табл. 17, фиг. 5. Триас. Шураб, Средняя Азия.

Eretmophyllum saighanensis (Seward) Seward

1912. Podozamites saighanensis. Seward, с. 35, табл. 4, фиг. 53. Юра. Афганистан.

1919. Eretmophyllum saighanensis. Seward, с. 60, фиг. 658. Юра. Афганистан.

1934. Криштофович, Принада, с. 74, рис. 36, *1*. Верхний триас — нижняя юра. Челябинский бассейн.

1968а. Абилаев, с. 6, табл. 1, фиг. 1, 2. Юра. Убоганский бассейн, Казахстан.

Eretmophyllum cf. saighanensis (Seward) Seward

1933. Криштофович, Принада, с. 20, табл. 2, фиг. 8. Верхний триас – нижняя юра. Челябинский бассейн.

Eretmophyllum thomasii Doludenko et Svanidze

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 71, табл. 79, фиг. 1–6; табл. 80, фиг. 1–5; Верхняя юра. Грузия.

Eretmophyllum whitbiense Thomas

1913b. Thomas, с. 259, табл. 7. Юра. Англия.

Eretmophyllum aff. whitbiense Thomas

1972. Красилов, с. 52, табл. 8, фиг. 1–5; рис. 7, *м–п, ц*. Нижний мел (ургальская свита). Бассейн р. Буреи.

Eretmophyllum sp.

1962. Орловская, с. 1444, рис. 2, *б*. Юра (угленосная свита). Алакуль, Казахстан.

1968а. Абилаев, с. 6. Юра. Убоганский бассейн. Казахстан.

1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 87, табл. 61, фиг. 1. Юра. Шураб, Южная Фергана.

Feildenia Heer, 1878

Feildenia rigida Heer

1878c. Heer, с. 20, табл. 1, фиг. 3–11,*a,b*; табл. 2, фиг. 1,*a*; табл. 8, фиг. 1. Палеоген. Гренландия.

Род Feildenia является синонимом Torellia Heer, 1870

Feildenia cuspiformis (Heer) Nathorst

1876b. Podozamites cuspiformis, Heer, с. 46, табл. 4, фиг. 11, 12. Юра. Иркутский бассейн.

1897b. Feildenia cuspiformis. Nathorst, с. 57.

1927. Принада, с. 973, табл. 48, фиг. 10, 11, 13. Юра. Самарская Лука, европейская часть СССР.

1934. Криштофович, Принада, с. 74, рис. 31–1. Юра – нижний мел. Иркутский бассейн, р. Бурея.

Feildenia ensiformis (Heer) Nathorst

1876b. Podozamites ensiformis. Heer, с. 46, табл. 4, фиг. 8–10; с. 111, табл. 20, фиг. 6; табл. 28, фиг. 5,*а*. Юра. Иркутский бассейн.

1897b. Feildenia ensiformis. Nathorst, с. 57.

1934. Криштофович, Принада, с. 74, рис. 37, *2*. Юра. Иркутский бассейн.

1938б. Принада, с. 391. Юра. Эмбинский район, Западный Казахстан.

1955. Аксарин, с. 175, табл. 24, фиг. 9,а,*б*. Юра. Западная Сибирь.

1962. Принада, с. 194, рис. 49, 50. Юра. Иркутский бассейн.

Feildenia (?) grandifolia Prynada

1938а. Принада, с. 49, табл. 5, фиг. 6. Нижний мел. Бассейн р. Колымы.

Feildenia minima Srebrodolskaja

1960. Сребродольская, с. 111, табл. 1, фиг. 11. Триас. Южное Приморье.

Feildenia nordenskioldii Nathorst

1897b. Nathorst, с. 56, табл. 3, фиг. 16–27. Нижний мел. Шпицберген.
1944. Турутанова-Кетова, с. 83, рис. 8. Юра. Мангышлак.

Feildenia cf. nordenskioldii Nathorst

1962. Принада, с. 195, табл. 19, фиг. 8. Юра. Забайкалье.

Feildenia sp.

1929. Принада, с. 140, рис. 1. Юра. Южный Алтай.
1952. Брик, с. 64, табл. 19, фиг. 6. Юра (свита Дженишке). Яйсан, бассейн р. Илек, Западный Казахстан.
1957. Станиславский, с. 73, табл. 15, фиг. 5, 6. Средняя юра. Донбасс.
1961. Ковальчук, табл. 57, фиг. 7, 8. Верхний триас (тологойская свита). Кендерлыкская мульда, Восточный Казахстан.

Ginkgo L., 1771

Ginkgo biloba L. (современный)

Ginkgo adiantoides (Unger) Heer

1850. Salisburia adiantoides. Unger, с. 392. Палеоген. Италия.
1878 b. Ginkgo adiantoides. Heer, с. 21, табл. 2, фиг. 7–10. Верхний мел. Сахалин.
1936. Шапаренко, с. 5–32 (обзор), фиг. 5–11. Юра — антропоген. Северное полушарие.
1952. Вахрамеев, с. 169, табл. 9, фиг. 2–4; рис. 30. Нижний мел. Бассейн р. Эмбы, Западный Казахстан.
1958. Вахрамеев, с. 105, табл. 25, фиг. 2, 3. Нижний мел. Бассейн р. Лены.
1959а. Василевская, с. 58, табл. 1, фиг. 1. Нижний мел (чонгургасская свита). Сангарский район, бассейн р. Лены.
1960. Василевская, с. 153, табл. 1, фиг. 1–19; табл. 2, фиг. 1–10. Нижний мел (булунская и огонер-юряхская свиты). Булунский район, низовья р. Лены.

Ginkgo ex gr. adiantoides (Unger) Heer

1969. Савицкая, рис. 1,*г*. Юра. Южная Фергана.
1970. Абрамова, с. 47, табл. 4, фиг. 12, 13. Нижний мел (джарджанская свита). Жиганский район, бассейн р. Лены.
1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 86, табл. 52, фиг. 5. Юра. Шураб, Южная Фергана.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 186, табл. 14, фиг. 8. Верхняя юра (?). Шураб, Южная Фергана.
1974. Лебедев Е.Л., с. 62, табл. 16, фиг. 1–6; табл. 17, фиг. 1; рис. 28. Нижний мел. Западное Приохотье.
1975. Филиппова, с. 32, табл. 4, фиг. 7. Нижний мел. Северо-Восток СССР.
1976. Самылина, с. 54, табл. 20, фиг. 1, 2; табл. 26, фиг. 7–9. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Ginkgo angusticuneata Vassilevskaja

1960. Василевская, с. 156, табл. 3, фиг. 5, 6. Нижний мел (булунская свита). Низовья р. Лены.
1963. Василевская, Павлов, табл. 14, фиг. 1. Нижний мел (булунская свита). Низовья р. Лены.

1976. Самылина, с. 54, табл. 27, фиг. 6, 7. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Ginkgo balejensis Prynada

1962. Принада, с. 170, табл. 10, фиг. 4, 5; рис. 35. Юра. Иркутский бассейн.

Ginkgo bella Sixtel

1953в. Сикстель, с. 86, табл. 3, фиг. 3; рис. 5. Юра. Ферганский хребет.

Ginkgo buninae Abilaev

1968. Абилаев, с. 5, табл. 1, фиг. 3, 4; рис. 2. Юра (дузбайская свита). Тургай, Казахстан.

Ginkgo concinna Heer

1876b. Heer, с. 63, табл. 13, фиг. 6–8; табл. 7, фиг. 8. Юра. Иркутский бассейн.
1880. Heer, с. 18. Юра. Иркутский бассейн.
1933. Криштофович, табл. 7, фиг. 6. Юра. Иркутский бассейн.
1934. Криштофович, Принада, стр. 72, рис. 35–6. Юра. Иркутский бассейн.
1962. Принада, с. 172, табл. 9, фиг. 8, 9; табл. 10, фиг. 6; рис. 36. Юра. Иркутский бассейн.

Ginkgo ex gr. concinna Heer

1976. Самылина, с. 55, табл. 22, фиг. 3–7. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Ginkgo delicata Samylina

1967а. Самылина, с. 136, табл. 1, фиг. 3–12. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Р. Зырянка, бассейн р. Колымы.
1976. Самылина, с. 55, табл. 26, фиг. 2–6. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.
1963. Ефимова, с. 303, табл. 1, фиг. 1, 2, 4,*а; б,* 5, 8. Нижний мел. Алазейское плато, Северо-Восток СССР.
1963. Василевская, Павлов, табл. 13, фиг. 1; табл. 25, фиг. 3; табл. 26, фиг. 1; табл. 36, фиг. 1, 2. Нижний мел (булунская, огонер-юряхская и укинская свиты). Низовья р. Лены.
1963. Самылина, с. 97, табл. 22, фиг. 8, 9. Нижний мел. Бассейн р. Алдана.
1966. Киричкова, Сластенов, табл. 2, фиг. 7–9. Нижний мел. Бассейн р. Лены.

Ginkgo digitata (Brongniart) Heer

1828 (1828а–1838). Cyclopteris digitata. Brongniart, с. 219, табл. 61 bis, фиг. 2, 3. Юра. Англия.
1876а. Ginkgo digitata. Heer, с. 40. табл. 8, фиг. 1,*а*; табл. 10, фиг. 1–8. Нижний мел. Шпицберген.
1905. Krasser, с. 604, табл. 2, фиг. 3. Юра. Забайкалье.
1907. Сьюорд, с. 32, табл, 7, фиг. 53–55. Юра. Средняя Азия.
1910. Криштофович, с. 13, табл. 9, фиг. 1. Нижний мел. Южное Приморье.
1911. Сьюорд, Томас, с. 8, табл. 2, фиг. 10–12. Юра. Иркутский бассейн.
1911. Томас, с. 26, табл, 4, фиг. 7; табл. 8, фиг. 2. Юра. Каменка. Донбасс.
1967. Делле, с. 102, табл. 23, фиг. 8; табл. 24, фиг. 3–8. Средняя юра. Ткварчели. Грузия.

1970б. Тесленко, с. 154, табл. 35, фиг. 6, 8; табл. 36, фиг. 1–6 (итатская, осиновская и эрбекская свиты). Чулымо-Енисейский и Кузнецкий бассейны. Тува.
1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 84, табл. 53, фиг. 1–5; табл. 54, фиг. 1–4. Юра. Туркмения, Фергана, Средняя Азия; Мангышлак, Казахстан.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 185, табл. 14, фиг. 1, 2. Юра. Шураб, Южная Фергана.
1972. Быстрицкая, с. 56, табл. 3, фиг. 2, 4–6. Юра. Кузбасс.
1955. Аксарин, с. 170, табл. 15, фиг. 4, 5. Юра. Западная Сибирь.
1955. Ананьев, с. 187, табл. 25, фиг. 2,*б*. Нижний мел (кийская свита). Р. Кия, Западная Сибирь.

Ginkgo cf. digitata (Brongniart) Heer

1925. Моисеев, с. 567. Юра. Крым.

Ginkgo ex gr. digitata (Brongniart) Heer

1965. Лебедев Е.Л., с. 107, табл. 26, фиг. 1–5; рис. 33. Верхняя юра (депская свита). Р. Зея, бассейн р. Амура.

Ginkgo digitata (Brongniart) Heer var. magnifolia Kryshtofovich et Prynada

1934. Криштофович, Принада, с. 71. Юра. Каменка, Донбасс.

Ginkgo digitata (Brongniart) Heer var. papillata Prynada

1962. Принада, с. 182, табл. 5, фиг. 4; рис. 45. Юра. Забайкалье.

Ginkgo donetziana Prynada in Kiritchkova

1969. Киричкова, с. 299, табл. 10, фиг. 1–6. Юра (промежуточная и веселовская свиты). Восточный Урал.

Ginkgo ferganensis Brick in Sixtel

1960. Сикстель, с. 77, табл. 12, фиг. 1, 2. Триас. Р. Ягноб, Средняя Азия.
1923. Хахлов, с. 4, табл. 1, фиг. 5, 6. Юра. Иркутский бассейн.
1927. Криштофович, с. 36, табл. 31, фиг. 5. Юра. Бассейн р. Кии, Западная Сибирь.
1929. Хахлов, с. 3, табл. 2, фиг. 6–8. Юра. Забайкалье.
1931. Хахлов, с. 12, 14, 18, 24, табл. 7, фиг. 19. Юра. Кузбасс.
1932. Криштофович, Принада, с. 371. Нижний мел. Южное Приморье.
1934. Криштофович, Принада; с. 71. Юра, нижний мел. Сибирь, Дальний Восток.
1957. Станиславский, с. 69, табл. 12, фиг. 1–5; табл. 13, фиг. 1, 2. Юра. Донбасс.
1958. Орловская, с. 131, табл. 2, фиг. 1. Юра (песчано-конгломератовая свита). Майкюбень, Казахстан.
1959а. Василевская, с. 58, табл. 1, фиг. 2, 3. Нижний мел (ынгырская и чонгургасская свиты). Сангарский район, бассейн р. Лены.
1959а. Делле, с. 87, табл. 1, фиг. 1–7. Юра. Ткварчели, Грузия.
1960. Василевская, с. 157, табл. 3, фиг. 1–4. Нижний мел (булунская свита). Низовья р. Лены.
1960. Тесленко, с. 152, табл. 18, фиг. 5. Юра (итатская свита). Р. Енисей.
1961. Просвирякова, с. 158. Юра (чульманская свита). Южная Якутия.

1962. Принада, с. 179, табл. 10, фиг. 9, 10; рис. 42–44. Юра. Иркутский бассейн.
1962. Тесленко, с. 131, табл. 18, фиг. 6, 7. Юра. Р. Енисей (окрестности г. Красноярска) и Кузбасс.
1963. Василевская, Павлов, табл. 13, фиг. 4. Нижний мел (булунская свита). Р. Лена.
1963а. Генкина, с. 75, табл. 40, фиг. 3–5. Средняя юра. Орский бассейн.
1965. Сванидзе, стр. 29, рис. 4. Юра. Грузия.
1966. Просвирякова, с. 99, табл. 20, фиг. 1. Средняя юра (тонашинская свита). Мангышлак.
1962. Сикстель, табл. 2, фиг. 4. Триас. Р. Ягноб, Средняя Азия.
1966. Генкина, с. 91, табл. 41, фиг. 3–6; табл. 42, фиг. 1–4. Юра (джильская, аксайская и угленосная свиты). Иссык-Куль.
1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 79, табл. 43, фиг. 1–4; табл. 44, фиг. 1, 2. Триас. Р. Ягноб, Средняя Азия.

Ginkgo flabellata Heer

1876b. Heer, с. 60, табл. 13, фиг. 3, 4; табл. 7, фиг. 10, стр. 115, табл. 28, фиг. 6. Юра. Иркутский бассейн, р. Амур.
1880. Heer, с. 16, табл. 4, фиг. 7,*a*. Юра. Иркутский бассейн.
1934. Криштофович, Принада, с. 72. Юра. Иркутский бассейн. Нижний мел, Южное Приморье.
1961. Просвирякова, стр. 159, табл. 9, фиг. 3. Юра (чульманская свита). Южная Якутия.
1969. Киричкова, с. 299, рис. 6. Юра (карьерная свита). Восточный Урал.

Ginkgo (Ginkgodium) furcinerve Brick in Sixtel

1963. Ginkgodium furcinerve. Василевская в кн.: Основы палеонтологии, т. 15, с. 184, рис. 30. Юра. Фергана, Средняя Азия.
1971. Ginkgo (Ginkgodium) furcinerve. Сикстель, Кузичкина и др., с. 87, табл. 45, фиг. 3–7; табл. 46, фиг. 1, 2. Юра. Шураб, Южная Фергана.

Ginkgo grandiflora Heer

1880. Heer, с. 18, табл. 4, фиг. 1–6. Юра. Иркутский бассейн.

Ginkgo huttonii (Sternberg) Heer

1838 (1820–1838). Cyclopteris huttonii. Sternberg, с. 66. Юра. Англия.
1876b. Ginkgo huttonii. Heer, с. 59, табл. 5, фиг. 1,*b*; табл. 8, фиг. 4; табл. 10, фиг. 8. Юра. Иркутский бассейн.
1878a. Heer, с. 25, табл. 6, фиг. 7. Нижний мел. Р. Лена.
1923. Хахлов, с. 3, табл. 1, фиг. 1, 2. Юра. Иркутский бассейн.
1932. Криштофович, Принада, с. 371. Верхний триас. Южное Приморье.
1934. Криштофович, Принада, с. 71, рис. 35, *3*. Юра. Иркутский бассейн. Нижний мел. Южное Приморье.
1938a. Принада, с. 44, табл. 4, фиг. 6; табл. 5, фиг. 2, 3; рис. 17,*B*. Нижний мел. Бассейн р. Колымы.
1952. Сикстель, с. 39, табл. 8, фиг. 2; рис. 18. Юра (угленосная свита). Фан-Ягноб, Средняя Азия.
1958. Вахрамеев, с. 107, табл. 25, фиг. 4, 5; табл. 26, фиг. 2, 3. Нижний мел. Бассейн р. Лены.

1959а. Василевская, с. 59, табл. 1, фиг. 4–6. Нижний мел (ынгырская и чонгургасская свиты). Сангарский район, бассейн р. Лены.
1960. Василевская, с. 159, табл. 4, фиг. 1–3. Нижний мел (кюсюрская, булунская и огонер-юряхская свиты). Низовья р. Лены.
1962. Тесленко, с. 132, табл. 20, фиг. 1, 2. Юра. Красноярский край и Кузбасс.
1963. Василевская, Павлов, табл. 8, фиг. 3; табл. 13, фиг. 2; табл. 26, фиг. 2; табл. 36, фиг. 5. Нижний мел (кюсюрская, булунская, огонер-юряхская и укинская свиты). Низовья р. Лены.
1963. Самылина, с. 97, табл. 23, фиг. 6, 7,*а*; табл. 29, фиг. 7, 8. Верхняя юра и нижний мел. Бассейн р. Алдана.
1966. Генкина, с. 93, табл. 43, фиг. 1–4. Юра (аксайская, непродуктивная угленосная и безугольная свиты). Иссык-Куль.
1970б. Тесленко, с. 152, табл. 35, фиг. 2–5, 7. Юра (макаровская, осиновская, итатская, збекская, салдамская свиты). Чулымо-Енисейский и Кузнецкий бассейны, Тува.
1971. Маркович, с. 95, табл. 10, фиг. 1–3. Триас (кызылкаинская свита) и юра (катынадырская и орская свиты). Южный Урал.
1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 83, табл. 52, фиг. 6; табл. 54, фиг. 5, 6; табл. 55, фиг. 1–5; табл. 56, фиг. 1, 2; табл. 57, фиг. 1–3. Триас и юра. Шураб, Иссык-Куль, Ягноб, Яккабаг, Средняя Азия.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 184, табл. 14, фиг. 3–5. Триас и юра. Шураб, Фергана.

Ginkgo ex gr. huttonii (Sternberg) Heer

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 101, табл. 47, фиг. 1–7; табл. 48, фиг. 1, 5. Нижний мел (ургальская и чемчукинская свиты). Бассейн р. Буреи.
1967а. Самылина, с. 137, табл. 6, фиг. 1–3. Нижний мел (ожогинская свита). Р. Силян, Северо-Восток СССР.
1976. Самылина, с. 55, табл. 32, фиг. 2; табл. 34, фиг. 4,*б*. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Ginkgo cf. huttonii (Sternberg) Heer var. magnifolia Vassilevskaja

1960. Василевская, с. 161, табл. 4, фиг. 4. Нижний мел (огонер-юряхская свита). Низовья р. Лены.
1963. Василевская, Павлов, табл. 26, фиг. 3. Нижний мел (огонер-юряхская свита). Низовья р. Лены.

Ginkgo inornata Sixtel

1952. Сикстель, с. 42, табл. 8, фиг. 5; рис. 21. Юра (угленосная свита). Р. Фандарья, Средняя Азия.

Ginkgo insolita Sixtel

1953в. Сикстель, с. 85, табл. 3, фиг. 1, 3; табл. 9, фиг. 5; табл. 10, фиг. 2; рис. 4. Юра. Ферганский хребет.

Ginkgo integriuscula Heer

1876а. Heer, с. 44, табл. 10, фиг. 7–9. Нижний мел. Шпицберген.
1878а. Heer, с. 25, табл. 6, фиг. 5, 6. Нижний мел. Р. Лена.

Ginkgo lancetoloba Kiritchkova

1969. Киричкова, с. 300, табл. 9, фиг. 3, 4; табл. 17, фиг. 1,*а*, 2. Юра (карьерная свита). Восточный Урал.

Ginkgo lepida Heer

1876b. Heer, с. 62, табл. 7, фиг. 7; табл. 12. Юра. Иркутский бассейн.

1880. Heer, с. 17, табл. 4, фиг. 7,*b*, 9–12; табл. 5, фиг. 1,*а*, 2, 3,*а*, 4. Юра. Иркутский бассейн.

1931. Принада, с. 28, табл. 2, фиг. 13; табл. 5, фиг. 48, 49; табл. 6, фиг. 65. Юра. Зеравшан, Средняя Азия.

1931. Хахлов, с. 8, табл. 2, фиг. 6; табл. 4, фиг. 12. Юра. Кузбасс.

1934. Криштофович, Принада, с. 72, рис. 35,*4*. Юра. Иркутский бассейн, р. Бурея.

1952. Сикстель, с. 38, табл. 6, фиг. 3; табл. 10, фиг. 8. Юра (угленосная свита). Фан-Ягноб, Средняя Азия.

1953в. Сикстель, с. 88, рис. 6. Юра. Ферганский хребет.

1955. Аксарин, с. 170, табл. 15, фиг. 3; рис. 183. Юра. Западная Сибирь.

1961. Просвирякова, с. 158. Средняя юра (дурайская свита). Южная Якутия.

1962б. Киричкова, табл. 2, фиг. 3. Юра. (карьерная свита). Восточный Урал.

1962. Принада, с. 176, табл. 9, фиг. 5; табл. 10, фиг. 1, 7; табл. 11, фиг. 5; рис. 39–41. Юра. Иркутский бассейн.

1962. Тесленко, с. 132, рис. 35. Нижняя юра (макаровская свита). Р. Чулым, Западная Сибирь.

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 204, табл. 55, фиг. 1, 5; табл. 56, фиг. 1–5; табл. 57, фиг. 1, 2; табл. 58, фиг. 1, 2; табл. 59, фиг. 1–7; рис. 84. Юра. Западная Туркмения.

1963а. Генкина, с. 73, табл. 38, фиг. 1–4; табл. 39, фиг. 1, 2. Средняя юра. Орский бассейн.

1963. Самылина, с. 97, табл. 22, фиг. 10. Верхняя юра и нижний мел. Бассейн р. Алдана.

1966. Генкина, с. 91, табл. 42, фиг. 5–7. Юра (джильская, непродуктивная и угленосная свиты). Иссык-Куль.

1966. Просвирякова, с. 101, табл. 21, фиг. 1. Средняя юра (джарсуйская свита). Мангышлак.

1969. Киричкова, с. 301, табл. 8, фиг. 9, 10. Юра (карьерная свита). Восточный Урал.

1970б. Тесленко, с. 151, табл. 51, фиг. 3. Юра (макарьевская свита). Р. Чулым, Западная Сибирь.

Ginkgo cf. lepida Heer

1963. Василевская, Павлов, табл. 36, фиг. 4; табл. 37, фиг. 1. Нижний мел (укинская свита). Низовья р. Лены.

Ginkgo ex gr. lepida Heer

1967а. Самылина, с. 138, табл. 6, фиг. 5, 6,*а*. Нижний мел (ожогинская и силяпская свиты). Р. Силяп, бассейн р. Колымы.

1976. Самылина, с. 56, табл. 27, фиг. 3. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Ginkgo lepida Heer f. angustiloba Sixtel

1962. Сикстель, с. 40, табл. 10, фиг. 4; рис. 19. Юра (угленосная свита). Фан-Ягноб, Средняя Азия.

Ginkgo mziae Svanidze

1971. Сванидзе, с. 88, табл. 1, фиг. 1—6; рис. 1—6. Юра. Грузия.

Ginkgo nana (Dawson) Bell

1976. Самылина, с. 56, табл. 25, фиг. 1. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Ginkgo obrutschewii Seward

1911. Сьюорд, с. 17, табл. 3, фиг. 41; табл. 4, фиг. 42, 43; табл. 6, фиг. 71; табл. 7, фиг. 74, 76. Джунгария.

1934. Криштофович, Принада, с. 71. Юра. Иркутский бассейн.

1952. Сикстель, с. 41, рис. 20. Юра (угленосная свита). Фан-Ягноб, Средняя Азия.

1960. Василевская, с. 161, табл. 4, фиг. 6. Нижний мел (булунская свита). Низовья р. Лены.

1963. Василевская, Павлов, табл. 14, фиг. 2. Нижний мел (булунская свита). Низовья р. Лены.

1965. Лебедев Е.Л., с. 112, табл. 18, фиг. 1,*а*, 2; табл. 31, фиг. 4. Верхняя юра (депская свита). Р. Зея, бассейн р. Амура.

1970б. Тесленко, с. 152, табл. 35, фиг. 1. Юра (осиновская свита). Кузбасс.

1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 85, табл. 45, фиг. 1, 2. Юра. Р. Ягноб, Средняя Азия.

Ginkgo cf. orbutschewii Seward

1912. Сьюорд, с. 12, табл. 1, фиг. 9. Верхняя юра. Р. Тырма, бассейн р. Буреи.

Ginkgo papilionaceus Vassilevskaja

1959а. Василевская, с. 60, табл. 2, фиг. 1—3. Нижний мел (чонгургасская свита). Сангарский район, бассейн р. Лены.

Ginkgo paradiantoides Samylina

1967а. Самылина, с. 138, табл. 2, фиг. 2—5; табл. 3, фиг. 1—11; табл. 4, фиг. 1—10; табл. 6, фиг. 7,*а*; табл. 8, фиг. 7,*б*. Нижний мел (силянская и буор-кемюсская свиты). Бассейн р. Колымы.

1967б. Самылина с. 312, табл. 5, фиг. 6—8. Нижний мел (хатырыкская свита). Бассейн р. Лены.

1970. Абрамова, с. 47, табл. 5, фиг. 1—6; табл. 6, фиг. 1, 2. Нижний мел (булунская свита). Жиганский район, бассейн р. Лены.

Ginkgo parahuttonii Abramova

1970. Абрамова, с. 48, табл. 6, фиг. 3—7; табл. 7, фиг. 1—6. Нижний мел (кюсюрская свита). Низовья р. Лены.

Ginkgo parvula Vassilevskaja

1963. Василевская, Павлов, табл. 36, фиг. 6—10. Нижний мел (укинская свита). Низовья р. Лены.

1966. Василевская, Абрамова, с. 83, табл. 6, фиг. 2. Нижний мел (укинская свита). Низовья р. Лены.

Ginkgo pluripartita (Schimper) Heer

1869 (1869—1874). Baiera pluripartita. Schimper, с. 423. Нижний мел. Западная Европа.

1881b. Ginkgo pluripartita. Heer, с. 6.

1967. Красилов, с. 173, табл. 58, фиг. 1, 2. Нижний мел (галенковская, липовецкая, северосучанская и френцовская свиты). Южное Приморье).

Ginkgo cf. pluripartita (Schimper) Heer

1952. Вахрамеев, с. 171, рис. 31. Нижний мел (кызылшенская свита). Кызыл-Шен, Западный Казахстан.

Ginkgo polaris Nathorst

1897. Nathorst in Newton and Teall, с. 494, табл. 38, фиг. 1, 2. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

1911. Томас, с. 27, табл. 4, фиг. 8. Юра. Каменка, Донбасс.

1934. Криштофович, Принада, с. 72. Юра. Каменка, Донбасс.

1966. Василевская, Абрамова, с. 84, табл. 6, фиг. 1. Нижний мел (укинская свита). Низовья р. Лены.

1967а. Самылина, с. 140, табл. 2, фиг. 6—12. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Р. Зырянка, бассейн р. Колымы.

Ginkgo cf. polaris Nathorst

1955. Ананьев, с. 187, табл. 25, фиг. 3. Нижний мел (кийская свита). Р. Кия. Западная Сибирь.

Ginkgo polaris Nathorst var. pygmea Vassilevskaja

1963. Василевская, Павлов, табл. 37, фиг. 2, 3. Нижний мел (укинская свита). Низовья р. Лены.

Ginkgo pusilla Heer

1876b. Heer, с. 61, табл. 7, фиг. 9; табл. 9, фиг. 5,*c*; табл. 10, фиг. 7,*b, c;* табл. 13, фиг. 5; с. 116, табл. 22, фиг. 4,*f*. Юра. Иркутский бассейн. Р. Бурея, бассейн р. Амура.

1880. Heer, с. 16, табл. 4, фиг. 8. Юра. Иркутский бассейн.

Ginkgo cf. pusilla Heer

1963. Василевская, Павлов, табл. 37, фиг. 4. Нижний мел (укинская свита). Низовья р. Лены.

Ginkgo resecta Savizkaja

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 185, табл. 14, фиг. 6, 7. Нижняя юра. Кугитанг, Средняя Азия.

1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 86, табл. 52, фиг. 7—9. Нижняя юра. Кугитанг, Гиссарский хребет, Средняя Азия.

Ginkgo romanowskii Brick in Genkina

1966. Генкина, с. 92, табл. 43, фиг. 5,*а, б*. Юра (угленосная свита). Иссык-Куль.

Ginkgo schmidtiana Heer

1876b. Heer, с. 60, табл. 13, фиг. 1, 2; табл. 7, фиг. 5. Юра. Иркутский бассейн.

1931. Хахлов, с. 8, 29, табл. 3, фиг. 10. Юра. Кузбасс.

Ginkgo sibirica Heer

1876b. Heer, с. 61, табл. 7, фиг. 6; табл. 9, фиг. 5,*b*; табл. 11; стр. 116, табл. 20, фиг. 3,*b*, 6,*c*; табл. 23, фиг. 3. Юра. Иркутский бассейн и р. Амур.

1878a. Heer, с. 25, табл. 7, фиг. 8,*a*, *b*. Нижний мел. Низовья р. Лены.

1880. Heer, с. 16, табл. 4, фиг. 13; табл. 5, фиг. 5–8. Юра. Иркутский бассейн.

1907. Сьюорд, с. 33, табл. 7, фиг. 56, 57. Юра. Фергана, Средняя Азия.

1910. Криштофович, с. 13, табл. 3, фиг. 2–4. Нижний мел. Южное Приморье.

1916. Криштофович, с. 116, табл. 10, фиг. 6, 7; табл. 11, фиг. 1. Нижний мел, Южное Приморье.

1923. Хахлов, с. 4, табл. 1, фиг. 5, 6. Юра. Иркутский бассейн.

1929. Хахлов, с. 4, табл. 2, фиг. 9, 10. Юра. Забайкалье.

1931. Хахлов, с. 16, табл. 8, фиг. 22. Юра. Кузбасс.

1932. Криштофович, Принада, с. 372. Нижний мел. Южное Приморье.

1933. Криштофович, табл. 12, фиг. 6; табл. 16, фиг. 4. Юра. Иркутский бассейн.

1933б. Криштофович, Принада, с. 19, табл. 2, фиг. 5; табл. 5, фиг. 4. Верхний триас — нижняя юра. Челябинский бассейн.

1933. Криштофович, Принада, с. 19, табл. 2, фиг. 5; табл. 5, фиг. 4. Верхний триас — нижняя юра. Челябинский бассейн.

1934. Криштофович, Принада, с. 71, рис. 35,*2*. Юра. Иркутский бассейн. Нижний мел. Южное Приморье.

1935. Принада, с. 220, табл. 1, фиг. 1, 13. Юра. Р. Нарын, Средняя Азия.

1952. Сикстель, с. 39, табл. 8, фиг. 6,*a*. Юра (угленосная свита). Фан-Ягноб, Средняя Азия.

1953a. Сикстель, с. 49, табл. 1, фиг. 1. Юра (угленосная свита). Ангрен, Средняя Азия.

1955. Аксарин, с. 171, рис. 184. Юра. Западная Сибирь.

1958. Вахрамеев, с. 108, табл. 26, фиг. 1. Нижний мел. Р. Лена.

1958. Орловская, с. 129, табл. 2, фиг. 1. Юра (сарыкульская и шоптыкульская свиты). Майкюбень, Казахстан.

1959a. Василевская, с. 61, табл. 2, фиг. 4. Нижний мел (чонгургасская свита). Сангарский район, бассейн р. Лены.

1960. Тесленко, с. 133, табл. 20, фиг. 3–5; рис. 36. Юра. Красноярский край и Кузбасс.

1961. Просвирякова, с. 157, табл. 9, фиг. 4, 6. Юра (нерюнгринская, дурайская, чульманская свиты). Южная Якутия.

1962. Принада, с. 174, табл. 9, фиг. 6, 7; табл. 10, фиг. 2, 3; табл. 11, фиг. 4; табл. 25, фиг. 5; рис. 27, *A–E*, 38. Юра. Иркутский бассейн.

1963. Василевская, Павлов, табл. 13, фиг. 3; табл. 36, фиг. 3. Нижний мел (булунская и укинская свиты). Низовья р. Лены.

1963a. Генкина, с. 71, табл. 37, фиг. 3–7. Средняя юра. Орский бассейн.

1965. Сванидзе, с. 30, табл. 1, фиг. 6. Юра. Грузия.

1966. Просвирякова, с. 100, табл. 20, фиг. 2, 7. Средняя юра (джарсуйская свита). Мангышлак.

1970б. Тесленко, с. 150, табл. 33, фиг. 3–6; табл. 34, фиг. 1–6; табл. 51, фиг. 4. Юра (макаровская, осиновская, итатская, эрбекская свиты). Чулымо-Енисейский и Кузнецкий бассейны, Тува.
1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 81, табл. 47, фиг. 1; табл. 48, фиг. 1–6; табл. 50, фиг. 1, 2; табл. 51, фиг. 1–3. Триас и юра. Средняя Азия.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 184, табл. 15, фиг. 1–4. Юра. Кугитанг, Средняя Азия.

Ginkgo cf. sibirica Heer

1926. Криштофович, с. 603, табл. 12, фиг. 1,*с*. Юра. Северный Кавказ.

Ginkgo ex gr. sibirica Heer

1976. Самылина, с. 56, табл. 27, фиг. 4, 5. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Ginkgo singularis Samylina

1967а. Самылина, с. 141, табл. 5, фиг. 1–5. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Р. Зырянка, бассейн р. Колымы.

Ginkgo suluktensis Gomolitzky

1971. Худайбердыев, Гомолицкий, Лобанова, с. 16, табл. 4–8; табл. 10, фиг. 1; табл. 11, фиг. 3. Нижняя юра. Сулюкта, Южная Фергана.

Ginkgo taeniata (Braun) Sixtel et Savizkaja

1843. Baiera taeniata. Braun in Munster, с. 21. Триас. Западная Европа.
1971. Ginkgo taeniata. Сикстель, Кузичкина и др., с. 80, табл. 42, фиг. 1, 2. Триас. Южная Фергана, Иссык-Куль, Средняя Азия.

Ginkgo cf. taeniata (Braun) Sixtel et Savizkaja

1971. Маркович, с. 95, табл. 10, фиг. 4. Средняя юра (орская свита). Южный Урал.

Ginkgo triangulata Savizkaja

1969. Савицкая, с. 146, рис. 1,*а–в*. Юра. Южная Фергана.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 186, табл. 15, фиг. 5, 6. Юра. Шураб, Южная Фергана.
1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 87, табл. 52, фиг. 2–4. Юра. Шураб, Южная Фергана.

Ginkgo turgaica Abilaev

1968б. Абилаев, с. 3, табл. 1, фиг. 1, 2; рис. 1. Юра (дузбайская свита) Тургай, Казахстан.

Ginkgodium Yokoyama, 1889

Ginkgodium nathorstii Yokoyama

1889. Yokoyama, с. 57, табл. 2, фиг. 4,*е*; табл. 3, фиг. 7; табл. 8; табл. 9, фиг. 1–10. Юра. Япония.
1911. Томас, с. 28, табл. 4, фиг. 8–11; табл. 8, фиг. 3. Юра. Каменка, Донбасс.
1934. Криштофович, Принада, с. 72, рис. 36–2. Юра. Каменка, Донбасс.
1957. Станиславский, с. 70, табл. 13, фиг. 3–12; табл. 14, фиг. 1–4; табл. 15, фиг. 1–4. Юра. Донбасс.
1962. Тесленко, с. 134, табл. 20, фиг. 6, 7; рис. 37. Юра. Кузбасс.

Ginkgodium amgaensis Samylina

1963. Самылина, с. 98, табл. 27, фиг. 5, 6. Нижний мел. Р. Амга, бассейн р. Алдана, Восточная Сибирь.

Ginkgodium furcinerve Brick in Vassilevskaja

1963. Василевская в кн.: Основы палеонтологии, т. 15, с. 184, рис. 30. Юра. Фергана.

1970б. Тесленко, с. 157, табл. 37, фиг. 7, 9, 10; табл. 51, фиг. 9. Юра (абашевская и осиновская свиты). Р. Томь, Западная Сибирь.

Ginkgodium ex gr. furcinerve Brick in Vassilevskaja

1966. Генкина, с. 103, табл. 49, фиг. 1–6. Нижняя юра (джильская свита). Иссык-Куль.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 188, табл. 15, фиг. 7. Юра. Шураб, Южная Фергана.

Ginkgoidum glandulosum Samylina

1956б. Самылина, с. 1526, табл. 1, фиг. 8–10. Нижний мел. Р. Алдан, Восточная Сибирь.

1963. Самылина, с. 98, табл. 25, фиг. 7–9; рис. 12. Нижний мел. Р. Алдан, Восточная Сибирь.

Ginkgodium (?) longifolium E. Lebedev

1965. Лебедев Е.Л., с. 116, табл. 25, фиг. 3, рис. 37. Верхняя юра (депская свита). Р. Зея, бассейн р. Амура.

Ginkgodium sibiricum Lebedev

1955а. Лебедев И.В., с. 180, табл. 25, фиг. 1. Юра. Р. Томь, Западная Сибирь.

Ginkgodium zerauschanicum Prynada

1931. Принада, с. 31, табл. 2, фиг. 19; рис. 4, *А–Г*. Юра. Гизен-пайон, бассейн р. Зерав-апа, Средняя Азия.

1934. Криштофович, Принада, с. 72, Юра. Средняя Азия.

Ginkgodium sp.

1963. Василевская, Павлов, табл. 8, фиг. 5. Нижний мел (кюсюрская свита). Низовья р. Лены.

1967а. Самылина, с. 143, табл. 11, фиг. 8, 9. Нижний мел (ожогинская свита). Р. Силяп, бассейн р. Колымы.

Ginkgoites[1] Seward, 1919

Ginkgoites obovatus[1] (Nathorst) Seward

1886. Ginkgo obovata. Nathorst, с. 93, табл. 29, фиг. 5. Триас. Швеция.

1919. Ginkgoites obovatus. Seward, с. 12, фиг. 632. Триас. Швеция.

---

[1] Родовые названия, оканчивающиеся на ites, принято относить к мужскому роду ("Основы палеонтологии", 1963 – Голосеменные и покрытосеменные, с. 18), поэтому в тех случаях, когда вид переводится из рода Ginkgo в род Ginkgoites, мы приводим окончание его видового названия в соответствие с родовым. Например, Ginkgo sibirica – Ginkgoites sibiricus и т.д. При ссылках на работы, содержащие первоописания, мы оставляем без изменения окончания видовых названий в том виде, в котором они были даны авторами.

Ginkgoites concinnus (Heer) Seward

1976b. Ginkgo concinna. Heer, с. 63, табл. 13, фиг. 6–8; табл. 7, фиг. 8. Юра. Иркутский бассейн.

1935. Ginkgoites concinna. Seward in Seward and Conwey, с. 14, рис. 11. Верхний мел. Гренландия.

1954. Голова, с. 54, табл. 1, фиг. 14. Юра. Чулымо-Енисейский бассейн.

1961б. Маркович, табл. 15, фиг. 7; табл. 22, фиг. 4. Юра (катынадырская, орская и романкульская свиты). Южный Урал.

1972. Долуденко, Рассказова, с. 14, табл. 11, фиг. 2; табл. 12, фиг. 1–7. Юра (черемховская свита). Иркутский бассейн.

Ginkgoites digitatus (Brongniart) Seward

1828 (1828–1838). Cyclopteris digitata. Brongniart, с. 219, табл. 61 bis, фиг. 2, 3. Юра. Англия.

1919. Ginkgoites digitata. Seward, с. 14. Там же.

1948. Голова, с. 98, табл. 7, фиг. 51, 52. Юра. Чулымо-Енисейский бассейн.

Ginkgoites dissectus Krassilov

1972. Красилов, с. 30, табл. 2, фиг. 1–10; табл. 3, фиг. 1, 2; рис. 3,*а, 2*; 4,*в, г*. Нижний мел (чемчукинская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Ginkgoites donetzianus Prynada in Vladimirovich

1959. Владимирович, с. 458, табл. 1, фиг. 3, 4. Нижняя юра. Восточный Урал.

Ginkgoites harrisii E. Lebedev

1974. Лебедев Е.Л., с. 68, табл. 17, фиг. 2–5; рис. 30. Нижний мел. Западное Приохотье.

Ginkgoites heeri Doludehko et Rasskazova

1972. Долуденко, Рассказова, с. 16, табл. 18, фиг. 1–5; табл. 19. фиг. 1–4; табл. 20, фиг. 1–4. Юра (присаянская свита). Иркутский бассейн.

Ginkgoites huttonii (Sternberg) Black

1838 (1820–1838). Cyclopteris huttonii. Sternberg, с. 66. Юра. Англия.

1929. Ginkgoites huttonii. Black, с. 431, фиг. 17–19. Юра. Англия.

1931. Турутанова-Кетова, с. 329, табл. 4, фиг. 1. Юра. Иссык-Куль.

1936а. Турутанова-Кетова, с. 99, табл. 1, фиг. 6. Юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1961б. Маркович, табл. 22, фиг. 3. Юра (орская и романкульская свиты). Южный Урал.

Ginkgoites ex gr. huttonii (Sternberg) Black

1961б. Маркович, табл. 12, фиг. 5, 6. Триас (кызылкаинская свита). Южный Урал.

Ginkgoites insperatus E. Lebedev

1974. Лебедев Е.Л., с. 70, табл. 18, фиг. 1–3; рис. 31. Нижний мел. Западное Приохотье.

Ginkgoites jampolensis (E. Lebedev) Krassilov

1965. Ginkgo jampolensis. Лебедев Е.Л., с. 108, табл. 27, фиг. 1–4; табл. 28, фиг. 1; рис. 34,*А, Б, Д*, 35,*А*. Верхняя юра (депская свита). Р. Зея, бассейн р. Амура.

1972. Ginkgoites jampolensis. Красилов, с. 32, табл. 5, фиг. 1—7; рис. 3,*д—р*, 4,*д*. Нижний мел (чемчукинская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Ginkgoites kazachstanicus (Genkina) Krassilov

1963а. Ginkgo kazachtanica. Генкина, с. 76, табл. 40, фиг. 6, 7. Средняя юра. Орский бассейн, Восточный Урал.

1972. Ginkgoites kazachstanicus. Красилов, с. 25.

Ginkgoites cf. kazachstanicus (Genkina) Krassilov

1976. Долуденко, Орловская, с. 69, табл. 25, фиг. 2. Средняя юра. Аяк-Сунга, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Ginkgoites krassilovii E. Lebedev

1974. Лебедев Е.Л., с. 71, табл. 18, фиг. 4, 5; рис. 32. Нижний мел. Западное Приохотье.

Ginkgoites lepidus (Heer) Seward

1876b. Ginkgo lepida. Heer, с. 62, табл. 7, фиг. 7; табл. 12. Юра. Иркутский бассейн.

1919. Ginkgoites lepida. Seward, с. 24.

1931. Турутанова-Кетова, с. 328, табл. 3, фиг. 9. Юра. Иссык-Куль.

1944. Турутанова-Кетова, с. 30, табл. 2, фиг. 1; рис. 5. Юра. Мангышлак.

Ginkgoites longipilosus Krassilov

1972. Красилов, с. 25, табл. 1, фиг. 1—7; табл. 3, фиг. 3—5; рис. 4,*а, б*. Нижний мел (чагдамынская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Ginkgoites muensterianus (Presl) Krassilov et Shorochova

1838 (1820—1838). Sphaerococcites muensterianus. Presl in Sternberg, с. 105, табл. 28, фиг. 3. Триас. ФРГ.

1973. Ginkgoites ex gr. muensterianus. Красилов, Шорохова, с. 23, табл. 11, фиг. 3—5. Нижняя юра. Южное Приморье.

Ginkgoites pusillus (Heer) Turutanova-Ketova

1876b. Ginkgo pusilla. Heer, с. 61, табл. 9, фиг. 5,*c*; табл. 10, фиг. 7,*b, c*; табл. 13, фиг. 5; табл. 7, фиг. 9; с. 116, табл. 22, фиг. 4,*f*. Юра. Иркутский бассейн, р. Бурея, бассейн р. Амура.

1931. Ginkgoites cf. pusillus. Турутанова-Кетова, с. 328. Юра. Иссык-Куль.

Ginkgoites sibiricus (Heer) Seward

1876b. Ginkgo sibirica. Heer, с. 61, табл. 9, фиг. 5,*b*; табл. 11, фиг. 1—8; табл. 12, фиг. 3. Юра. Иркутский бассейн и р. Амур.

1919. Ginkgoites sibirica. Seward, с. 24.

1930. Турутанова-Кетова, с. 154, табл. 2, фиг. 19. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1931. Турутанова-Кетова, с. 326, табл. 5, фиг. 1, 3. Юра. Иссык-Куль.

1936а. Турутанова-Кетова, с. 98, табл. 1, фиг. 8; табл. 2, фиг. 15. Юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1944. Турутанова-Кетова, с. 79, табл. 1, фиг. 4; рис. 4. Юра. Мангышлак.

1948. Голова, с. 97, табл. 6, фиг. 48—50. Юра. Чулымо-Енисейский бассейн.

1954. Голова, с. 53, табл. 1, фиг. 13. Юра. Чулымо-Енисейский бассейн.

1966. Маркович, табл. 22, фиг. 5, 6. Юра (орская и романкульская свиты). Южный Урал.

1972. Долуденко, Рассказова, с. 10, табл. 1, фиг. 1–6; табл. 2, фиг. 1–10; табл. 3, фиг. 1–4; табл. 4, фиг. 1–5; табл. 5, фиг. 1–5; табл. 6, фиг. 1–3; табл. 7, фиг. 1–4; табл. 8, фиг. 1–3; табл. 9, фиг. 1–10; табл. 12, фиг. 1. Юра (черемховская и присаянская свиты). Иркутский бассейн.

Ginkgoites ex gr. sibirica (Heer) Seward

1974. Орловская, с. 97, табл. 1, фиг. 5; рис. 1. Юра. Бассейн р. Или, Восточный Казахстан.

1976. Долуденко, Орловская, с. 68, табл. 25, фиг. 3–5; табл. 26, фиг. 1–3; рис. 35, *а–л*. Нижняя юра. Куркурей, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Ginkgoites sphenophyllus Krassilov

1972. Красилов, с. 31, табл. 4, фиг. 1–5, 9; рис. 3, *с–х*, 4, *е, ж*. Нижний мел (ургальская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Ginkgoites taeniatus (Braun) Harris

1843. Baiera taeniata. Braun in Münster, с. 21. Триас. Западная Европа.

1935. Ginkgoites taeniata. Harris, с. 19, табл. 1, фиг. 1, 2, 9; табл. 2, фиг. 3, 4; рис. 9–11. Юра. Гренландия.

1961б. Маркович, табл. 23, фиг. 1. Юра (орская и романкульская свиты). Южный Урал.

Ginkgoites tapkensis Doludenko et Rasskazova

1972. Долуденко, Рассказова, с. 15, табл. 14, фиг. 1–5; табл. 15, фиг. 1–5; табл. 16, фиг. 1–5; табл. 17, фиг. 1–5. Юра (присаянская свита). Иркутский бассейн.

Ginkgoites tylensis E. Lebedev

1972. Долуденко, Лебедев Е.Л., с. 91, рис. 5. Нижний мел (тыльская свита). Р. Тыль, Западное Приохотье.

1974. Лебедев Е.Л., с. 73, табл. 18, фиг. 6–8; рис. 33. Нижний мел. Западное Приохотье.

Ginkgoites vachrameevii Doludenko et E. Lebedev

1972. Долуденко, Лебедев Е.Л., с. 98. Нижний мел (солонийская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Ginkgophylium Saporta, 1875

Ginkgophyllum grassetii Saporta

1875 (1873–1875). Saporta, с. 1018. Пермь. Франция.

Ginkgophyllum (?) triasicum Sixtel

1962. Сикстель, с. 372, табл. 31, фиг. 4–6, рис. 36. Триас. Мадыген, Южная Фергана.

1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 71, табл. 34, фиг. 4. Триас, Мадыген, Южная Фергана.

Glossophyllum Krausel, 1943

Glossophyllum florinii Krausel

1943. Krausel, с. 61, табл. 2, фиг. 9–11; табл. 3, фиг. 6–10. Триас. Австрия, Западная Европа.

Glossophyllum angustifolium Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 128, табл. 75, фиг. 7, 8,*а*; табл. 76; табл. 77; табл. 78, фиг. 1–8; рис. 54. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка, Донбасс.

Glossophyllum claviforme Mogutcheva

1973. Могучева, с. 95, табл. 42, фиг. 7–11; табл. 1–7; табл. 45, фиг. 1–2. Нижний триас. Тунгусский бассейн.

Glossophyllum (?) oblanceolatum Sixtel

1962. Сикстель, с. 376, табл. 34, фиг. 1; табл. 35, фиг. 1–3. Триас. Мадыген, Южная Фергана.

Glossophyllum? spathulatum Prynada in Schvedov

1958. Шведов, с. 64, табл. 1, фиг. 5, 6; табл. 3, фиг. 1–3. Триас. Таймыр.

Glossophyllum synense Neuburg

1959. Нейбург, с. 681, рис. 1,*б–г*; рис. 2,*д–ж*. Триас. Печорский бассейн.

Glossophyllum sp.

1962. Сикстель, табл. 2, фиг. 5. Триас. Хребет Кугитанг, Средняя Азия.

Karkenia Archangelsky, 1965

Karkenia incurva Archangelsky

1965. Archangelsky, с. 132, табл. 1, фиг. 10; табл. 2, фиг. 11, 14, 16, 18; табл. 5, фиг. 29–32; рис. 13–19. Нижний мел. Провинция Санта Крус, Аргентина.

Karkenia asiatica Krassilov

1972. Красилов, с. 52, табл. 16, фиг. 1–9; табл. 17, фиг. 1–9; табл. 18, фиг. 1–11; рис. 8. Верхняя юра (талынжанская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Pseudotorellia Florin, 1936

Pseudotorellia nordenskioldii (Nathorst) Florin

1897b. Feildenia nordenskioldii. Nathorst, с. 56, табл. 3, фиг. 16–27; табл. 6, фиг. 33, 34. Нижний мел. Шпицберген.

1936. Pseudotorellia nordenskioldii. Florin, с. 142.

1959а. Василевская, с. 66, табл. 3, фиг. 2,*в*; табл. 4, фиг. 1,*б*. Нижний мел (ынгырская свита). Сангарский район, бассейн р. Лены.

1962. Орловская, с. 1438, табл. 1, фиг. 2–4. Юра (полосчатая свита). Алакуль, Казахстан.

1963. Василевская, Павлов, табл. 8, фиг. 7–9. Нижний мел (кюсюрская свита). Низовья р. Лены.

1970. Абрамова. с. 51, табл. 8, фиг. 7–11. Нижний мел (кюсюрская свита). Низовья р. Лены.

1975. Баранова, Киричкова, Зауэр, с. 131, табл. 28, фиг. 4. Средняя юра. Южная Эмба, Западный Казахстан.

Pseudotorellia ex gr. nordenskioldii (Nathorst) Florin

1974. Орловская, с. 100, табл. 1, фиг. 9. Юра. Бассейн р. Или, Восточный Казахстан.

Pseudotorellia angustifolia Doludenko

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 114, табл. 57, фиг. 1–9. Верхняя юра (талынжанская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

1972. Красилов, с. 58, табл. 20, фиг. 1–11; табл. 21, фиг. 1–13; рис. 9, 10,*а–м, с–у*. Верхняя юра (талынжанская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Pseudotarellia costata Kiritchkova

1975. Баранова, Киричкова, Зауер, с. 130, табл. 32, фиг. 1–7. Юра. Эмбинский район, Прикаспийская впадина.

Pseudotorellia ensiformis (Heer) Doludenko

1876b. Podozamites ensiformis Heer, с. 46, табл. 4, фиг. 8–10; с. 111, табл. 20, фиг. 6,*В*; табл. 28, фиг. 5,*а*. Юра. Иркутский бассейн и р. Амур.

1961. Pseudotorellia ensiformis. Вахрамеев, Долуденко, с. 111, табл. 55, фиг. 1–8; табл. 56, фиг. 1–3. Верхняя юра (талынжанская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

1972. Долуденко, Рассказова, с. 20, табл. 27, фиг. 1–10. Юра (черемховская свита). Иркутский бассейн.

Pseudotorellia ephela (Harris) Florin

1935. Torellia ephela. Harris, с. 46, табл. 8, фиг. 7, 8, 12, 13; рис. 21. Юра. Восточная Гренландия.

1936. Pseudotorellia ephela. Florin, с. 142.

1962. Орловская, с. 1440, табл. 1, фиг. 5, 6; табл. 2, фиг. 1–5; табл. 3, фиг. 1–5; табл. 4, фиг. 1–5; рис. 1. Юра. Алакуль, Восточный Казахстан.

1968. Орловская, табл. 8, фиг. 5, 6. Юра. Алакуль, Восточный Казахстан.

1976. Долуденко, Орловская, с. 71, табл. 29, фиг. 2; рис. 38,*а*. Средняя юра. Иссыктас, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pseudotorellia ex gr. ephela (Harris) Florin

1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 96, табл. 60, фиг. 4; табл. 61, фиг. 2–6. Юра. Северная Фергана.

Pseudotorellia longifolia Doludenko

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 115, табл. 58, фиг. 1–8. Нижний мел (ургальская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

1972. Красилов, с. 62. Нижний мел (ургальская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Pseudotorellia magna Prosvirjakova

1966. Просвирякова, с. 103, табл. 21, фиг. 2. Средняя юра (джарсуйская свита). Мангышлак.

Pseudotorellia mamillata Loseva

1972. Василевская, Иминов, Лосева, Могучева, с. 323, табл. 74, фиг. 7–9. Юра. Северная Фергана.

Pseudotorellia paradoxa Doludenko

1972. Долуденко, Рассказова, с. 28, фиг. 1–8; табл. 29, фиг. 1–11. Юра (присаянская и черемховская свиты). Иркутский бассейн.

Pseudotorellia pulchella (Heer) Vassilevskaja

1876a. Podozamites pulchellus. Heer, с. 38, табл. 9, фиг. 10–14. Нижний мел. Шпицберген.

1959а. Pseudotorellia pulchella. Василевская, с. 67, табл. 6, фиг. 2,*а*. Нижний мел (чонгургасская свита). Сангарский район, бассейн р. Лены.

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 113, табл. 56, фиг. 6, 7. Верхняя юра (талынжанская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

1967а. Самылина, с. 146, табл. 1, фиг. 13, 14. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Р. Зырянка, бассейн р. Колымы.

1972. Красилов, с. 62. Верхняя юра (талынжанская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Pseudotorellia aff. pulchella (Heer) Vassilevskaja

1974, Лебедев Е.Л., с. 79, рис. 36. Нижний мел. Западное Приохотье.

Pseudotorellia rarinervis Orlovskaja

1962. Орловская, с. 1, табл. 1, фиг. 1; рис. 2,*а*. Юра (полосчатая свита). Алакуль, Восточный Казахстан.

Pseudotorellia (?) tripicata Stanislawsky

1971. Станиславский, с. 91, рис. 46, 47. Верхний триас. Донбасс.

Pseudotorellia vachrameevii Gomolitzky

1965. Гомолицкий, с. 131, табл. 11, фиг. 4–7. Юра (гурудская свита). Гиссарский хребет, Средняя Азия.

Pseudotorellia sp.

1963а. Генкина, с. 84, табл. 46, фиг. 5. Средняя юра. Орский бассейн.

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 73, табл. 79, фиг. 7. Верхняя юра. Грузия.

1972. Долуденко, Рассказова, с. 23, табл. 27, фиг. 11, 12; табл. 32, фиг. 1–8. Юра (присаянская свита). Иркутский бассейн.

1976. Долуденко, Орловская, с. 72, рис. 38,*б*. Нижняя юра. Акбулак, хребет Каратау, Южный Казахстан.

1976. Долуденко, Орловская, с. 72, табл. 29, фиг. 5. Средняя юра. Аяксунга, хребет Каратау, Южный Казахстан.

1976. Самылина, с. 78, табл. 41, фиг. 9–12; рис. 6. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Sphenobaiera Florin, 1936

Sphenobaiera spectabilis (Nathorst) Florin

1906. Baiera spectabilis. Nathorst, с. 4, табл. 1, фиг. 1–8; табл. 2, фиг. 1; рис. 1–8. Триас. Швеция.

1936. Sphenobaiera spectabilis. Florin, с. 108.

1952. Сикстель, с. 43, табл. 11, фиг. 1, 2. Юра (угленосная свита). Фан-Ягноб, Средняя Азия.

1960. Сикстель, с. 80, табл. 15, фиг. 1. Триас? Р. Ягноб, Средняя Азия.

1966. Генкина, с. 97, табл. 44, фиг. 8–10; табл. 45, фиг. 1–3. Триас и юра (кокуйская и угленосная свиты). Иссык-Куль.

1968. Орловская, табл. 6, фиг. 1–3. Юра. Алакуль, Восточный Казахстан.

1969. Киричкова, с. 303, табл. 11, фиг. 8, 9. Юра (веселовская свита). Восточный Урал.

1970б. Тесленко, с. 160, табл. 40, фиг. 2. Средняя юра (итатская свита). Р. Кан, Чулымо-Енисейский бассейн.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 188, табл. 16, фиг. 1; табл. 21, фиг. 5. Триас и юра. Шураб, Южная Фергана.

1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 75, табл. 37, фиг. 1—4; табл. 38, фиг. 1—3; табл. 39, фиг. 1—3. Триас и юра. Иссык-Куль, р. Ягноб, Шураб, Средняя Азия.

1974. Орловская, с. 98, табл. 1, фиг. 6—8; табл. 2, фиг. 1, 2; рис. 2. Юра. Бассейн р. Или, Казахстан.

1976. Долуденко, Орловская, с. 111, табл. 70, фиг. 7; табл. 71, фиг. 1. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Sphenobaiera angustiloba (Heer) Florin

1878а. Baiera angustiloba. Heer, с. 24, табл. 7, фиг. 2. Нижний мел. Р. Лена.

1936. Sphenobaiera angustiloba, Florin, с. 108.

1956а. Самылина, с. 538. Нижний мел. Р. Алдан.

1958. Вахрамеев, с. 113, табл. 27, фиг. 1—3. Верхняя юра. Бассейн р. Алдан.

1959а. Василевская, с. 62, табл. 3, фиг. 1. Нижний мел (чонгургасская свита). Сангарский район, бассейн р. Лены.

1960. Василевская, с. 166, табл. 5, фиг. 4, 5; табл. 7, фиг. 1. Нижний мел (кюсюрская, булунская и огонер-юряхская свиты). Низовья р. Лены.

1962б. Киричкова, табл. 2, фиг. 1. Юра (карьерная свита). Восточный Урал.

1962. Принада, с. 190, табл. 11, фиг. 2; табл. 12, фиг. 1, 2; рис. 42, *Г*. Юра. Иркутский бассейн.

1962. Тесленко, с. 137, табл. 21, фиг. 3. Юра. Р. Томь, Кузбасс.

1963. Василевская, Павлов, табл. 8, фиг. 6; табл. 13, фиг. 6; табл. 14, фиг. 5; табл. 26, фиг. 4. Нижний мел (кюсюрская, булунская и огонер-юряхская свиты). Низовья р. Лены.

1963а. Генкина, с. 79, табл. 42, фиг. 3—4; табл. 43, фиг. 1. Средняя юра. Орский бассейн.

1963. Самылина, с. 99, табл. 26, фиг. 5, *а*; табл. 29, фиг. 3, 4. Нижний мел. Бассейн р. Алдана.

1965. Лебедев Е.Л., с. 114, рис. 36. Нижний мел (верхнемолчанская свита). Р. Зея, бассейн р. Амура.

1966. Василевская, с. 62, табл. 5, фиг. 5. Нижний мел. Жиганский район, бассейн р. Лены.

1967а. Самылина, с. 143. Нижний мел (ожогинская и силяпская свиты). Р. Силяп, бассейн р. Колымы.

1970б. Тесленко, с. 161, табл. 39, фиг. 3. Юра (абашевская свита). Р. Томь, Западная Сибирь.

1974. Тесленко, с. 140, табл. 12, фиг. 3. Юра — нижний мел (шадоронская серия). Р. Талангуя, Восточное Забайкалье.

Sphenobaiera cf. angustiloba (Heer) Florin

1975. Баранова, Киричкова, Зауер, с. 130, табл. 28, фиг. 3. Средняя юра. Канджага, Южная Эмба, Западный Казахстан.

Sphenobaiera ex gr. angustiloba (Heer) Florin

1974. Орловская, с. 99, табл. 2, фиг. 3–5. Юра. Бассейн р. Или. Казахстан.

Sphenobaiera asiatica Genkina

1966. Генкина, с. 101, табл. 48, фиг. 4, 5. Нижняя юра (угленосная свита). Иссык-Куль.

Sphenobaiera biloba Prynada

1938а. Принада, с. 47, табл. 5, фиг. 1. Нижний мел. Бассейн р. Колымы.

1952. Сикстель, с. 44, табл. 11, фиг. 3; рис. 22. Юра (угленосная свита). Фан-Ягноб, Средняя Азия.

1962. Тесленко, с. 137, табл. 21, фиг. 2. Средняя юра (итатская свита). Р. Кан, Чулымо-Енисейский бассейн.

1966. Василевская, с. 63, табл. 4, фиг. 4. Нижний мел. Жиганский район, бассейн р. Лены.

1966. Киричкова, Сластенов, табл. 3, фиг. 4, 5. Нижний мел. Бассейн р. Лены.

1967а. Самылина, с. 143, табл. 8, фиг. 5, 6, 7,*а*; табл. 9, фиг. 8, 9. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Р. Зырянка, бассейн р. Колымы.

Sphenobaiera colchica (Prynada) Delle

1933б. Baiera colchica. Принада, с. 26, табл. 3, фиг. 5, 6. Юра. Ткварчели, Грузия.

1959а. Sphenobaiera colchica. Делле, с. 89, табл. 2, фиг. 1–9; рис. 3. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

1967. Делле, с. 105, табл. 23, фиг. 1,*б*, 5–7,*а*; табл. 24, фиг. 13–18. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

Sphenobaiera czekanowskiana (Heer) Florin

1876b. Baiera czekanowskiana. Heer, с. 56, табл. 10, фиг. 1–4. Юра. Иркутский бассейн.

1936. Sphenobaiera czekanowskiana. Florin, с. 108.

1955. Аксарин, с. 172, табл. 16, фиг. 1. Юра. Западная Сибирь.

1961. Просвирякова, с. 160, табл. 10, фиг. 3. Юра (гонгринская свита). Южная Якутия.

1962. Принада, с. 187, табл. 11, фиг. 1, 3; табл. 12, фиг. 3, 4, 7; рис. 46,*А, В, Г*; 47,*А–В*, 48. Юра. Иркутский бассейн.

1962. Тесленко, с. 138, табл. 22, фиг. 4; рис. 38. Нижняя юра (макаровская свита). Р. Чулым, Западная Сибирь.

1970б. Тесленко, с. 159, табл. 39, фиг. 1, 4; табл. 40, фиг. 1. Юра (макаровская свита). Р. Чулым, Западная Сибирь.

1972. Долуденко, Рассказова, с. 18, табл. 21, фиг. 1–4; табл. 22, фиг. 1–5; табл. 23, фиг. 1–3; табл. 24, фиг. 1–6; табл. 25, фиг. 1–9; табл. 26, фиг. 1–5. Юра (черемховская свита). Иркутский бассейн.

Sphenobaiera cf. czekanowskiana (Heer) Florin

1961б. Маркович, табл. 23, фиг. 2. Средняя юра (орская и романкульская свиты). Южный Урал.

Sphenobaiera ex gr. czekanowskiana (Heer) Florin

1976. Самылина, с. 57, табл. 30, фиг. 6, 7; рис. 4. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Sphenobaiera dzergalanensis Genkina

1966. Генкина, с. 100, табл. 48, фиг. 1—3. Нижняя юра (угленосная свита). Иссык-Куль.

1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 73, табл. 35, фиг. 3. Нижняя юра. Иссык-Куль.

Sphenobaiera flabellata Vassilevskaja

1963. Василевская, Павлов, табл. 38, фиг. 1,*б*; табл. 39, фиг. 1—3, табл. 40, фиг. 1, 2. Нижний мел (укинская свита). Низовье р. Лены.

1966. Василевская, Абрамова, с. 85, табл. 5, фиг. 1, 2; табл. 6, фиг. 3; табл. 7; табл. 8, фиг. 1. Нижний мел (укинская свита). Оленекский район, бассейн р. Лены.

1967а. Самылина, с. 144, табл. 7, фиг. 1—4. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Р. Зырянка, бассейн р. Колымы.

1976. Самылина, с. 58, табл. 29, фиг. 3; табл. 43, фиг. 15. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Sphenobaiera granulifer Sixtel

1962. Сикстель, с. 370, табл. 30, фиг. 5—8. Триас. Мадыген, Южная Фергана.

1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 73, табл. 36, фиг. 6. Триас. Мадыген, Южная Фергана.

Sphenobaiera huangii (Sze) Krassilov

1949. Baiera huangii. Sze, с. 61, табл. 12, фиг. 1. Мезозой. Китай.

1972. Sphenobaiera huangii. Красилов, с. 42, табл. 10, фиг. 1—7; табл. 11, фиг. 1; рис. 63. Верхняя юра (талынжанская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

1973. Красилов, Шорохова, с. 23, табл. 11, фиг. 1, 2. Нижняя юра. Южное Приморье.

Sphenobaiera ikorfatensis (Seward) Florin

1926. Baiera ikorfatensis. Seward, с. 96, табл. 9, фиг. 81; рис. 11,*С, Д*. Нижний мел. Гренландия.

1936. Sphenobaiera ikorfatensis. Florin, с. 108.

Sphenobaiera ikorfatensis (Seward) Florin f. papillata Samylina

1956а. Самылина, с. 538, рис. 2,*б*; рис. 3—2, 6, 7. Верхняя юра (джаскойская свита). Р. Алдан.

1963. Самылина, с. 100, табл. 27, фиг. 7; табл. 28, фиг. 5—7; рис. 13. Верхняя юра. Р. Алдан.

1972. Красилов, с. 45, табл. 13, фиг. 1—6; рис. 6,*д—ж, м*. Нижний мел (чемчукинская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Sphenobaiera kazachstanica Doludenko

1976. Долуденко, Орловская, с. 110, табл. 69, фиг. 2—8. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Sphenobaiera leptophylla (Harris) Florin

1935. Baiera leptophylla. Harris, с. 30, табл. 5, фиг. 6, 7; рис. 15. Триас. Гренландия.

1936. Sphenobaiera leptophylla. Florin, с. 108.

1960. Сикстель, с. 79, табл. 13, фиг. 3. Триас. Р. Ягноб. Ташкутан, Средняя Азия.

Sphenobaiera lindleyana (Schimper) Markowich

1837 (1831—1837). Solenites? furcata. Lindley, Hutton, табл. 209. Средняя юра. Йоркшир, Англия.

1869 (1869—1874). Jeanpaulia lindleyana. Schimper, с. 683. Юра. Англия.

1961б. Sphenobaiera lindleyana. Маркович, табл. 16, фиг. 5; табл. 23, фиг. 4. Юра (катынадырская, орская и романкульская свиты). Южный Урал.

Sphenobaiera longifolia (Pomel) Florin

1847. Dicropteris longifolia. Pomel, с. 339.

1873—1875. Jeanpaulia longifolia. Saporta, с. 464, табл. 67, фиг. 1. Верхняя юра. Франция.

1936. Sphenobaiera longifolia. Florin, с. 108.

1938а. Принада, с. 48, табл. 4, фиг. 5. Нижний мел. Бассейн р. Колымы.

1955. Аксарин, с. 172, рис. 185. Юра. Западная Сибирь.

1956а. Самылина, с. 538, рис. *2а*; рис. 3—3, 4, 5. Нижний мел. Р. Алдан.

1958. Вахрамеев, с. 114, табл. 27, фиг. 5; табл. 28, фиг. 1. Нижний мел. Эксеня-Хая, р. Лена.

1959а. Василевская, с. 63, табл. 4, фиг. 4. Нижний мел (ынгырская и эксеняхская свиты). Сангарский район, бассейн р. Лены.

1960. Василевская, с. 168, табл. 6, фиг. 1—3. Нижний мел (булунская свита). Низовья р. Лены.

1961. Просвирякова, с. 159, табл. 10, фиг. 1, 4. Юра (гонгринская и дурайская свиты). Южная Якутия.

1962. Тесленко, с. 139, табл. 22, фиг. 3. Юра. Красноярский край и Кузбасс.

1963. Василевская, Павлов, табл. 16, фиг. 1; табл. 27, фиг. 1. Нижний мел (булунская и огонер-юряхская свиты). Низовье р. Лены.

1963. Самылина, с. 101, табл. 27, фиг. 1—3; табл. 28, фиг. 1—4. Нижний мел. Р. Алдан.

1966. Киричкова, Сластенов, табл. 3, фиг. 6. Нижний мел. Бассейн р. Лены.

1967а. Самылина, с. 174, табл. 5, фиг. 8—11. Верхняя юра (низы ожогинской свиты) и нижний мел (верхи ожогинской, силяпская и буор-кемюсская свиты). Бассейн р. Колымы.

1969. Киричкова, с. 301, табл. 11, фиг. 1—3; табл. 17, фиг. 1,*б*. Юра (карьерная свита). Восточный Урал.

1970б. Тесленко, с. 158, табл. 37, фиг. 11, 12; табл. 38, фиг. 1—4. Юра (макаровская, абашевская, осиновская и эрбекская свиты). Чулымо-Енисейский и Кузнецкий бассейны, Тува.

Sphenobaiera cf. longifolia (Pomel) Heer

1955. Ананьев, с. 187, табл. 25, фиг. 2,а. Нижний мел (кийская свита). Р. Кия, Западная Сибирь.

1961б. Маркович, табл. 23, фиг. 3. Средняя юра (орская и романкульская свиты). Южный Урал.

Sphenobaiera ex gr. longifolia (Pomel) Florin

1976. Самылина, с. 58, табл. 28, фиг. 1—5. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Sphenobaiera longifolia (Pomel) Florin f. lata Vachrameev

1958. Вахрамеев, с. 115, табл. 28, фиг. 2–5. Нижний мел. Р. Лена.

1960. Василевская, с. 169, табл. 6, фиг. 4–6. Нижний мел (булунская свита). Низовья р. Лены.

1963. Василевская, Павлов, табл. 14, фиг. 3; табл. 37, фиг. 5. Нижний мел (булунская и укинская свиты). Низовья р. Лены.

1966. Василевская, с. 64, табл. 4, фиг. 3. Нижний мел. Жиганский район, бассейн р. Лены.

1967б. Самылина, с. 145, табл. 6, фиг. 4*а*. Нижний мел (верхи ожогинской свиты). Р. Силяп, бассейн р. Колымы.

Sphenobaiera magnifolia Aksarin

1955. Аксарин, с. 172, табл. 16, фиг. 6; табл. 17, фиг. 1. Юра. Канский бассейн. Южная Сибирь.

Sphenobaiera orientalis Vachrameev et E. Lebedev

1974. Лебедев Е.Л., с. 76, табл. 19, фиг. 1. Нижний мел. Западное Приохотье.

Sphenobaiera paraangustiloba E. Lebedev

1974. Лебедев Е.Л., с. 76, табл. 19, фиг. 2; табл. 20, фиг. 4; рис. 35. Нижний мел. Западное Приохотье.

Sphenobaiera paucipartita (Nathorst) Florin

1886. Baiera paucipartita. Nathorst, с. 95, табл. 20, фиг. 7–13, табл. 21; табл. 22, фиг. 1, 2. Верхний триас, Швеция.

1936. Sphenobaiera paucipartita. Florin, с. 108.

1966. Генкина, с. 98, табл. 46, фиг. 1–7. Верхняя юра (угленосная свита). Иссык-Куль.

Sphenobaiera petchorica Chramova

1977. Храмова, с. 62, табл. 27, фиг. 1–3. Верхний триас (большесынинская свита). Бассейн р. Печоры.

Sphenobaiera porrecta Mogutcheva

1972. Могучева, с. 111, табл. 1, фиг. 1–8. Нижний триас. Тунгусский бассейн.

1975. Шорохова, с. 28, табл. 3, фиг. 2–6. Триас. Южное Приморье.

Sphenobaiera pseudolongifolia Abramova

1970. Абрамова, с. 49, табл. 8, фиг. 1–6. Нижний мел (булунская свита). Жиганский район, бассейн р. Лены.

Sphenobaiera pulchella (Heer) Florin

1876b. Baiera pulchella. Heer, с. 114, табл. 20, фиг. 3,*c*; табл. 22, фиг. 1,*a*; табл. 28, фиг. 3. Юра. Бассейн р. Амура.

1936. Sphenobaiera pulchella. Florin, с. 108.

1958. Вахрамеев, с. 116, табл. 29, фиг. 2, 3. Нижний мел. Бассейн р. Лены.

1959а. Василевская, с. 64, табл. 3, фиг. 2,*а*; табл. 4, фиг. 1,*а*. Нижний мел (ынгырская свита). Жиганский район, бассейн р. Лены.

1960. Василевская, с. 170, табл. 7, фиг. 2–5. Нижний мел (булунская свита). Низовья р. Лены.

1962. Тесленко, с. 140, табл. 21, фиг. 1. Юра (итатская свита). Р. Енисей.

1963. Василевская, Павлов, табл. 14, фиг. 4. Нижний мел (булунская свита) . Низовья р. Лены.
1963а. Генкина, с. 80, табл. 42, фиг. 1. Средняя юра. Орский бассейн.
1963б. Самылина, с. 103, табл. 25, фиг. 10; табл. 26, фиг. 4. Нижний мел. Р. Алдан.
1966. Василевская, с. 65, табл. 5, фиг. 1—4. Нижний мел. Жиганский район, бассейн р. Лены.
1967а. Самылина, с. 145, табл. 7, фиг. 5. Нижний мел (верхи ожогинской свиты) . Р. Силяп, бассейн р. Колымы.
1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 73, табл. 36, фиг. 1—5. Средняя юра. Ташкутан, Гиссарский хребет; Шураб, Южная Фергана.

Sphenobaiera aff. pulchella (Heer) Florin

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 106, табл. 51, фиг. 1—6. Верхняя юра (талынжанская свита) . Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Sphenobaiera cf. pulchella (Heer) Florin

1941. Брик, с. 30, табл. 9, фиг. 5. Триас. Южная Фергана.
1965. Лебедев Е.Л., с. 115, табл. 29, фиг. 5. Нижний мел (верхнемолчанская свита) . Р. Зея, бассейн р. Амура.
1972. Быстрицкая, с. 57, табл. 3, фиг. 1. Юра. Кузбасс.

Sphenobaiera ex gr. pulchella (Heer) Florin

1974. Лебедев Е.Л., с. 78, табл. 19, фиг. 4. Нижний мел. Западное Приохотье.
1976. Самылина, с. 58, табл. 29, фиг. 4, 5. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Sphenobaiera pulchella (Heer) Florin f. lata Genkina

1966. Генкина, с. 98, табл. 47, фиг. 1—4. Нижняя юра. Иссык-Куль.
1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 75, табл. 35, фиг. 1, 2. Триас и нижняя юра. Реки Фан и Ягноб, Средняя Азия.

Sphenobaiera samylinae Doludenko et Svanidze

1969. Долуденко, Сванидзе, с. 72, табл. 81, фиг. 1—5. Верхняя юра. Грузия.

Spenobaiera stenoloba Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 127, табл. 75, фиг. 8,*b*. табл. 78, фиг. 9—15; табл. 80, фиг. 7,*b*; рис. 53,*A—F*. Верхний триас (протопивская свита) . Николаевка, Донбасс.

Sphenobaiera suluktensis Brick ex Sixtel

1960. Сикстель, с. 78, табл. 13, фиг. 1, 2. Триас. Р. Ягноб, Средняя Азия.

Sphenobaiera tajmyrensis Schvedov

1960а. Шведов, с. 62, табл. 3, фиг. 4, 5. Нижний триас (?) . Таймыр.

Sphenobaiera tsagarelii Svanidze

1973б. Сванидзе, с. 401, табл. 1, фиг. 1—4. Средняя юра. Западная Грузия.

Sphenobaiera umaltensis Krassilov

1972. Красилов, с. 46, табл. 12, фиг. 3—8; рис. 6,*б—г, л*. Верхняя юра (талынжанская свита) . Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Sphenobaiera uninervis Samylina

1956г. Самылина, с. 538, рис. 3, 1. Нижний мел. Р. Алдан.

1963. Самылина, с. 102, табл. 29, фиг. 1, 2; табл. 30, фиг. 1—3,а, 4, 5. Верхняя юра и нижний мел. Бассейн р. Алдана.

Sphenobaiera urgalica Krassilov

1972. Красилов, с. 44, табл. 11, фиг. 2—8; рис. 6,*а*, *и—к*. Нижний мел (ургальская свита) . Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Sphenobaiera vittaefolia Mogutcheva

1973. Могучева, с. 93, табл. 42, фиг. 1—6; табл. 43, фиг. 1—6. Нижний триас. Тунгусский бассейн.

Sphenobaiera zalesskyi Kryshtofovich

1949. Криштофович, с. 630, табл. 1, фиг. 4, 5. Пермь. Актюбинская обл.

Sphenobaiera aff. zalesskyi Kryshtofovich

1962. Сикстель, с. 371, табл. 31, фиг. 1, 2. Триас. Мадыген. Южная Фергана.

1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 76, табл. 31, фиг. 1—3. Триас. Мадыген, Южная Фергана.

Sphenobaiera (?) parallelinervis Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 57, табл. 32, рис. 22. Верхний триас (протопивская свита) . Гаражовка, Донбасс.

Toretzia Stanislavsky, 1971

Toretzia angustifolia Stanislavsky

1971. Станиславский, с. 88, табл. 24, табл. 26, фиг. 1; рис. 44, *А*, *Б*. Верхний триас. Донбасс.

1973. Станиславский, с. 94, табл. 12, фиг. 1—3. Верхний триас. Донбасс.

Toretzia longifolia Stanislavsky

1971. Станиславский, с. 89. табл. 25; табл. 31, фиг. 4. Верхний триас. Донбасс.

1973. Станиславский, с. 94, табл. 12, фиг. 4, 5. Верхний триас. Донбасс.

Toretzia sp.

1976. Станиславский, с. 58, табл. 46, фиг. 9, *а*; табл. 48, фиг. 5; рис. 23. Верхний триас (протопивская свита) . Гаражовка, Донбасс.

1976. Станиславский, с. 59, табл. 48, фиг. 3, 4; рис. 24. Верхний триас, протопивская свита) . Гаражовка, Донбасс.

ПОРЯДОК CZEKANOWSKIALES. ЧЕКАНОВСКИЕВЫЕ.

Arctobaiera Florin, 1936

Arctobaiera flettii Florin

1936. Florin, с. 119, табл. 26—31; табл. 32, фиг. 1—6; рис. 10, 11. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

Arctobaiera florinii E. Lebedev

1974. Лебедев Е.Л., с. 80, табл. 20, фиг. 2; табл. 21, фиг. 1—4; табл. 22, фиг. 1; рис. 37. Нижний мел. Западное Приохотье.

Culgoweria Florin, 1936

Culgoweria mirabilis Florin

1936. Florin, с. 133, табл. 33, фиг. 3–12; табл. 34; табл. 35, фиг. 1, 2; рис. 15. Нижний мел. Земля Франца Иосифа.

Czekanowskia Heer, 1876

Czekanowskia setacea Heer

1876b. Heer, с. 68, табл. 5, фиг. 1–7; табл. 6, фиг .1–6; табл. 10. фиг. 11; табл. 12, фиг. 5, *b*; табл. 13, фиг. 10, *c*. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1880. Heer, с. 18, табл. 1, фиг. 11, *b, c*; табл. 5, фиг. 3, *d*; табл. 6, фиг. 13–16. Там же.

1910. Криштофович, с. 14, табл. 3, фиг. 7; рис. 17. Нижний мел. Р. Заломная, Южное Приморье.

1936a. Турутанова-Кетова, с. 102, табл. 2, фиг. 13. Нижняя юра. Чокпак, Южный Казахстан.

1948. Голова, с. 100, табл. 6, фиг. 58. Средняя юра (итатская свита). Чулымо-Енисейский бассейн.

1951. Принада, табл. 13, фиг. 1–4. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1955. Аксарин, с. 174, табл. 19, фиг. 1, 2; рис. 186. Средняя юра (камалинская свита). Канский бассейн. Западная Сибирь.

1959a. Василевская, с. 65, табл. 6, фиг. 1. Верхняя юра (джаскойская свита). Нижний мел (чонгургасская свита). Район Сангар, Приверхоянье.

1959. Владимирович, с. 462, табл. 3, фиг. 1, 2. Верхний триас, нижняя юра. Богословское и Веселовское месторождения, Восточный Урал.

1960. Василевская, с. 172, табл. 9, фиг. 1. Нижний мел (булунская, огонер-юряхская свиты). Низовья р. Лены.

1960. Тесленко, с. 155, табл. 18, фиг. 1. Средняя юра (итатская свита). Окрестности Красноярска, Западная Сибирь.

1962. Принада, с. 205, табл. 13, фиг. 1–4. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1962. Тесленко, с. 141, табл. 22, фиг. 5. Нижняя юра (макаровская свита). Р. Чулым, Западная Сибирь.

1963. Василевская, Павлов, табл. 26, фиг. 7. Нижний мел (огонер-юряхская свита). Лено-Оленекский район.

1963a. Генкина, с. 84, табл. 46, фиг. 1–3. Сердняя юра (верхний малопродуктивный и средний продуктивный горизонты). Орский бассейн, Восточный Урал.

1965. Сванидзе, с. 32, табл. 2, фиг. 1, 3. Нижняя юра. Западная Грузия.

1966. Генкина, с. 10, табл. 49, фиг. 13, 14; табл. 50, фиг. 1–3. Нижняя юра (аксайская, нижняя продуктивная угленосная свиты). Иссык-Куль.

1967a. Самылина, с. 146, табл. 9, фиг. 5–7. Верхняя юра (ожогинская свита). Нижний мел (силяпская свита). Бассейн р. Колымы.

1969. Киричкова, с. 304, табл. 12, фиг. 7. Нижняя юра (карьерная свита). Челябинский бассейн.

1970. Принада, с. 67, табл. 7, фиг. 1. Нижний триас (корвунчанская свита). Бассейн р. Нижней Тунгуски.

1970б. Тесленко, с. 162, табл. 40, фиг. 3, 5; табл. 41, фиг. 3; табл. 42, фиг. 1. Нижняя юра (макаровская свита). Средняя юра (эрбекская свита). Тува, Чулымо-Енисейский бассейн.

1974. Тесленко, с. 140, табл. 12, фиг. 1, 2. Верхняя юра — нижний мел. Восточное Забайкалье.

Czekanowskia aciculata Krassilov

1972. Красилов, с. 72, табл. 24, фиг. 1, 6; табл. 25, фиг. 1, 4—6. Верхняя юра (талынжанская свита). Буреинский бассейн.

Czekanowskia auliensis Doludenko

1976. Долуденко, Орловская, с. 113, табл. 73, фиг. 1—3; табл. 74, фиг. 1—6. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Czekanowskia kazachstanica Kiritchkova

1975. Баранова, Киричкова, Зауер, с. 132, табл. 41, фиг. 1—7. Средняя юра. Сорколь, Северная Эмба, Западный Казахстан.

Czekanowskia ketovae Orlovskaja

1976. Долуденко, Орловская, с. 75, табл. 32, фиг. 5—7; табл. 38 фиг. 1—4; табл. 34, фиг. 1—6; рис. 41, *а—г*. Средняя юра. Боролдай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Czekanowskia latifolia Turutanova-Ketova

1931. Турутанова-Кетова, с. 335, табл. 5, фиг. 6. Нижняя юра. Иссык-Куль.

1936а. Турутанова-Кетова, с. 103, табл. 2, фиг. 12. Нижняя юра. Чокпак, Казахстан.

1954. Голова, с. 55, табл. 1, фиг. 19. Средняя юра. Чулымо-Енисейский бассейн.

1960. Сикстель, с. 80, табл. 13, фиг. 4. Нижняя юра. Р. Ягноб, Средняя Азия.

1963. Гомолицкий, с. 1828, табл. 1, фиг. 1—6. Средняя юра. Ангрен, Средняя Азия.

1966. Генкина, с. 105, табл. 50, фиг. 4—7; табл. 51, фиг. 1. Верхний триас (коктуйская свита), нижняя юра (джильская свита). Иссык-Куль.

1970б. Тесленко, с. 163, табл. 40, фиг. 5. Средняя юра (эрбекская свита). Тува.

1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 93, табл. 68, фиг. 1—4; табл. 69, фиг. 1—4. Нижняя и средняя юра. Средняя Азия.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 189, табл. 17, фиг. 4; табл. 21, фиг. 2, 3. Средняя юра. Шураб, Южная Фергана. Кугитанг, Средняя Азия.

1974. Орловская, с. 100, табл. 2, фиг. 6, 8. Нижняя юра (каирлыганская свита). Бассейн р. Или, Казахстан.

Czekanowskia murrayana (Lindley et Hutton) Seward

1834 (1831—1837). Solenites murrayana. Lindley, Hutton, с. 105, табл. 121. Средняя юра. Англия.

1900. Czekanowskia murrayana. Seward, с. 279, рис. 48—50. Там же.

1905. Krasser, с. 25, табл. 3, фиг. 8. Средняя юра? Забайкалье.

Czekanowskia palmatisecta Heer

1880. Heer, с. 21, табл. 4, фиг. 5, 6. Юра. Иркутский бассейн.

Czekanowskia rigida Heer

1876b. Heer, с. 70, табл. 5, фиг. 8—11; табл. 6, фиг. 7; табл. 10, фиг. 2, *a* ; стр. 116, табл. 20, фиг. 3, *d*; табл. 21, фиг. 6, *e*, 8. Юра. Усть-Балей, верховья р. Амура, Иркутский бассейн.

1879. Schmalhausen, с. 36, 86, табл. 5, фиг. 2, *e*, 6*a* ; табл. 6, фиг. 7; табл. 16, фиг. 16, 17; табл. 15, фиг. 13, *a* . Средняя юра. Бассейн р. Тунгуски, Кузбасс.

1880. Heer, с. 19, табл. 6, фиг. 7—12. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1907. Сьюорд, с. 34, табл. 7, фиг. 62, 63. Средняя юра. Кавказ. Средняя Азия.

1910. Криштофович, с. 14, табл. 3, фиг. 6. Нижний мел (липовецкая свита) . Р. Песчанка, Приморье.

1911. Сьюорд, Томас, с. 9, табл. 2, фиг. 14. Юра. Иркутский бассейн.

1911. Томас, с. 29, табл. 4, фиг. 13. Средняя юра. Донбасс.

1923. Хахлов, с. 11, фиг. 31—42. Юра. Иркутский бассейн.

1931. Принада, с. 34, табл. 2, фиг. 14. Нижняя юра. Бассейн р. Зеравшана, Средняя Азия.

1931. Турутанова-Кетова, с. 333, табл. 2, фиг. 4. Нижняя юра. Киргизия.

1931. Хахлов, с. 8, фиг. 7, 9. Средняя юра. Кузбасс.

1935. Принада, с. 22, рис. 6, а. Нижняя юра. Бассейн р. Нарына, Средняя Азия.

1936. Florin, с. 131, 146, табл. 32, фиг. 10; табл. 33, фиг. 1, 2; табл. 38, фиг. 6—15; табл. 39, фиг. 1—3; рис. 14, *c*. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

1948. Голова, с. 100, табл. 7, фиг. 55—57. Средняя юра (итатская свита) . Чулымо-Енисейский бассейн, Западная Сибирь.

1951. Принада, табл. 11, фиг. 3; табл. 13, фиг. 5; табл. 21, фиг. 1. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1953а. Сикстель, с. 49, табл. 2, фиг. 6. Средняя юра. Ангрен, Средняя Азия.

1953. Сикстель, с. 88. Средняя юра. Кок-Янгак, Средняя Азия.

1954. Голова, с. 55, табл. 1, фиг. 17, 18. Средняя юра. Соболевское месторождение, Западная Сибирь.

1955. Аксарин, с. 174, табл. 17, фиг. 4, 5; рис. 187. Нижняя и средняя юра. Канский бассейн, Западная Сибирь.

1957. Станиславский, с. 72, табл. 11, фиг. 7. Средняя юра. Донбасс.

1958. Вахрамеев, с. 117, табл. 29, фиг. 4; табл. 30, фиг. 2, 3. Верхняя юра, нижний мел. Бассейн р. Вилюя, Приверхоянье.

1959а. Василевская, с. 64, табл. 2, фиг. 7, *б*; табл. 3, фиг. 2, *б*, 3; табл. 4, фиг. 2, 3; табл. 5, фиг. 1; табл. 7, фиг. 1. Верхняя юра (джаскойская свита), нижний мел (батылыхская, эксеняхская свиты). Район Сангар, Приверхоянье.

1959. Владимирович, с. 461, табл. А, фиг. 1—4. Верхний триас, нижняя юра. Богословское и Веселовское месторождение, Восточный Урал.

1959а. Делле, с. 90, табл. 1, фиг. 10, 11; рис. 4, 5. Средняя юра. Ткварчельский бассейн, Грузия.

1960. Василевская, с. 171, табл. 8, фиг. 1—4. Нижний мел (кюсюрская, булунская, огонер-юряхская свиты) . Лено-Оленекский район.

1961. Просвирякова, с. 161, табл. 10, фиг. 7, 8. Средняя, верхняя юра, нижний мел (дурайская, гонгринская, нерюнгриканская, холодниканская свиты). Южная Якутия.

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 108, табл. 59, фиг. 1—5; табл. 60, фиг. 2, 3. Верхняя юра (талынжанская свита). Буреинский бассейн.

1962б. Киричкова, табл. 4, фиг. 1. Нижняя юра (карьерная свита). Челябинский бассейн.

1962. Принада, с. 206, табл. 11, фиг. 3; табл. 13, фиг. 5; табл. 21, фиг. 1. Юра. Иркутский бассейн.

1962. Тесленко, с. 141, табл. 23, фиг. 5, 6. Нижняя юра (макаровская свита) и средняя юра (итатская свита). Окрестности Красноярска, р. Чулым, Западная Сибирь.

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 208, табл. 61, фиг. 1—3. Средняя юра. Туаркыр, Западная Туркмения.

1963. Василевская, Павлов, табл. 15, фиг. 2; табл. 27, фиг. 8. Нижний мел (булунская, укинская свиты). Лено-Оленекский район.

1963а. Генкина, с. 83, табл. 45, фиг. 3, 4. Средняя юра (средний продуктивный и нижний малопродуктивный горизонты). Орский бассейн.

1963. Самылина, с. 103, табл. 22, фиг. 7, 6; табл. 27, фиг. 8; табл. 28, фиг. 8—10. Верхняя юра (джаскойская свита), нижний мел (батылыхская свита). Нижнее течение р. Алдана.

1965. Лебедев Е.Л., с. 120, табл. 30, фиг. 3, 6. Верхняя юра. Р. Зея, бассейн р. Амура.

1965. Сванидзе, с. 31, табл. 1, фиг. 8. Нижняя юра. Западная Грузия.

1966. Генкина, с. 104, табл. 49, фиг. 7—12. Нижняя юра (джильская, аксайская свиты и их аналоги). Иссык-Куль.

1966. Киричкова, табл. 2, фиг. 3. Нижняя юра. Среднее течение р. Вилюя.

1967. Делле, с. 105, табл. 24, фиг. 10—12. Средняя юра. Ткварчельский бассейн, Грузия.

1967а. Самылина, с. 146, табл. 7, фиг. 6. Верхняя юра (ожогинская свита). Реки Силяп, Грозная, бассейн р. Колымы.

1969. Киричкова, с. 303, табл. 12, фиг. 3—6; табл. 16, фиг. 5. Верхний триас (копейская свита), нижняя юра (карьерная свита). Челябинский бассейн.

1970б. Тесленко, с. 162, табл. 39, фиг. 2; табл. 41, фиг. 1, 2, 4 (d); табл. 42, фиг. 2. Нижняя (макаровская свита) и средняя юра (итатская и эрбекская свиты). Западная Сибирь.

1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 92, табл. 65, фиг. 1, 2; табл. 66, фиг. 1, 2; табл. 67, фиг. 2, 3. Верхний триас, нижняя — средняя юра. Средняя Азия.

1972. Долуденко, Рассказова, с. 24, табл. 33—40. Юра (черемховская свита). Иркутский бассейн.

Czekanowskia ex gr. rigida Heer

1976. Самылина, с. 59, табл. 21, фиг. 3, *б*; табл. 30, фиг. 3—5. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

1976. Долуденко, Орловская, с. 76, табл. 32, фиг. 4; рис. 42, *а*, *б*. Средняя юра. Бородлай, Чокпак, Иссыктас, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Czekanowskia turkestanica Prynada

1931. Принада, с. 34, табл. 2, фиг. 16, 20–22. Нижняя юра. Бассейн р. Зеравшана, Средняя Азия.

Hartzia Harris, 1935

Hartzia tenuis (Harris) Harris

1926. Phoenicopsis tenuis. Harris, с. 107, табл. 3, фиг. 6, 7; табл. 4, фиг. 5, 6; табл. 10, фиг. 5; рис. 26. Верхний триас (зона Lepidopteris). Гренладния.

1935. Hartzia tenuis. Harris, с. 42, рис. 20. Там же.

1971. Худайбердыев, Гомолицкий, Лобанова, с. 18, табл. 11, фиг. 4; табл. 12, фиг. 1–4; табл. 13, фиг. 1–4. Нижняя юра. Сулюкта, Средняя Азия.

Hartzia angusta Krassilov

1972. Красилов, с. 75, табл. 24, фиг. 2, 5; рис. 12. Нижний мел (чемчукинская свита). Бассейн р. Буреи.

Ixostrobus Raciborski, 1891

Ixostrobus siemiradzkii Raciborski

1891. Taxites siemiradzkii. Raciborski, с. 315, табл. 5, фиг. 7. Верхний триас. Польша.

1891. Ixostrobus siemiradzkii. Raciborski, с. 378, табл. 2, фиг. 5–8, 20, b. Там же

Ixostrobus grandis Teslenko

1962. Тесленко, с. 158, табл. 24, фиг. 6. Нижняя юра (макаровская свита). Красноярский край.

1970б. Тесленко, с. 183, табл. 49, фиг. 1,2. Нижняя юра (макаровская свита). Чулымо-Енисейский бассейн.

Ixostrobus groenlandicus Harris

1935. Harris, с. 147, табл. 27, фиг. 12, 13; табл. 28, фиг. 1–4, 7, 10, 12; рис. 50. Нижняя юра. Гренландия.

Ixostrobus cf. groenlandicus Harris

1952. Брик, с. 47, табл. 9, фиг. 6,7. Верхний триас (курашасайская свита). Западный Казахстан.

Ixostrobus heeri Prynada

1951. Принада, табл. 16, фиг. 7–13. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1952. Сикстель, с. 52, табл. 10, фиг. 1, *в*. Юра (угленосная толща). Фан-Ягноб, Средняя Азия.

1959а. Василевская, с. 80, табл. 13, фиг. 5–7. Нижний мел (ынгырская, чонгургасская свиты). Ленский бассейн.

1961. Просвирякова, с. 162, табл. 11, фиг. 10; табл. 12, фиг. 4. Юра (дурайская, чульманская, юхтинская свиты). Южная Якутия.

1962. Принада, с. 280, табл. 16, фиг. 7–13; рис. 75. Юра. Иркутский бассейн.

1962. Тесленко, с. 153, табл. 24, фиг. 7. Нижняя — средняя юра (макаровская, итатская свиты). Западная Сибирь.
1963. Василевская, Павлов, табл. 18, фиг. 7. Мел (булунская свита). Ленский бассейн.
1970б. Тесленко, с. 182, табл. 48, фиг. 4—6; табл. 49, фиг. 3—5, 8, 9. Нижняя — средняя юра. Западная, Южная Сибирь, Тува.
1971. Сикстель. Кузичкина и др., с. 97, табл. 70, фиг. 5. Юра. Средняя Азия.
1976. Долуденко, Орловская, с. 77, табл. 32, фиг. 1, 2. Нижняя юра. Куркурей. Средняя юра. Боролдай, Аяк-Сунгинское месторождение, Иссыктас. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Ixostrobus ex gr. heeri Prynada

1963. Василевская, Павлов, табл. 43, фиг. 10. Мел (укинская свита). Ленский бассейн.
1972. Красилов, с. 94, табл. 33, фиг. 4, 6—10. Нижний мел (чемчукинская, тырминская свиты). Буреинский бассейн.

Ixostrobus laxus Vassilevskaja

1963. Василевская, Павлов, табл. 43, фиг. 7, 8. Мел (укинская свита). Ленский бассейн.
1966. Василевская, с. 90, табл. 8, фиг. 6, 7. Нижний мел (укинская свита). Ленский бассейн.

Ixostrobus longus Turutanova-Ketova

1968. Турутанова-Кетова, с. 81, табл. 23, фиг. 7. Нижняя юра. Иссык-Куль.

Ixostrobus punctatus Genkina

1966. Генкина, с. 122, табл. 61, фиг. 8—11. Нижняя юра (джильская и аксайская свиты). Иссык-Куль.

Ixostrobus schmidtianus (Heer) Krassilov

1972. Красилов, с. 93, табл. 28, фиг. 3, 7—9; табл. 34, фиг. 1—18; рис. 13, *а—з, л*. Верхняя юра (талынжанская свита). Буреинский бассейн.

Ixostrobus tunguskanus Prynada

1970. Принада, с. 69, табл. 3, фиг. 8. Нижний триас (корвунчанская свита). Бассейн р. Нижней Тунгуски.

Ixostrobus sp.

1957. Станиславский, с. 84, рис. 37. Средняя юра. Донбасс.

Leptostrobus Heer, 1876

Leptostrobus laxiflora Heer

1876b. Heer, с. 72, табл. 13, фиг. 10—13; табл. 15, фиг. 9, *b*. Юра. Иркутский бассейн.
1880. Heer, с. 23, табл. 7, фиг. 1—5. Там же.
1931. Турутанова-Кетова, с. 347, табл. 4, фиг. 4. Нижняя юра. Иссык-Куль.
1933. Криштофович, с. 134, табл. 16, фиг. 2. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1934. Криштофович, Принада, с. 84, рис. 52 (1). Юра. Иркутский бассейн, Забайкалье, Верхний Амур. Верхний триас. Южно-Уссурийский край, Туркестан.
1951. Принада, табл. 18, фиг. 11, 12; табл. 19, фиг. 3–5. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.
1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 117, табл. 59, фиг. 1–6; табл. 60, фиг. 1, 4, 6. Верхняя юра (талынжанская свита). Буреинский бассейн.
1961. Просвирякова, с. 168, табл. 12, фиг. 1. Средняя — верхняя юра (дурайская, чульманская свиты). Южная Якутия.
1962. Принада, с. 285, табл. 18, фиг. 11, 12; табл. 19, фиг. 3, 4; рис. 76, *а–б*. Юра. Иркутский бассейн.
1962. Тесленко, с. 154, рис. 48. Нижняя юра (макаровская свита). Красноярский край, Западная Сибирь.
1963. Буракова, с. 211, табл. 63, фиг. 1. Средняя юра. Туаркыр.
1965. Лебедев Е.Л., с. 102, табл. 30, фиг. 1, 4. Верхняя юра. Р. Зея бассейн р. Амура.
1968а. Красилов, с. 36, табл. 1, фиг. 1–8; табл. 2, фиг. 1–7; рис. 1, *а–г*. Верхняя юра (талынжанская свита). Буреинский бассейн.
1970б. Тесленко, с. 185, табл. 52, фиг. 2. Нижняя юра (макаровская свита). Чулымо-Енисейский бассейн.
1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 93, табл. 17, фиг. 4–6. Нижняя юра. Фергана.

Leptostrobus angustifolia Heer

1880. Heer, с. 26, табл. 7, фиг. 8–10. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

Leptostrobus crassipes Heer

1876b. Heer, с. 73, табл. 13, фиг. 14. Юра Р. Кая, Иркутский бассейн.
1878а. Heer, с. 81, табл. 13, фиг. 14. Там же.
1880. Heer, с. 24, табл. 7, фиг. 7; табл. 8, фиг. 1–5. Юра. Иркутский бассейн.
1934. Криштофович, Принада, с. 84, рис. 52 (2). Юра. Иркутский бассейн.
1936а. Нейбург, с. 152, табл. 4, фиг. 6, 7. Юра. Тува.
1948. Голова, с. 103, табл. 8, фиг. 65, 66. Средняя юра (итатская свита) Кемчугское месторождение, Западная Сибирь.
1962. Принада, с. 287, табл. 19, фиг. 5. Юра. Иркутский бассейн.
1965. Лебедев Е.Л., с. 121, табл. 30, фиг. 2, 5. Верхняя юра (депская свита). Р. Зея, бассейн р. Амура.

Leptostrobus ex gr. crassipes Heer

1972. Красилов, с. 88, табл. 33, фиг. 1–3, 5. Нижний мел (чемчукинская свита). Буреинский бассейн.

Leptostrobus enissejensis Samylina

1972. Самылина, с. 75, табл. 4, фиг. 6–8. Средняя юра (итатская свита). Окрестности Красноярска, Западная Сибирь.

Leptostrobus limbatus Vassilevskaja

1963. Василевская, Павлов, табл. 9, фиг. 8; табл. 43, фиг. 12. Нижний мел (кюсюрская, укинская свиты). Лено-Оленекский район.

Leptostrobus marginatus Samylina

1967a. Самылина, с. 150, табл. 11, фиг. 4–7. Верхняя юра (ожогинская свита) . Р. Силян, бассейн р. Колымы.

1976. Самылина, с. 60, табл. 30, фиг. 1, 2. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Leptostrobus microlepis Heer

1876b. Heer, с. 74, табл. 13, фиг. 15; табл. 15, фиг. 9, *b*. Юра. Иркутский бассейн.

1880. Heer, с. 25, табл. 7, фиг. 6. Там же.

Leptostrobus mollis Prynada in Krassilov

1972. Красилов, с. 85, табл. 27, фиг. 1, 4–6; табл. 31, фиг. 1–9; рис. 12, *К–М*. Верхняя юра (талынжанская свита) . Буреинский бассейн.

Leptostrobus rigida Heer

1880. Heer, с. 25, табл. 7, фиг. 12; табл. 8, фиг. 1, *b*, 5, *b*. Юра. Иркутский бассейн.

Leptostrobus stigmatoideus Krassilov

1972. Красилов, с. 82, табл. 25, фиг. 6; табл. 29, фиг. 1–9; табл. 30, фиг. 1–5; рис. 11, *а–е*. Верхняя юра (талынжанская свита) . Буреинский бассейн.

Leptostrobus sp.

1938a. Принада, с. 54, рис. 20. Средняя и верхняя юра. Р. Зырянка, бассейн р. Колымы.

1959a. Василевская, с. 79, табл. 13, фиг. 4. Верхняя юра (джаскойская свита) . Ленский бассейн.

Phoenicopsis Heer, 1876

Phoenicopsis angustifolia Heer

1876b. Heer, с. 51, табл. 1, фиг. 1, *d*; табл. 2, фиг. 3, *b*; с. 113, табл. 31, фиг. 7, 8. Юра. Иркутский бассейн, верховья р. Амура.

1879. Schmalhausen, с. 35, табл. 5, фиг. 4, *c*, 5, *d*; с. 87, табл. 16, фиг. 9, 11, 16. Средняя юра. Кузбасс, бассейн р. Тунгуски.

1905. Krasser, с. 22, табл. 3, фиг. 2–4. Средняя юра. Забайкалье.

1907. Сьюорд, с. 34, табл. 8, фиг. 69, 70. Средняя юра. Кызыл-Кия, Туркмения.

1910. Криштофович, с. 15, табл. 3, фиг. 8. Нижний мел (липовецкая свита) . Приморье.

1918. Криштофович, с. 84, табл. 1, фиг. 5. Средняя юра. Забайкалье.

1924. Хахлов, с. 18, рис. 26–32. Юра. Иркутский бассейн.

1926. Криштофович, с. 603, табл. 12, фиг. 4. Нижняя юра. Северный Кавказ.

1927. Криштофович, с. 562, табл. 31, фиг. 6. Средняя юра. Юг Западной Сибири.

1930. Турутанова-Кетова, с. 156, табл. 5, фиг. 36. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1931. Принада, с. 36, табл. 2, фиг. 17. Нижняя юра. Бассейн р. Зеравшана, Средняя Азия.

1931. Турутанова-Кетова, с. 341, табл. 3, фиг. 4; табл. 4, фиг. 6. Нижняя юра. Иссык-Куль.

1931. Хахлов, с. 9, фиг. 7; стр. 30, фиг. 36. Средняя юра. Кузбасс.

1935. Принада, с. 225, табл. 1, фиг. 9. Нижняя юра. Р. Нарын, Средняя Азия.

1936. Florin, с. 136, табл. 35, фиг. 11—13; табл. 36, фиг. 1—6. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

1940. Принада, с. 73, табл. 11, фиг. 11. Верхний триас. Восточный Урал.

1944. Турутанова-Кетова, с. 82, табл. 3, фиг. 7; табл. 4, фиг. 2. Средняя юра. Мангышлак.

1951. Принада, табл. 25, фиг. 3. Юра. Иркутский бассейн.

1953а. Сикстель, с. 50, табл. 2, фиг. 2. Средняя юра (ангренская свита). Ангрен, Средняя Азия.

1954. Голова, с. 57, табл. 2, фиг. 20, 21. Средняя юра. Соболевское месторождение, Западная Сибирь.

1955. Аксарин, с. 173, табл. 16, фиг. 2, 3. Средняя юра (кампалинская, бородинская свиты). Канский бассейн, Западная Сибирь.

1958. Вахрамеев, с. 119, табл. 29, фиг. 1. Верхняя юра, нижний мел. Приверхоянье.

1959а. Василевская, с. 69, табл. 5, фиг. 2, 3; табл. 6, фиг. 3. Нижний мел (чонгургасская свита). Приверхоянье.

1959. Владимирович, с. 459, табл. 1, фиг. 7, 8. Верхний триас (свита С, угленосная свита), нижняя юра (свита А, Б). Богословский и Веселовский бассейны, Восточный Урал.

1960. Василевская, с. 174, табл. 9, фиг. 4, 6. Нижний мел (кюсюрская, булунская, огонер-юряхская свиты). Лено-Оленекский район.

1962. Принада, с. 202, табл. 20, фиг. 2; табл. 25, фиг. 3; рис. 52. Юра. Иркутский бассейн.

1961. Просвирякова, с. 160, табл. 10, фиг. 5, 6. Средняя юра (юхтинская, дурайская свиты), верхняя юра (гонгринская свита). Южная Якутия.

1961. Романова, с. 115, табл. 20, фиг. 4. Нижняя юра. Боролдайское месторождение, Южный Казахстан.

1963. Буракова, с. 209, табл. 52, фиг. 1—3. Средняя юра. Западная Туркмения.

1962. Тесленко, с. 142, табл. 22, фиг. 1. Нижняя юра (макаровская свита), средняя юра (итатская, тюменская свиты). Кузбасс, Чулымо-Енисейский бассейн, Западная Сибирь.

1963. Василевская, Павлов, табл. 26, фиг. 6; табл. 37, фиг 6. Нижний мел (огонер-юряхская, укинская свиты). Лено-Оленекский район.

1963а. Генкина, с. 81, табл. 43, фиг. 2—5; табл. 44, фиг. 1—4; табл. 45, фиг. 1. Средняя юра. Орский бассейн.

1963. Самылина, с. 104, табл. 26, фиг. 5, *б*; табл. 31, фиг. 1—5; табл. 32, фиг. 2. Нижний мел (батылыхская свита). Р. Алдан.

1963. Баранова, Буракова, Бекасова, с. 209, табл. 12, фиг. 1—3. Средняя юра. Туаркыр.

1965. Сванидзе, с. 31, табл. 1, фиг. 4. Нижняя юра. Западная Грузия.

1966. Генкина, с. 106, табл. 51, фиг. 2—6; табл. 52, фиг. 1, 2. Верхний триас (акташская свита), нижняя юра (базальная, угленосная свиты). Иссык-Куль.

1966. Просвирякова, с. 102, табл. 20, фиг. 5, 6. Средняя юра (тонашинская, карадирменская свиты). Мангышлак.

1967а. Самылина, с. 147, табл. 5, фиг. 6, 7. Верхняя юра (ожогинская свита), нижний мел (силяпская свита). Бассейн р. Колымы.

1970б. Тесленко, с. 164, табл. 42, фиг. 3—7; табл. 43, фиг. 1—4; табл. 44, фиг. 1, 2. Нижняя и средняя юра. Западная Сибирь, Тува.

1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 94, табл. 62, фиг. 1, 2. Верхний триас, юра. Средняя Азия.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 189, табл. 17, фиг. 1. Верхний триас — юра. Шураб, Кугитанг, Средняя Азия.

1972. Долуденко, Рассказова, с. 28, табл. 41—46. Средняя юра (присаянская свита). Иркутский бассейн.

1974. Тесленко, с. 141, табл. 13, фиг. 4. Верхняя юра — нижний мел. Восточное Забайкалье.

1975. Филиппова, с. 33, табл. 3, фиг. 3. Нижний мел. Северо-Восток СССР.

Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer

1975. Баранова, Киричкова, Зауер, с. 133, табл. 27, фиг. 15; табл. 28, фиг. 5—7. Средняя юра. Северная Эмба, Южная Эмба, Западный Казахстан.

1976. Долуденко, Орловская, с. 74, табл. 29, фиг. 6; табл. 30, фиг. 4, 5; табл. 31, фиг.1, 2. Нижняя юра. Чокпак, Куркурей, хребет Каратау, Южный Казахстан. Средняя юра. Чокпак, Аяк-Сунгинское месторождение, р. Акбет, Иссыктас, Таскомырсай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

1976. Самылина, с. 59, табл. 23, фиг. 8; табл. 29, фиг. 1, 2; табл. 41, фиг. 13, *б*. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Phoenicopsis angustifolia Heer f. media Krasser

1900. Phoenicopsis media. Krasser, с. 9, 12, табл. 3, фиг. 4, 4. Средняя юра. Южный склон восточного Тянь-Шаня.

1907b. Phoenicopsis angustifolia Heer f. meda. Nathorst, с. 6, табл. 1, фиг. 14—19. Триас (?) — нижняя юра. О-в Котельный.

Phoenicopsis acutifolia Vassilevskaja

1960. Василевская, с. 173, табл. 9, фиг. 2, 3. Нижний мел (булунская, огонер-юряхская свиты). Низовья р. Лены.

1963. Василевская, Павлов, табл. 16, фиг. 2; табл. 26, фиг. 5. Нижний мел (булунская, огонер-юряхская свиты). Лено-Оленекский район.

Phoenicopsis aldanensis Samylina

1972. Самылина, с. 60. Верхняя юра (джаскойская свита). Бассейн р. Алдана (см. Самылина, 1963, с. 104, табл. 32, фиг. 3—8).

Phoenicopsis angustissima Prynada

1951. Принада, табл. 20, фиг. 2. Средняя юра. Восточное Забайкалье,

1963. Василевская, Павлов, табл. 9, фиг. 1. Нижний мел (кюсюрская свита). Лено-Оленекский район.

Phoenicopsis asiatica Samylina

1972. Самылина, с. 61, табл. 1, фиг. 1—4; табл. 2, фиг. 3, 5. Средняя юра Западный Казахстан.

Phoenicopsis densinervis Samylina

1972. Самылина, с. 70, табл. 12, фиг. 4, 5; табл. 13, фиг. 1—4. Нижний мел. Окрестности г. Туринска, Урал.

Phoenicopsis dentata Prynada

1951. Принада, табл. 20. фиг. 1. Юра. Иркутский бассейн.
1962. Принада, с. 199, табл. 20, фиг. 1; рис. 51. Юра. Иркутский бассейн.
1972. Самылина, с. 71, табл. 14, фиг. 1—4. Юра. Иркутский бассейн.

Phoenicopsis doludenkoae Samylina

1972. Самылина, с. 62. Нижний мел (ургальская свита). Бассейн р. Буреи.

Phoenicopsis enissejensis Samylina

1972. Самылина, с. 63, табл. 2, фиг. 1, 2; табл. 3, фиг. 1—4; табл. 4. фиг. 1—5. Средняя юра (итатская свита). Окрестности Красноярска, Западная Сибирь.

Phoenicopsis irkutensis Doludenko et Rasskazova

1972. Долуденко, Рассказова, с. 30, табл. 47, фиг. 1—3; табл. 48, фиг. 1—3; табл. 49, фиг. 1—3. Юра (присаянская свита). Иркутский бассейн.

Phoenicopsis latior Heer

1876b. Heer, с. 113, табл. 21, фиг. 1—6; табл. 29, фиг. 1, *c*. Средняя юра. Верхнее течение р. Амура.

Phoenicopsis leoedevii Samylina

1972. Самылина, с. 66, табл. 8, фиг. 1—4; табл. 9, фиг. 1—4. Верхняя юра (талынжанская свита). Бассейн р. Буреи.

Phoenicopsis magnifolia Prynada

1938a. Принада, с. 49, табл. 6, фиг. 5; рис. 18. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Бассейн р. Колымы.
1965. Лебедев Е.Л., с. 118, табл. 28, фиг. 3; табл. 29, фиг. 2, 3. Верхняя юра. Р. Зея, бассейн р. Амура.

Phoenicopsis (?) magnum Samylina

1967a. Самылина, с. 147, табл. 6, фиг. 7, *в*; табл. 10, фиг. 1—3. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Бассейн р. Колымы.

Phoenicopsis media Krasser

1900. Krasser, с. 9, табл. 3, фиг. 4,4, m; с. 12. Средняя юра. Южный склон восточного Тянь-Шаня.
1927. Криштофович, с. 562, табл. 31, фиг. 7. Средняя юра. Западная Сибирь.

Phoenicopsis mirabilis (Florin) Samylina

1936. Gulgoweria mirabilis. Florin, с. 133, табл. 33, фиг. 1—12. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.
1972. Phoenicopsis mirabilis. Самылина, с. 67. Нижний мел (батылыхская свита). Бассейн р. Алдана.

Phoenicopsis cf. mirabilis (Florin) Samylina

1970. Абрамова, с. 52, табл. 10, фиг. 1–5. Нижний мел (булунская свита). Сангарский район, Приверхоянье.

Phoenicopsis orlovskajae Samylina

1972. Самылина, с. 72, табл. 15, фиг. 1, 5. Средняя юра (шолтыкульская свита). Майкюбень, Казахстан.

Phoenicopsis rarinervis Kryshtofovich et Prynada

1933б. Криштофович, Принада, с. 21, табл. 4, фиг. 6, 9. Верхний триас. Челябинский бассейн.

1959. Владимирович, с. 460, табл. 1, фиг. 5, 6; рис. 2. Верхний триас (свита С, угленосная свита). Богословский, Веселовский бассейны, Восточный Урал.

1966. Генкина, с. 107, табл. 52, фиг. 3–6. Верхний триас (акташская свита). Иссык-Куль.

1969. Киричкова, с. 305, табл. 1, фиг. 9, *б*; табл. 12, фиг. 1, 2. Верхний триас (глубоковская свита), нижняя юра (карьерная свита). Челябинский бассейн, Восточный Урал.

Phoenicopsis cf. rarinervis Kryshtofovich et Prynada

1976. Долуденко, Орловская, с. 75, табл. 31, фиг. 4, 5. Средняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Phoenicopsis rudinervis Vladimirovich

1968. Владимирович в кн.: Новые виды..., с. 80, табл. 23, фиг. 1–3. Нижняя юра. Казахстан.

Phoenicopsis simus Aksarin

1955. Аксарин, с. 173, табл. 15, фиг. 6. Юра. Канский бассейн. Западная Сибирь.

Phoenicopsis speciosa Heer

1876b. Heer, с. 112, табл. 29, фиг. 1, 2; табл. 30. Средняя юра. Верхнее течение р. Амура.

1905. Krasser, с. 21, табл. 3, фиг. 5. Средняя юра. Забайкалье.

1910. Криштофович, с. 15, табл. 2, фиг. 3; рис. 9. Нижний мел (липовецкая свита). Приморье.

1911. Сьюорд, Томас, с. 9, табл. 2, фиг. 15, 16, 16*А*. Юра. Иркутский бассейн.

1928б. Принада, с. 516, табл. 29, фиг. 10; табл. 30, фиг. 8, 9, 11. Средняя юра. Средняя Азия.

1938б. Принада, с. 391, рис. 11, 12. Средняя юра. Эмбинский бассейн, Западный Казахстан.

1952. Брик, с. 63, табл. 22, фиг. 1. Средняя юра (свита Дженишке). Бассейн р. Илека, Западный Казахстан.

1955. Аксарин, с. 173, табл. 16, фиг. 3, 4. Нижняя, средняя юра. Канский бассейн, Западная Сибирь.

1960. Василевская, с. 176, табл. 7, фиг. 6, 7. Нижний мел (огонер-юряхская свита). Булунский район, нижнее течение р. Лены.

1961. Вахрамеев, Долуденко, с. 107, табл. 52, фиг. 1–4; табл. 53, фиг. 1–4. Верхняя юра (талынжанская свита), нижний мел (ургальская свита). Бассейн р. Буреи.

1961. Просвирякова, с. 161, табл. 10, фиг. 2. Средняя юра (дурайская свита). Южная Якутия.
1962. Тесленко, с. 143, табл. 22, фиг. 6. Средняя юра. Кузбасс.
1963. Василевская, Павлов, табл. 27, фиг. 2; табл. 37, фиг. 7. Нижний мел (огонер-юряхская, укинская свиты). Лено-Оленекский район.
1963а. Генкина, с. 82, табл. 42, фиг. 2; табл. 44, фиг. 5, 6; табл. 45, фиг. 2. Средняя юра. Орский бассейн, Восточный Урал.
1965. Лебедев Е.Л., с. 118, табл. 28, фиг. 2; табл. 29, фиг. 1. Верхняя юра. Р. Зея, бассейн р. Амура.
1967а. Самылина, с. 148, табл. 11, фиг. 1–3. Нижний мел (силяпская свита). Бассейн р. Колымы.
1970б. Тесленко, с. 165, табл. 44, фиг. 3. Средняя юра (осиновская свита). Кузбасс.
1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 95, табл. 62, фиг. 3, 4; табл. 63, фиг. 1–5. Средняя юра. Средняя Азия.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 190, табл. 17, фиг. 2; табл. 21, фиг. 4. Средняя юра. Шураб, Южная Фергана.
1974. Лебедев Е.Л., с. 82, табл. 19, фиг. 3,; табл. 20, фиг. 1, 3. Нижний мел. Западное Приохотье.

Phoenicopsis ex gr. speciosa Heer

1976. Самылина, с. 59, табл. 31, фиг. 3, 4. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.
1976. Долуденко, Орловская, с. 74, табл. 30, фиг. 1–3; табл. 31, фиг. 3. Нижняя юра. Р. Батпаксу. Средняя юра.. Р. Акбет, Таскомырсай, Чокпак, Аяк-Сунгинское месторождение, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Phoenicopsis stobieckii (Raciborsky) Prynada

1891. Podozamites stobieckii. Raciborsky, с. 20, табл. 5, фиг. 4, 5. Средняя юра. Польша.
1951. Phoenicopsis stobieckii. Принада, табл. 20, фиг. 4; табл. 25, фиг. 4, 5. Юра. Иркутский бассейн.
1962. Принада, с. 201, табл. 20, фиг. 4; табл. 25, фиг. 4, 5. Юра. Иркутский бассейн.

Phoenicopsis taschkessiensis Krasser

1900. Krasser, с. 12, табл. 4, фиг. 2. Средняя юра. Южный склон Тянь-Шаня.
1928б. Принада, с. 415, табл. 29, фиг. 4, 5, 7; табл. 30, фиг. 6. Средняя юра. Южный склон восточного Тянь-Шаня.
1963. Самылина, с. 104, табл. 32, фиг. 3–8. Верхняя юра (джаскойская свита). Бассейн р. Алдана.
1972. Самылина, с. 64, табл. 5, фиг. 1–4; табл. 6, фиг. 1–4. Нижняя — средняя юра. Западная Сибирь. Средняя юра (шоптыкульская, дузбайская свиты). Казахстан, Средняя Азия.

Phoenicopsis taschkessiensis Krasser f. papillata Prynada

1928б. Принада, с. 414, табл. 29, фиг. 1, 2; табл. 30, фиг. 3. Средняя юра. Южный склон восточного Тянь-Шаня.

Phoenicopsis vassilevskiana Samylina

1972. Самылина, с. 69, табл. 4, фиг. 9–11; табл. 10, фиг. 1–6. Нижний мел (батылыхская свита). Бассейн р. Алдана.

Staphidiophora Harris, 1935

Staphidiophora secunda Harris

1935. Harris, c. 114, табл. 8, фиг. 3, 4, 9–11; рис. 45. Верхний триас (зона Lepidopteris). Восточная Гренландия.

Staphidiophora aff. secunda Harris

1971. Худайбердыев, Гомолицкий, Лобанова, с. 23, табл. 16, фиг. 4; табл. 17, фиг. 6; табл. 18, фиг. 1–4. Нижняя юра. Южная Фергана.

Staphidiophora harrisii Krassilov

1972. Красилов, с. 89, табл. 32, фиг. 1–9; рис. 12, *а–з*. Нижний мел (чемчукинская свита). Буреинский бассейн.

Stephenophyllum Florin, 1936

Stephenophyllum solmsi (Seward) Florin

1919. Desmiophyllum solmsi. Seward, c. 71, фиг. 662. Средняя юра. Англия.

1936. Stephenophyllum solmsi. Florin, c. 82, табл. 11, фиг. 7–10; табл. 12–16; рис. 3, 4. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

Stephenophyllum burejense Krassilov

1972. Красилов, с. 78, табл. 26, фиг. 1–5; табл. 27, фиг. 2, 3; табл. 28, фиг. 1, 2, 4–6; рис. 12, *Н–О*, 13, *М–О*. Верхняя юра (талынжанская свита). Бассейн р. Буреи.

Windwardia Florin, 1936

Windwardia crookalini Florin

1936. Florin, c. 91, табл. 17–20, 21, фиг. 1–10; рис. 5–7. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

ПОРЯДОК CONIFERALES. ХВОЙНЫЕ

Abietites Hisinger, 1837

Abietites sternbergii (Nilsson) Hisinger

1832. Nilsson, c. 350, табл. 3, фиг. 1–2. Нижняя юра. Швеция.

1837. Abietites sternbergii. Hisinger, c. 110, табл. 34, фиг. 3. Нижняя юра. Швеция.

Abietites densifolia Thomas

1911. Томас, с. 32, табл. 4, фиг. 16; табл. 5, фиг. 1–2. Средняя юра. Каменка, Донбасс.

1957. Станиславский, с. 78, рис. 31. Средняя юра. Каменка, Донбасс.

Agathopsis Prynada, 1963

Agathopsis ovalis Prynada ex Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова в кн.: Основы палеонтологии, с. 245, табл. 10, фиг. 9; рис. 95. Нижний мел. Приморье.

Albertia Schimper, 1837

Albertia latifolia Schimper

1837. Schimper, с. 13. Триас. Западная Европа.

Albertia (?) longifolia Sixtel

1962. Сикстель, стр. 381, табл. 38, фиг. 3–4; рис. в тексте 38. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Albertia turkestanica Sixtel

1962. Сикстель, с. 381, табл. 37, фиг. 1–2. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Araucariodendron Krassilov

Araucariodendron heterophyllum Krassilov

1965а. Красилов, стр. 111, табл. 9, фиг. 1–4; табл. 10, фиг. 1–10. Нижний мел. Приморье.

1967. Красилов, с. 178, табл. 60, фиг. 1–7; табл. 41, фиг. 1–6, рис. 23, *а–ж* в тексте. Нижний мел. Приморье.

Araucariodendron angustifolium Krassilov

1965а. Красилов, с. 114, табл. 9, фиг. 5–9. Нижний мел. Приморье.

1967. Красилов, с. 181, табл. 62, фиг. 1–6, рис. 22, *а–б* в тексте. Нижний мел. Приморье.

Araucariodendron oblongifolium Krassilov

1965а. Красилов, с. 116, табл. 9, фиг. 10; табл. 10, фиг. 11. Нижний мел. Приморье.

1967. Красилов с. 182, табл. 63, фиг. 5–6. Нижний мел. Приморье.

Araucariopitys Jeffrey, 1907

Araucariopitys americana Jeffrey

1907. Jeffrey, с. 435, табл. 28 -30. Мел. США.

Приведенные ниже виды сейчас относят к роду Protocedroxylon.

Araucariopitys dibneri Shilkina

1967. Шилкина, с. 36, табл. 1, фиг. 1–3. Верхний триас. Земля Франца-Иосифа.

Araucariopitys gregussii Shilkina

1967. Шилкина, с. 37, табл. 1, фиг. 4, 5; табл. 2; табл. 4, фиг. 4–7; табл. 5, фиг. 4–7. Верхний триас, нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 197, табл. 22, фиг. 1–2. Средняя – верхняя юра. Шураб. Южная Фергана.

Araucariopitys haraulachica Shilkina

1958. Шилкина, с. 1319, табл. 1, фиг. 1–6. Нижняя юра. Верхоянский хребет.

Araucariopitys polyporosum Shilkina

1967. Шилкина, с. 38, табл. 7, фиг. 5, 6; табл. 8, фиг. 2, 3. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

Araucariopitys scotica (Holden) Krausel

1915. Metacedroxylon scoticum. Holden, с. 206, табл. 3, фиг. 1–4. Юра. Шотландия.

1949. Araucariopitys scotica. Krausel, с. 112. Там же.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 196, табл. 22, фиг. 3. Верхняя юра. Шураб, Южная Фергана.

Araucariopitys transiens (Gothan) Krausel

1907. Cedroxylon transiens. Gothan, с. 26, табл. 1, фиг. в тексте 14–15. Нижний мел. Шпицберген.

1949. Araucariopitys transiens. Krausel, с. 112. Там же.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 198, табл. 23, фиг. 1. Верхняя юра. Шураб, Южная Фергана.

Araucariostrobus Krasser, 1921

Araucariostrobus mandlii Krasser

1921. Krasser, с. 21. Нижний мел. Приморье.

Araucarites Presl, 1838

Araucarites goeppertii Presl in Sternberg

1838 (1820–1838). Presl in Sternberg, с. 204, табл. 39, фиг. 4. Палеоген. Австрия.

Araucarites argillicola (Eichwald) Eichwald

1846. Araucaria argillicola. Эйхвальд, с. 477. Верхняя юра. Московская обл.

1865 (1860–1868). Araucarites argillicola. Eichwald, с. 51, табл. 5, фиг. 12, *a–c*. Верхняя юра. Московская обл., Крым, р. Печора, Оренбургское Приуралье.

Araucarites convexus Brick

1952. Брик, с. 44, табл. 9, фиг. 9. Верхний триас (курашасайская свита). Р. Илек, Западный Казахстан.

Araucarites crassifolius Corda

1845–1846. Corda in Reuss, с. 94, табл. 48, фиг. 12. Верхний мел. Чехословакия.

1865 (1860–1868). Eichwald, с. 50, табл. 4, фиг. 10, *a, b, c*. Нижний мел. Клин, Московская обл.

Araucarites hamatus Trautschold

1871. Trautschold, с. 37, табл. 21, фиг. 3, *a, b, c*. Нижний мел. Клин, Московская обл.

Araucarites migaji Schvedov

1958. Шведов, с. 70, табл. 4, фиг. 2–4. Нижний триас (эффузивно-туффитовая свита). Восточный Таймыр.

Araucarites reichenbachii Geinitz

Чаще цитируется как Sequoia reichenbachii (Geinitz) Heer

1839–1842. Geinitz, с. 98, табл. 24, фиг. 4. Мел. Центральная Европа.

1962. Киричкова, Тесленко, с. 225, рис. 54. Нижний мел (покурская свита). Омская обл., Западная Сибирь.

Araucarites subacutensis Philippova

1972а. Филиппова, с. 45, табл. 2, фиг. 1—3. Сердняя часть мела (вороньинская свита). Р. Паляваам, Северо-Восток СССР.

Araucarites toniensis Neuburg

1936б. Нейбург, с. 491, табл. 5, фиг. 1, *а—е*. Нижний триас. Кузбасс.

Araucarites vassilevskiae Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова в кн.: Основы палеонтологии, с. 244, рис. 94. Нижняя юра. Фергана.

1966. Генкина, с. 119, табл. 59, фиг. 15. Нижняя юра. Иссык-Куль.

1976. Долуденко, Орловская, с. 119, табл. 86, фиг. 8, 9. Верхняя юра (карабастауская свита). Чугурчак, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Araucarites sp.

1947. Пересветов, с. 202, рис. 11. Нижний мел. С. Карево, Московская обл.

1967. Красилов, с. 183, табл. 63, фиг. 7, 8. Нижний мел. Приморье.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 193, табл. 20, фиг. 9—10. Средняя юра. Кугитанг и Шураб. Средняя Азия.

Archaeolarix Teslenko, 1970

Archaeolarix argunensis Teslenko

1970а. Тесленко, с. 103, табл. 13, фиг. 1—6. Нижний мел. Р. Аргунь, Восточное Забайкалье.

Athrotaxites Unger, 1849

Athrotaxites lycopodioides Unger

1849. Unger, с. 346, табл. 5; фиг. 13—16. Юра. Зольнгофен, ФРГ.

Athrotaxites berryi Bell

1956. Bell, с. 115, табл. 63, фиг. 5; табл. 60, фиг. 5; табл. 61, фиг. 5; табл. 62, фиг. 2, 3; табл. 63, фиг. 1; табл. 64, фиг. 1—5; табл. 65, фиг. 1. Нижний мел. Канада.

1967. Красилов, с. 205, табл. 80, фиг. 1—6; табл. 81, фиг. 1—4; рис. 29, *а—д* в тексте. Нижний мел. Приморье.

1976. Самылина, с. 75, табл. 38, фиг. 1—2. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Athrotaxites grandis Fontaine

1976. Самылина, с. 75, табл. 38, фиг. 3—8. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Athrotaxites sutschanicus Krassilov

1967. Красилов, с. 208, табл. 82, фиг. 1—4. Нижний мел. Приморье.

Athrotaxopsis Fontaine, 1899

Athrotaxopsis grandis Fontaine

1889. Fontaine, с. 240, табл. 114, фиг. 1—3; табл. 116; табл. 135. Нижний мел. США.

1932. Криштофович, Принада, с. 372. Нижний мел. Приморье.

Araucarites subacutensis Philippova

1972а. Филиппова, с. 45, табл. 2, фиг. 1—3. Сердняя часть мела (вороньинская свита) . Р. Палявваам, Северо-Восток СССР.

Araucarites toniensis Neuburg

1936б. Нейбург, с. 491, табл. 5, фиг. 1, *а—е*. Нижний триас. Кузбасс.

Araucarites vassilevskiae Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова в кн.: Основы палеонтологии, с. 244, рис. 94. Нижняя юра. Фергана.

1966. Генкина, с. 119, табл. 59, фиг. 15. Нижняя юра. Иссык-Куль.

1976. Долуденко, Орловская, с. 119, табл. 86, фиг. 8, 9. Верхняя юра (карабастауская свита). Чугурчак, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Araucarites sp.

1947. Пересветов, с. 202, рис. 11. Нижний мел. С. Карево, Московская обл.

1967. Красилов, с. 183, табл. 63, фиг. 7, 8. Нижний мел. Приморье.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 193, табл. 20, фиг. 9—10. Средняя юра. Кугитанг и Шураб. Средняя Азия.

Archaeolarix Teslenko, 1970

Archaeolarix argunensis Teslenko

1970а. Тесленко, с. 103, табл. 13, фиг. 1—6. Нижний мел. Р. Аргунь, Восточное Забайкалье.

Athrotaxites Unger, 1849

Athrotaxites lycopodioides Unger

1849. Unger, с. 346, табл. 5; фиг. 13—16. Юра. Зольнгофен, ФРГ.

Athrotaxites berryi Bell

1956. Bell, с. 115, табл. 63, фиг. 5; табл. 60, фиг. 5; табл. 61, фиг. 5; табл. 62, фиг. 2, 3; табл. 63, фиг. 1; табл. 64, фиг. 1—5; табл. 65, фиг. 1. Нижний мел. Канада.

1967. Красилов, с. 205, табл. 80, фиг. 1—6; табл. 81, фиг. 1—4; рис. 29, *а—д* в тексте. Нижний мел. Приморье.

1976. Самылина, с. 75, табл. 38, фиг. 1—2. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Athrotaxites grandis Fontaine

1976. Самылина, с. 75, табл. 38, фиг. 3—8. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Athrotaxites sutschanicus Krassilov

1967. Красилов, с. 208, табл. 82, фиг. 1—4. Нижний мел. Приморье.

Athrotaxopsis Fontaine, 1899

Athrotaxopsis grandis Fontaine

1889. Fontaine, с. 240, табл. 114, фиг. 1—3; табл. 116; табл. 135. Нижний мел. США.

1932. Криштофович, Принада, с. 372. Нижний мел. Приморье.

1934. Криштофович, Принада, с. 80, рис. 43—4. Там же.

Athrotaxopsis expansa Fontaine emend. Berry

1889. Fontaine, с. 241, табл. 113, фиг. 5, 6; табл. 115, фиг. 2; табл. 116, фиг. 5; табл. 117, фиг. 6. Нижний мел. США.
1911. Berry, с. 439, табл. 74, фиг. 1. Нижний мел. США.
1967. Красилов, с. 209, табл. 78, фиг. 1—7; табл. 79, фиг. 1—6, рис. 30, *г—е* в тексте. Нижний мел. Приморье.

Borysthenia Stanislavsky, 1976

Borysthenia fasciculata Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 77, табл. 36, фиг. 5,b—7; табл. 43, фиг. 1—4; табл. 44; табл. 45; табл. 46, фиг. 1—8; табл. 47, фиг. 1—3; рис. 33, 34, 35, 36. Верхний триас (протопивская свита). Гаражовка, Донбасс.

Brachyphyllum Brongniart, 1828

Brachyphyllum mamillare Brongniart

1828. Brongniart, с. 109. Юра. Англия.
1925. Брик, с. 198, табл. 1, фиг. 1. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1926. Моисеев, с. 587. Средняя юра. Крым.
1934. Криштофович, Принада, с. 80, рис. 46. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1963. Буракова, с. 216, табл. 68, фиг. 1—5. Средняя юра. Туаркыр.
1963. Турутанова-Кетова в кн.: Основы палеонтологии, с. 246, табл. 11, фиг. 4; рис. 98. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с 194, табл. 19, фиг. 5. Средняя и верхняя юра. Шураб, Южная Фергана. Нижняя юра. Кугитанг, Гиссарский хребет.

Brachyphyllum cf. mamillare Brongniart

1907. Сьюорд, с. 38, табл. 8, фиг. 71. Юра. Средняя Азия.
1944. Турутанова-Кетова, с. 83, табл. 3, фиг. 2. Нижняя — средняя юра. Мангышлак.

Brachyphyllum boreale Heer

1877. Heer, с. 15, табл. 2, фиг. 1—9. Верхний триас — нижняя юра. Швеция.
1905. Krasser, с. 39, табл. 4, фиг. 7. Верхняя юра — нижний мел. Восточное Забайкалье.

Brachyphyllum brickae Doludenko

1976. Долуденко, Орловская, с. 115, табл. 76, фиг. 1—5; табл. 77, фиг. 1—6; табл. 78, фиг. 1, 2. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Brachyphyllum expansum (Sternberg) Seward

1823 (1820—1838). Thuites expansus. Stenberg, с. 38, табл. 38, фиг. 1—2. Средняя юра. Англия.
1919. Brachyphyllum expansum. Seward, с. 317, фиг. в тексте 754, 755. Средняя юра. Англия.

1925. Брик, с. 198, табл. 1, фиг. 2—5; табл. 2, фиг. 12—14. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1933. Криштофович, табл. 11, фиг. 4. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1963. Турутанова-Кетова, в кн.: Основы палеонтологии, с. 246, табл. 11, фиг. 5—6. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1971. Орловская, с. 69, табл. 1, фиг. 1, 3; табл. 2, фиг. 1, 4; табл. 3, фиг. 3—8. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Brachyphllum aff. expansum (Sternberg) Seward

1976. Долуденко, Орловская, с. 116, табл. 78, фиг. 1—2. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Brachyphyllum expansum (Sternb.) Sew. f. falcatum Brick

1925. Брик, с. 199, табл. 1, фиг. 4. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Brachyphyllum expansum (Sternb.) Sew. f. gracile Brick

1925. Брик, с. 199, табл. 1, фиг. 2. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Brachyphyllum expansum (Sternb.) Sew. f. typicum Brick

1925. Брик, с. 199, табл. 1, фиг. 3. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Brachyphyllum gracile Brongniart

1849. Brongniart, с. 106. Верхняя юра. Франция.
1884. Saporta, с. 365, табл. 40, фиг. 2; табл. 42, фиг. 4, 5; табл. 43, фиг. 1—4. Там же.
1976. Долуденко, Орловская, с. 114, табл. 75, фиг. 1—8. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Brachyphyllum insigne Heer

1876b. Heer, с. 75, табл. 13, фиг. 9. Юра. Иркутский бассейн.

Brachyphyllum japonicum (Yokoyama) Oishi

1894. Cyparissidium? japonicum. Yokoyama, с. 229, табл. 20, фиг. 3, a, 6, 6, a, 13; табл. 24, фиг. 4. Нижний мел. Япония.
1940. Brachyphyllum japonicum. Oishi, с. 391, табл. 42, фиг. 2, 3, 3a. Там же.
1967. Красилов, с. 216, табл. 68, фиг. 8, 9. Нижний мел. Приморье.

Brachyphyllum mamillareforme Orlovskaja

1971. Орловская, с. 71, табл. 3, фиг. 1, 2; табл. 4, фиг. 1—7. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Brachyphyllum obesum Heer

1881a. Heer, с. 20, табл. 17, фиг. 1—4. Нижний мел. Португалия.

Brachyphyllum ex gr. obesum Heer

1967. Красилов, с. 217, табл. 63, фиг. 9, 10. Нижний мел. Приморье.

Brachyphyllum romanovskyi Brick

1925. Брик, с. 200, табл. 1, фиг. 6, 7. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Brachyphyllum sp.

1934. Принада, с. 72, табл. 4, фиг. 7. Верхний триас. Памир.

Caveophyllum Migatcheva, 1968

Caveophyllum guttaeforme Migatcheva

1968. Мигачева в кн.: Новые виды, с. 83, табл. 23, фиг. 7. Верхний триас (протопивская свита) . Гаражовка, Донбасс.

Cedroxylon Kraus, 1870

Cedroxylon withami Kraus in Schimper

1870 (1864—1874) . Schimper, с. 370. Карбон. Англия.

Cedroxylon arcticum Shilkina

1967. Шилкина, с. 40, табл. 3, фиг. 5—10. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

Cephalotaxopsis Fontaine, 1899

Cephalotaxopsis magnifolia Fontaine

1889. Fontaine, с. 236, табл. 104—108. Нижний мел. США.

Cephalotaxopsis acuminata Kryshtofovich et Prynada

1934. Криштофович, Принада, с. 78, рис. 43—2. Нижний мел. Приморье.
1959а. Василевская, с. 72, табл. 9, фиг. 6. Нижний мел. Ленский бассейн.
1963. Василевская, Павлов, табл. 42, фиг. 3. Нижний мел (укинская свита) . Ленский бассейн.

Cephalotaxopsis acuminata Kryshtofovich et Prynada var. brachyphyla Kryshtofovich et Prynada

1932. Криштофович, Принада, с. 372. Нижний мел. С. Константиновка, Приморье.

Cephalotaxopsis acuminata var. dolychophylla Kryshtofovich et Prynada

1932. Криштофович, Принада, с. 374. Нижний мел. С. Константиновка. Приморье.

Cephalotaxopsis borealis Samylina

1967а. Самылина, с. 154, табл. 12, фиг. 9; табл. 14, фиг. 10. Нижний мел (буор-кемюсская свита) . Бассейн р. Колымы.
1976. Самылина, с. 66, табл. 31, фиг. 1, 2; табл. 34, фиг. 6, *а*. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Cephalotaxopsis brevifolia Fontaine

1889. Fontaine, с. 238, табл. 105, фиг. 3; табл. 106, фиг. 5; табл. 107, фиг. 5. Нижний мел. США.
1929. Криштофович, табл. 2, фиг. 1, 3. Нижний мел. С. Константиновка, Приморье.
1932. Криштофович, Принада, с. 372. Нижний мел. Партизанск, Приморье.
1934. Криштофович, Принада, с. 78, рис. 43, 1. Нижний мел. Приморье.

Cephalotaxopsis cf. brevifolia Fontaine

1963. Турутанова-Кетова в кн.: Основы палеонтологии, с. 261, табл. 15, фиг. 5. Средняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Cephalotaxopsis intermedia Hollick

1930. Hollick, с. 54, табл. 17, фиг. 1–3. Верхний мел. Аляска.

1952. Вахрамеев, с. 171, табл. 10, фиг. 4–6. Нижний мел. Бассейн р. Эмбы, Западный Казахстан.

1976. Самылина, с. 66, табл. 39 , фиг. 3. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Cephalotaxopsis cf. microphylla Sveshnikova et Budantsev

1976. Самылина, с. 67, табл. 40, фиг. 7–9. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Cephalotaxopsis sangarensis Vassilevskaja

1959а. Василевская, с. 73, табл. 9, фиг. 1–5. Нижний мел (чонгургасская свита) . Ленский бассейн.

1976. Самылина, с. 66, табл. 26, фиг. 1. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Cephalotaxopsis sp.

1967. Красилов, с. 198, табл. 73, фиг. 1. Нижний мел. Приморье.

Cephalotaxus Siebold et Zuccarini, 1842

Cephalotaxus drupacea Siebold et Zuccarini, современный

Cephalotaxus cretacea Samylina

1963. Самылина, с. 107, табл. 32, фиг. 1; табл. 35, фиг. 1–5; табл. 37, фиг. 8. Нижний мел. Бассейн р. Алдана.

Cephalotaxus microphylla Sveshnikova

1969. Свешникова, Буданцев, с. 62, табл. 15, фиг. 10–11; табл. 16, фиг. 8–12. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

Cephalotaxus ussuriensis Krassilov

1965б. Красилов, с. 1452, табл. 2, фиг. 4–8. Нижний мел. Приморье.

1967. Красилов, с. 192, табл. 70, фиг. 1–6; рис. 26, *а–д.* Нижний мел. Приморье.

Cheirolepis Schimper, 1870

Родовое название заменено на Cheirolepidium Takhtajan (Тахтаджян в кн.: Основы палеонтологии, 1963) .

Cheirolepis muensteri (Schenk) Schimper

1867. Brachyphyllum muensteri. Schenk, с. 187, табл. 42, фиг. 1–12. Верхний триас. Бавария.

1870 (1869–1874) . Cheirolepis muensteri. Schimper, с. 248. Там же.

Cheirolepis cf. muensteri (Schenk) Schimper

1958. Орловская, с. 137, табл. 2, фиг. 3. Нижняя – средняя юра (шоптыкульская свита) . Майкюбень, Казахстан.

Cheirolepis setosa (Phillips) Seward

[цитируется так же, как Elatides setosa (Phillips) Thomas, Haiburnia setosa (Phillips) Harris, Pagiophyllum setosum (Phillips) Seward]

1875. Brachyphyllum setosum. Phillips, c. 229. Юра. Англия.

1900. Cheirolepis setosa. Seward, c. 294, фиг. в тексте 53B. Там же.

1938б. Принада, с. 393, табл. 4, фиг. 6, 7. Средняя юра. Эмбинский район, Западный Казахстан.

Circoporoxylon Krausel, 1949

Circoporoxylon goeppertii (Conwentz) Krausel

1885. Glyptostroboxylon goeppertii. Conwentz, c. 445. Олигоцен. Аргентина.

1949. Circoporoxylon goeppertii. Krausel, c. 115. Там же.

Circoporoxylon roburnense (Stopes) Krausel

Очевидно, имеется в виду C. woburnense, см. ниже.

1968. Нащекин, с. 84, рис. 18. Нижний? мел (кийская свита). Средняя Сибирь.

Circoporoxylon woburnense (Stopes) Krausel

1915. Podocarpoxylon woburnense. Stopes, c. 211, табл. 20, фиг. 1, 2; рис. в тексте 60—63. Нижний мел. Англия.

1949. Circoporoxylon woburnense. Krausel, c. 116. Там же.

1962а. Нащекин, с. 284, табл. 28, фиг. 1—7. Нижний мел. Красноярский край.

Coniferites Unger, 1849

Coniferites lignitum Unger

1849. Unger, c. 13. Миоцен. Штирия, Австрия.

Coniferites marchaensis Vachrameev in E. Lebedev

1965. Лебедев Е.Л., с. 126, табл. 31, фиг. 2; табл. 35, фиг. 1; табл. 36, фиг. 1. Верхняя юра. Бассейны рек Амура и Лены.

Conites Sternberg, 1823

Conites bucklandii Sternberg

1823 (1820—1838). Sternberg, c. 39, табл. 30.

Conites amadocensis Stanislavsky

1971. Станиславский, с. 114, табл. 5, фиг. 4. Верхний триас (новорайская свита). Донбасс.

Conites compactus Vassilevskaja

1966. Василевская, Абрамова, с. 89, табл. 8, фиг. 4. Нижний мел (укинская свита). Ленский бассейн.

Conites cupressiformis Vassilevskaja

1963. Василевская, Павлов, табл. 42, фиг. 12—15. Нижний мел (укинская свита). Ленский бассейн.

Cupressinites Bowerbank, 1840

Cupressinites globosus Bowerbank

1840. Bowerbank, с. 52, табл. 10, фиг. 12—14, 32, 33. Эоцен. Англия.

Cupressinites obtusifolius Eichwald

1865 (1860—1868). Eichwald, с. 44, табл. 3, фиг. 6, *a—d*, 7. Нижний мел. Клин, Московская обл.

Cupressinocladus Seward, 1919

Cupressinocladus salicornioides (Endlicher) Seward

1847. Libocedrites salicornioides. Endlicher, с. 275. Эоцен-миоцен. Западная Европа.

1919. Cupressinocladus salicornioides. Seward, с. 307, фиг. в тексте 752. Эоцен — миоцен. Западная Европа.

Cupressinocladus diskoense Walton

1927. Walton, с. 239, табл. 15, фиг. 4, фиг. в тексте 1. Мел. Гренландия.

1967. Шилкина, с. 40, табл. 4, фиг. 1—3. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

Cupressinocladus sp.

1934. Принада, с. 71, табл. 2, фиг. 3. Верхний триас. Памир.

Cupressinoxylon Goeppert, 1850

Cupressinoxylon subaequale Goeppert

1850. Goeppert, с. 202, табл. 27, фиг. 1—5. Кайнозой. Западная Европа.

Cupressinoxylon kiprianovii Mercklin

1855. Mercklin, с. 69, табл. 19, фиг. 78; табл. 20, Юра (?). Европейская часть СССР.

Cupressinoxylon sibiricum Baranov et Nikolaeva

1956. Баранов, Николаева, с. 126, рис. 2. Верхний мел. Енисейский кряж.

1962а. Нащекин, с. 286, табл. 30, фиг. 1—11. Нижний мел — палеоген. Западная Сибирь.

Cupressinoxylon ucrainicum Goeppert

1850. Goeppert, с. 21, табл. 26, фиг. 1—4. Нижний мел. Украина.

1865 (1860—1868). Eichwald, с. 45, табл. 5, фиг. 10, *a*, *b*. Нижний мел. Европейская часть СССР.

Cupressocarpus Brick, 1925

Cupressocarpus ovatus Brick

1925. Брик, с. 201, табл. 1, фиг. 8, 9; рис. 10. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Cycadocarpidium Nathorst, 1886

Cycadocarpidium erdmannii Nathorst

1886. Nathorst, с. 91, табл. 26, фиг. 15—20. Верхний триас. Швеция.

1933. Криштофович, Принада, с. 29, табл. 2, фиг. 7, *a*; рис. 2. Верхний триас. Челябинский бассейн.

1934. Криштофович, Принада, с. 84, рис. 50—1. Верхний триас. Челябинский бассейн, Приморье.
1940. Принада, с. 26, рис. 5, *А, Б*. Верхний триас. Богословское месторождение, Восточный Урал.
1941. Брик, с. 37, табл. 10, фиг. 5—7. Верхний триас. Камыш-Баши, Южная Фергана.
1971. Станиславский, с. 101, табл. 13, фиг. 3—7; рис. в тексте 55, 56. Верхний триас (новорайская свита). Донбасс.

Cycadocarpidium dongurmensis Genkina

1970. Алиев, Генкина, с. 31, табл. 12, фиг. 6—11. Верхний триас (тура-кавакская свита). Хребет Кавак-Тау, Тянь-Шань.

Cycadocarpidium dzergalanensis Genkina

1964. Генкина, с. 74, табл. 3, фиг. 1—3. Верхний триас (низы продуктивной свиты). Иссык-Куль.
1966. Генкина, стр. 115, табл. 58, фиг. 18—20. Верхний триас — нижняя юра (базальная свита). Джергалан, Иссык-Куль.

Cycadocarpidium exiguum Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 66, табл. 34, фиг. 6, *а*; табл. 36, фиг. 1—3; рис. 27. Верхний триас (протопивская свита). Гаражовка, Донбасс.

Cycadocarpidium ferganense Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 323, табл. 5, фиг. 69—71; табл. 8, фиг. 115. Нижняя юра. Южная Фергана.
1960. Сикстель, с. 82, рис. 13. Верхний триас. Шураб-3, Сулюкта, Камыш-Баши, Южная Фергана.
1966. Генкина, с. 116, табл. 58, фиг. 27—28. Верхний триас (акташская свита). Иссык-Куль.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 193, табл. 20, фиг. 14—16. Верхний триас — нижняя юра. Шураб, Южная Фергана.

Cycadocarpidium insignis Genkina

1964. Генкина, с. 73, табл. 2, фиг. 16—20. Верхний триас. Иссык-Куль.
1966. Генкина, с. 114, табл. 58, фиг. 13—17. Верхний триас — нижняя юра (акташская и базальная свиты). Иссык-Куль.

Cycadocarpidium issykkulensis Genkina

1964. Генкина, с. 72, табл. 1, фиг. 1—10. Верхний триас (акташская свита). Иссык-Куль.
1966. Генкина, с. 113, табл. 57, фиг. 3—12; табл. 58, фиг. 1. Верхний триас (акташская свита). Иссык-Куль.

Cycadocarpidium minor Turutanova-Ketova

1931. Турутанова-Кетова, с. 315, табл. 3, фиг. 1; табл. 4, фиг. 2. Верхний триас — нижняя юра. Киргизия.
1966. Генкина, с. 177, табл. 58, фиг. 29—30. Верхний триас — нижняя юра (акташская, коктуйская, джильская и базальная свиты). Иссык-Куль.

Cycadocarpidium parvum Kryshtofovich et Prynada

1932. Криштофович, Принада, с. 371. Верхний триас. С. Раздольное, Приморье.

Cycadocarpidium paulum Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 67, табл. 34, фиг. 1—5; табл. 35, фиг. 1—9; табл. 36, фиг. 4; рис. 28. Верхний триас (протоливская свита). Гаражовка, Донбасс.

Cycadocarpidium quadricarpum Prynada

1940. Принада, рис. 5, *J*. Верхний триас. Восточный Урал.

Cycadocarpidium sogutensis Genkina

1964. Генкина, с. 73, табл. 2, фиг. 1—15. Верхний триас (акташская свита). Иссык-Куль.

1966. Генкина, с. 114, табл. 63, фиг. 2—12. Там же.

Cycadocarpidium swabii Nathorst

1911b. Nathorst, с. 5, табл. 1, фиг. 11—15. Верхний триас. Швеция.

1934. Криштофович, Принада, с. 82, рис. 50—2. Нижняя юра. Казахстан.

1964. Генкина, с. 75, табл. 3, фиг. 4—8. Верхний триас (акташская свита). Иссык-Куль.

1966. Генкина, с. 116, табл. 58, рис. 21—26. Верхний триас (акташская свита). Иссык-Куль.

1971. Станиславский, с. 105, табл. 36, фиг. 2—12; рис. 57, *A—O*, 58 в тексте. Верхний триас (новорайская свита). Донбасс.

Cycadocarpidium tricarpum Prynada

1940. Принада, с. 26, рис. 5, *C*, *D*, *F*, *G*, *H*. Верхний триас. Богословское месторождение, Восточный Урал.

1959. Владимирович, с. 463, табл. 3, фиг. 5, 6; рис. 3 в тексте. Верхний триас. Богословское месторождение, Восточный Урал.

1976. Станиславский, с. 62, табл. 33, фиг. 1—7; рис. 25, 26. Верхний триас (протопивская свита). Гаражовка, Донбасс.

Cyclopitys Schmalhausen, 1879

Cyclopitys nordenskioldii (Heer) Schmalhausen

Сейчас известен как Pityophyllum nordenskioldii (Heer) см. ниже.

1876a. Pinus nordenskioldii. Heer, с. 45, табл. 9, фиг. 1—6. Нижний мел. Шпицберген.

1879. Cyclopitys nordenskioldii. Schmalhausen, с. 41, табл. 1, фиг. 4, *b*; табл. 2, фиг. 1, *c*; табл. 5, фиг. 2, *d*, 3, *b*, 6, *b*, 10. Юра. Кузбасс.

1905. Krasser, с. 37, табл. 3, фиг. 9; табл. 4, фиг. 1, 3. Верхняя юра — нижний мел. Западное Забайкалье.

Cyparissidium Heer, 1874

Cyparissidium gracile Heer

1874a. Heer, с. 74, табл. 17, фиг. 5, *b*, *c*; табл. 19; табл. 20, фиг. 1, *e*; табл. 21, фиг. 9, *b*, 10, *d*. Мел. Гренландия.

1932. Криштофович, Принада, с. 372. Нижний мел. Приморье.

1933. Криштофович, табл. 15, фиг. 2. Нижний мел. Приморье.

1952. Вахрамеев, с. 174, табл. 10, фиг. 7—8. Нижний мел (кызылшенская свита). Казахстан.

1962. Киричкова, Тесленко, с. 22, табл. 38, фиг. 6. Нижний мел (покурская свита) . Омская обл., Западная Сибирь.
1967а. Самылина, с. 156, табл. 8, фиг. 1—2; табл. 12, фиг. 7. Нижний мел (буор-кемюсская свита) . Бассейн р. Колымы.
1970а. Самсонов, с. 49, табл. 1, фиг. 3. Нижний мел. Итемир-Джаракудукская впадина, Средняя Азия.

Cyparissidium cf. gracile Heer

1970б. Самсонов, с. 43, табл. 1, фиг. 7—8. Нижний мел. Кульджук-Тау, Средняя Азия.

Cyparissidium japonicum Yokoyama

чаще приводится как Brachyphyllum japonicum (Yokoyama) Oishi см. выше.

1894. Yokoyama, с. 229, табл. 20, фиг. 3, *а*, 6, 6, *а*, 13; табл. 24, фиг. 4. Нижний мел. Япония.
1963. Турутанова-Кетова в кн.: Основы палеонтологии, табл. 25, фиг. 8. Нижний мел. Приморье.
1970а. Самсонов, с. 49, табл. 1, фиг. 4. Нижний мел. Итемир-Джаракуддукская впадина, Средняя Азия.

Cyparissidium sp.

1916. Криштофович, с. 119, табл. 2, фиг. 2, 3. Нижний мел. П-ов Муравьева-Амурского, Приморье.
1963. Василевская, Павлов, табл. 42, фиг. 9. Нижний мел (укинская свита) . Ленский бассейн.

Drepanolepis Nathorst, 1897

Drepanolepis angustior Nathorst

1897а. Natrohst, с. 21, табл. 1, фиг. 16, 17. Нижний мел. Шпицберген.
1934. Криштофович, Принада, с. 82, рис. 49, 2. Юра. Мариинск.
1963. Василевская, Павлов, табл. 43, фиг. 14. Нижний мел (укинская свита) . Ленский бассейн

Drepanolepis charkoviensis Stanislavsky

1957. Станиславский, с. 80, табл. 18, фиг. 3. Средняя юра. Каменка, Донбасс.

Drepanolepis ferganensis Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова в кн.: Основы палеонтологии, с. 236, табл. 9, фиг. 1; рис. 82. Нижняя юра. Фергана.

Drepanolepis latusaxis Genkina

1963а. Генкина, с. 91, табл. 51, фиг. 1, 2. Средняя юра. Орский бассейн, Казахстан.

Drepanolepis promethei (Kryshtofovich) Prynada

1934. Криштофович, Принада, с. 82, рис. 49—1. Юра. Кубанская обл.

Drepanolepis turkestanica Turutanova-Ketova ex Burakova

1963. Буракова, с. 217, табл. 69, фиг. 1, 3, 4. Средняя юра. Туаркыр.

Drepanolepis sp.

1961. Просвирякова, с. 168, табл. 12, фиг. 2. Верхняя юра (гонгринская свита) . Чульмаканский участок, Якутия.

1976. Самылина, с. 72, 73, табл. 37, фиг. 10, 11. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Elatides Heer, 1876

Elatides ovalis Heer

1876b. Heer, с. 77, табл. 9, фиг. 2. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1880. Heer , с. 28, Там же.

1934. Криштофович, Принада, с. 78, рис. 44—1. Юра. Иркутский бассейн.

1962. Лебедев И.В., с. 198, табл. 4, фиг. 2, 3. Юра. Кузбасс.

1951. Принада, табл. 13, фиг. 9. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1962. Принада, с. 224, табл. 13, фиг. 9; табл. 18, фиг. 2, 3, 8; рис. 61. Юра. Иркутский бассейн.

1971. Красилов, табл. 1, фиг. 1—3. Верхняя юра. Буреинский бассейн.

Elatides asiatica (Yokoyama) Krassilov

Побеги без шишек описываются как Elatocladus manchurica (Yok.) Yabe.

1906. Palyssia manchurica. Yokoyama, с. 32, табл. 8, фиг. 2, 2, *a*. Верхняя юра — нижний мел. Северо-Восточный Китай.

1967. Красилов, с. 200, табл. 74, фиг. 1—3; табл. 75, фиг. 1—7; табл. 76, фиг. 1—3; рис. 28, *а—г* в тексте. Нижний мел. Приморье.

1970б. Самсонов, с. 43, табл. 1, фиг. 9—12. Нижний мел. Кульджук-Тау, Средняя Азия.

Elatides brandtiana Heer

1876b. Heer, с. 78, табл. 14, фиг. 3—4. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1880. Heer, с. 28, табл. 8, фиг. 16, 17. Там же.

1933. Криштофович, табл. 11, фиг. 5—6. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1934. Криштофович, Принада, с. 78, рис. 44, *2*. Юра. Иркутский бассейн.

1961. Просвирякова, с. 165, табл. 11, фиг. 5. Средняя — верхняя юра. Южная Якутия.

1963. Самылина, с. 109, табл. 32, фиг. 9. Нижний мел. Бассейн р. Алдана.

Elatides curvifolia (Dunker) Nathorst

1846. Lycopodites curvifolus. Dunker, с. 20, табл. 7, фиг. 9. Нижний мел. Западная Европа.

1897a. Elatides curvifolia. Nathorst, с. 35, табл. 1, фиг. 25—27; табл. 2, фиг. 3—5; с. 58, табл. 4, фиг. 1—18; табл. 6, фиг. 6—8. Нижний мел. Шпицберген.

1911. Томас, с. 30, табл. 4, фиг. 15. Средняя юра. Каменка, Донбасс.

1927. Принада, с. 974. Нижний мел. Поволжье.

1934. Криштофович, Принада, с. 79, рис. 45, *1*. Нижний мел. Приморье.

1957. Станиславский, с. 75, табл. 15, фиг. 10—11; табл. 16, фиг. 1—2; табл. 17, фиг. 1. Средняя юра. Каменка, Донбасс.

1963. Буракова, с. 215, табл. 47, фиг. 1, 2; табл. 49, фиг. 2. Средняя юра. Туаркыр.

1966. Просвирякова, с. 107, табл. 22, фиг. 6. Средняя юра. Мангышлак.
1970б. Тесленко, с. 172, табл. 46, фиг. 9. Средняя юра (салдамская свита). Тува.

Elatides ex gr. curvifolia (Dunker) Nathorst

1967. Красилов, с. 204, табл. 76, фиг. 4—7; табл. 77, фиг. 5—7. Нижний мел. Приморье.

Elatides falcata Heer

В.Д. Принада перевел этот вид в род Elatocladus Halle.
1876b. Heer, с. 76, табл. 14, фиг. 6, *a—d;* Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

Elatides ketovae Gomolitzky

1963. Гомолицкий, с. 1436, табл. 4, фиг. 6—7. Средняя юра. Гиссарский хребет.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 194, табл. 19, фиг. 6. Средняя юра. Кугитанг, Шураб, Средняя Азия.

Elatides muensteri (Schenk) Thomas

Чаще цитируется как Cheirolepidium muensteri (Schenk) Takht.
1867. Brachyphyllum muensteri. Schenk, с. 187, табл. 42, фиг. 1—12. Верхний триас. Бавария.
1911. Elatides muensteri. Томас, с. 30, табл. 4, фиг. 14. Средняя юра. Каменка, Донбасс.
1963а. Генкина, с. 88, табл. 48, фиг. 1—5. Юра. Орский бассейн, Казахстан.

Elatides parvula Heer

1876b Heer, с. 78, табл. 14, фиг. 5. Средняя юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

Elatides setosa (Phillips) Thomas

Цитируется так же как Cheirolepis setosa (Phill.) Sew., Haiburnia setosa (Phill.) Harris, Pagiophyllum setosum (Phill.) Sew.
1875. Brachyphyllum setosum. Phillips, с. 229, Средняя юра. Англия.
1913б. Elatides setosa. Thomas, с. 246. Средняя юра. Англия.
1957. Станиславский, с. 73, табл. 15, фиг. 8—9; табл. 16, фиг. 3—5. Средняя юра. Каменка, Донбасс.
1963. Турутанова-Кетова в кн.: Основы палеонтологии, с. 248, табл. 11, фиг. 8, 9; табл. 12; рис. 100. Нижняя юра. Фергана.
1966. Просвирякова, с. 107, табл. 22, фиг. 4—5. Средняя юра. Мангышлак.

Elatocladus Halle, 1913

Elatocladus heterophyllus Halle

1913. Halle, с. 84, табл. 8, фиг. 12—12, 17—25. Юра. Антарктида.
1961. Просвирякова, с. 165. Средняя — верхняя юра. Южная Якутия.

Elatocladus acifolius Bell

1976. Самылина, с. 64, табл. 40, фиг. 3—5. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Elatocladus brevifolius (Fontaine) Bell

Цитируется так же как Cephalotaxopsis brevifolia Fontaine.

1889. Cephalotaxopsis brevifolia. Fontaine, стр. 238, табл. 105, фиг. 3; табл. 106, фиг. 5; табл. 107, фиг. 5. Нижний мел. США.

1956. Elatocladus brevifolia. Bell, с. 109, табл. 53, фиг. 2; табл. 54, фиг. 2, 7; табл. 57, фиг. 1; табл. 60, фиг. 7. Нижний мел. Канада.

1967. Красилов, с. 214, табл. 83, фиг. 8—10. Нижний мел. Приморье.

Elatocladus confertus (Oldham) Halle

1863. Cunnighamites confertus. Oldham, Morris, с. 32, фиг. 10. Юра. Индия.

1913. Elatocladus conferta. Halle, с. 86, табл. 8, фиг. 26—40. Юра. Антарктида.

1976. Долуденко, Орловская, с. 79, табл. 38, фиг. 8. Средняя юра. Боролдай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Elatocladus cf. confertus (Oldham) Halle

1931. Принада, с. 38, табл. 2, фиг. 24. Юра. Средняя Азия.

Elatocladus cunninghamioides Sveshnikova et Budantsev

1969. Свешникова, Буданцев, с. 67, табл. 20, фиг. 6, 7, *а;* табл. 21, фиг. 8, *а*—15. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

Elatocladus falcatus (Heer) Prynada

1876b. Elatides falcata. Heer с. 79, табл. 14, фиг. 6 , *а—d*. Юра. Иркутский бассейн.

1962. Elatocladus falcatus. Принада, с. 225. Там же. Предположительно также в нижнем мелу Восточного Забайкалья.

Elatocladus kamsassianus I. Lebedev

1962. Ледедев И.В., с. 199, табл. 3, фиг. 3. Юра. Кузбасс.

Elatocladus ketoviae Vassilevskaja

1963. Василевская, Павлов, табл. 42, фиг. 10. Нижний мел (укинская свита). Ленский бассейн.

1966. Василевская, Абрамова, с. 87, табл. 8, фиг. 2, 3. Там же.

Elatocladus ketoviae Doludenko

(В 1978 г. название заменено на Elatocladus turutanovae Doludenko).

1976. Долуденко, Орловская, с. 121, табл. 89, фиг. 1—8. Верхняя юра (карабастауская и боролсайская свиты). Чугурчак, Чохай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Elatocladus manchuricus (Yokoyama) Yabe

Цитируется так же как Elatides asiatica (Yok.) Krassilov.

1906. Palyssia manchurica. Yokoyama, с. 32, табл. 8, фиг. 2, 2, *а*. Верхняя юра — нижний мел. Северо-Восточный Китай.

1922. Elatocladus manchurica. Yabe, с. 28, табл. 4, фиг. 9. Верхняя юра — нижний мел. Северо-Восточный Китай и Корейский п-ов.

1932. Криштофович, Принада, с. 373. Нижний мел. Приморье.

1933. Криштофович, табл. 15, фиг. 1, *а*. Нижний мел. Южное Приморье.

1938. Штемпель, с. 74. Нижний мел. Южное Приморье.

1958. Орловская, с. 137, табл. 4, фиг. 2. Нижняя юра (сарыкульская свита). Майкюбень, Казахстан.

1962. Принада, с. 227, табл. 17, фиг. 4. Верхняя юра — нижний мел. Восточное Забайкалье.
1962. Тесленко, с. 148, табл. 24, фиг. 1. Средняя юра (итатская свита). Красноярский край.
1966. Василевская, с. 69, табл. 7, фиг. 1—3. Нижний мел. Ленский бассейн.
1968. Орловская, табл. 16, фиг. 13—14. Нижняя юра. Майкюбень, Казахстан.
1970б. Тесленко, с. 173, табл. 46, фиг. 8, 12. Средняя юра (итатская свита). Красноярский край.
1976. Самылина, с. 64, табл. 35, фиг. 1; табл. 36, фиг. 1—4; табл. 40, фиг. 6. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Elatocladus aff. manchuricus (Yokoyama) Yabe

1963а. Генкина, с. 89, табл. 49, фиг. 4—7; табл. 50, фиг. 1. Средняя юра. Орский бассейн, Казахстан.

Elatocladus cf. manchuricus (Yokoyama) Yabe

1961. Просвирякова, стр. 164, табл. 11, фиг. 11. Верхняя юра. Южная Якутия.

Elatocladus mesozoicus Kiritchkova

1960. Киричкова, с. 948, рис. 1, *а, б*. Средняя юра. Дуванкульская впадина, Восточный Урал.

Elatocladus minutus Doludenko

1976. Долуденко, Орловская, с. 121, табл. 88, фиг. 1—13. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Elatocladus obtusifolius Oishi

1940. Oishi, с. 396, табл. 41, фиг. 1—1, а. Нижний мел. Япония.
1967. Красилов, с. 215, табл. 73, фиг. 9—11. Нижний мел. Приморье.

Elatocladus aff. obtusifolius Oishi

1959а. Василевская, с. 74, табл. 10, фиг. 1. Нижний мел. Ленский бассейн.

Elatocladus pachyphyllus Prynada

1970. Принада, с. 68, табл. 4, фиг. 4. Нижний триас (корвунчанская свита). Нижняя Тунгуска.

Elatocladus sibiricus Chachlov

1929. Хахлов, с. 12, фиг. 9, 14, 15. Средняя юра. Кузбасс.

Elatocladus smittianus (Heer) Seward

1874. Sequoia smittiana. Heer, с. 82, табл. 18, фиг. 1, *b*; табл. 20, фиг. 5, *b* — 7, *c*; табл. 23, фиг. 1—6. Мел. Гренландия.
1926. Elatocladus smittianus. Seward, с. 103, табл. 10, фиг. 90—92; табл. 12, фиг. 119; рис. в тексте 14. Там же.
1955. Ананьев, с. 188, табл. 26, фиг. 8. Нижний мел. Р. Кия, Западная Сибирь.
1962. Киричкова, Тесленко, с. 227, табл. 38, фиг. 10; табл. 49, фиг. 4. Нижний мел (покурская свита). Омская обл., Западная Сибирь.

Elatocladus submanchuricus Yabe et Oishi

1933. Yabe, Oishi, с. 228, табл. 34, фиг. 8. Юра — нижний мел. Северо-Восточный Китай.

1963. Турутанова-Кетова в кн.: Основы палеонтологии, с. 255, табл. 13, фиг. 6. Нижний мел. Приморье.

Elatocladus subzamioides (Moeller) Turutanova–Ketova

1903. Taxites? subzamioides Möller., с. 34, табл. 6, фиг. 4, 5; табл. 7, фиг. 16. Юра. Борнхольм.

1916. Криштофович, с. 120, табл. 2, фиг. 4. Нижний мел. Приморье.

1963. Elatocladus subzamioides. Турутанова-Кетова в кн.: Основы палеонтологии, с. 255, табл. 13, фиг. 5. Нижний мел. Приморье.

1976. Долуденко, Орловская, с. 121, табл. 87, фиг. 1–7; табл. 88, фиг. 14, 15. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Elatocladus aff. subzamioides Moeller

1961. Самылина, с. 641, табл. 1, фиг. 7–9. Нижний мел. С. Липовцы, Приморье.

Eladocladus tenuifolius Krassilov

1967. Красилов, с. 215, табл. 68, фиг. 5–7. Нижний мел. Приморье.

Elatocladus turutanovae Doludenko

1978. Долуденко, с. 146 (изменение названия: ранее был описан как Elatocladus ketovae Doludenko).

Ferganiella Neuburg, 1936

М.Ф. Нейбург (1936) указывает в качестве типового вида Ferganiella weberi Prynada (MS) из нижней юры Средней Азии. Однако, поскольку этот вид не был эффективно обнародован, типовым следует считать Ferganiella urjanchaica Neuburg.

Ferganiella urjanchaica Neuburg

1936а. Нейбург, с. 151, табл. 4, фиг. 5, 5а. Средняя юра. Тува.

1952. Сикстель, с. 51, рис. 25. Нижняя — средняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.

1962. Лебедев И.В., с. 199, табл. 2, фиг. 1. Юра. Кузбасс.

1962. Тесленко, с. 145, табл. 23, фиг. 2; рис. 40. Юра. Кузбасс.

1970б. Тесленко, с. 172, табл. 46, фиг. 7, 10, 11. Нижняя или средняя юра. Кузбасс. Средняя юра. Тува.

Ferganiella acuminata (Chachlov) Prynada

1924. Podozamites lanceolatus var. acuminata. Хахлов, с. 14, фиг. 24, 25. Юра. Иркутский бассейн.

1962. Ferganiella acuminata. Принада, с. 219. Там же.

Ferganiella bulanaschensis Kiritchkova

1969. Киричкова, с. 306, табл. 11, фиг. 7. Врехний триас. Восточный Урал.

Ferganiella kiranensis E. Lebedev

1973. Лебедев Е.Л., с. 93, табл. 11, фиг. 4. Юра. Западное Приохотье.

Ferganiella lanceolata Brick ex Turutanova-Ketova

1960. Турутанова-Кетова в кн.: Новые виды. . . , с. 109, табл. 21, фиг. 6. Нижняя юра. Южная Фергана.

1961. Романова, с. 117, табл. 3, фиг. 3. Нижняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 193, табл. 19, фиг. 1. Нижняя — средняя юра. Шураб, Южная Фергана.

1975. Баранова, Киричкова, Зауэр, с. 133, табл. 34, фиг. 7, 8. Средняя юра. Жидели, Северная Эмба, Западный Казахстан.

1976. Долуденко, Орловская, с. 80, табл. 35, фиг. 9; табл. 36, фиг. 4—6; табл. 37, фиг. 1—4; рис. 45, 46. Средняя юра. Боролдай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Ferganiella latifolia Brick ex Turutanova-Ketova

1960. Турутанова-Кетова в кн.: Новые виды. . ., с. 108, табл. 22, фиг. 4. Нижняя юра. Южная Фергана.

1976. Долуденко, Орловская, с. 80, табл. 35, фиг. 5, 6; табл. 36, фиг. 1—3; табл. 37, фиг. 5, 6; рис. 44, *а—г*. Средняя юра. Боролдай, Таскомырсай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Ferganiella kirgisica Sixtel

1960. Сикстель, с. 86, табл. 14, фиг. 5—7. Верхний триас. Иссык-Куль.

1966. Генкина, с. 118, табл. 59, фиг. 14. Там же.

Ferganiella kurunzulajensis Prynada

1962. Принада с. 220, рис. 59—60. Юра. Восточное Забайкалье.

Ferganiella minuta Nikishova

1970. Никишова, с. 37, табл. 1, фиг. 4—6. Средняя юра. Фергана.

Ferganiella mongugaica Srebrodolskaja

1968. Сребродольская в кн.: Новые виды, с. 85, табл. 23, фиг. 4. Верхний триас. Западное побережье Амурского залива, Приморье.

Ferganiella ovalis Turutanova-Ketova

1976. Долуденко, Орловская, с. 81, табл. 36, фиг. 7, 8; рис. 47, *а—в*. Нижняя юра. Акбулак, хребет Каратау, Южный Казахстан. Средняя юра. Таскомырсай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Ferganiella sp.

1963. Буракова, с. 213, табл. 63, рис. 4; табл. 64, рис. 3—4. Средняя юра. Туаркыр.

Florinia Sveshnikova, 1967

Florinia vilujensis Sveshnikova

1967. Свешникова, с. 186, табл. 12, фиг. 9, 10. Верхний мел. Вилюйский бассейн.

Florinia borealis Sveshnikova et Budantsev

1969. Свешникова, Буданцев, с. 63, табл. 15, фиг. 8—9; табл. 16, фиг. 2—7, 13; табл. 17, фиг. 1—10; табл. 18, фиг. 1—5; табл. 19, фиг. 11; табл. 20, фиг. 9*б*. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

Florinia? borealis Sveshnikova et Budantsev

1976. Самылина, с. 67, табл. 34, фиг. 1—3, 4, *а*. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Fraxinopsis Wieland, 1929

Fraxinopsis minor Wieland

1929. Wieland, c. 448, фиг. 5, *b*. Верхний триас. Аргентина.

Fraxinopsis vachrameevii Genkina

1964. Генкина, с. 76, табл. 3, фиг. 12—20. Верхний триас (акташская свита). Иссык-Куль.

1966. Генкина, с. 117, табл. 59, фиг. 1—11. Там же.

Frenelopsis Schenk, 1869

Frenelopsis hoheneggeri (Ettingshausen) Schenk

1852a. Thuites hoheneggeri. Ettingshausen, c. 26, табл. 1, фиг. 6, 7. Нижний мел. Чехословакия.

1869. Frenelopsis hoheneggeri. Schenk, c. 13, табл. 6, фиг. 1, 3, 6. Там же.

1939. Пименова, с. 235, табл. 1, фиг. 1—3. Нижний мел. Украина.

Geinitzia Endlicher, 1847

Geinitzia cretacea Endlicher

1847. Endlicher, c. 281. Верхний мел. Западная Еврола.

1865 (1860—1868). Eichwald, c. 48, табл. 4, фиг. 11; табл. 5, фиг. 8. Нижний мел. Московская обл.

Geinitzia prisca Eichwald

1865 (1860—1868). Eichwald, c. 48, табл. 3, фиг. 19. Нижний мел. Московская обл.

Glyptostroboxylon Conwentz, 1885

Glyptostroboxylon goeppertii Conwentz

1885. Conwentz, c. 445, Олигоцен. Аргентина.

Glyptostroboxylon senomanicum Nastschokin

1962a. Нащекин, с. 290, табл. 32, фиг. 1—5. Нижний мел. Красноярский край.

Haiburnia Harris, 1952

Haiburnia setosa (Phillips) Harris

1875. Brachyphyllum setosum. Phillips, c. 229. Средняя юра. Англия.

1952. Haiburnia setosa. Harris, c. 362, фиг. 1—3. Там же.

Haiburnia sveshnikoviae Gomolitzky

1963. Гомолицкий, с. 1435, табл. 4, фиг. 1—5. Средняя юра. Гиссарский хребет.

Hissaria Gomolitzky, 1969

Hissaria brickiae Gomolitzky

1969. Гомолицкий, с. 1535, табл. 3, фиг. 1—4. Средняя юра. Яккабагские горы, Гиссарский хребет.

Hissaria lanceolata Gomolitzky

1969. Гомолицкий, с. 1338, табл. 4, фиг. 1—5. Там же.

Juniperoxyion Houlbert, 1910

Juniperoxylon turonense Houlbert

1910. Houlbert, с. 73, табл. 4. Эоцен, Франция.

Juniperoxylon sibiricum Natschokin

1962б. Нащекин, с. 164, табл. 29, фиг. 10—12. Средняя — верхняя юра. Красноярский край.

Keteleerioxylon Shilkina, 1960

Keteleerioxylon arcticum Shilkina

1960. Шилкина, с. 116, табл. 8, фиг. 1—8. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

Masculostrobus Seward, 1911

Masculostrobus zeilleri Seward

1911b. Seward, с. 686, фиг. 11. Верхняя юра. Шотландия.

Masculostrobus karataviensis Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова в кн.: Основы палеонтологии, с. 278, табл. 19, фиг. 1; рис. 150. Средняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Nageiopsis Fontaine, 1889

Nageiopsis longifolia Fontaine

1889. Fontaine, с. 195, табл. 75, фиг. 1; табл. 76, фиг. 2—3; табл. 77, фиг. 1—2; табл. 78, фиг. 1—5. Нижний мел. США.

Nageiopsis ussuriensis Kryshtofovich et Prynada

1932. Криштофович, Принада, с. 374. Нижний мел. С. Константиновка, Приморье.

1934. Криштофович, Принада, с. 77, рис. 41. Нижний мел. Приморье.

Nansenia Sveshnikova et Budantsev, 1967

Nansenia arctica Sveshnikova et Budantsev

1967. Свешникова, Буданцев, с. 124, табл. 12, фиг. 1—6. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

1969. Свешникова, Буданцев, с. 6, табл. 18, фиг. 6—9; табл. 19, фиг. 2—9; табл. 20, фиг. 2—5. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

Ontheodendron Sahni et Rao, 1933

Ontheodendron florinii Sahni et Rao

1933. Sahni, Rao, с. 200, табл. 15, 16. Юра. Индия.

Ontheodendron cf. florini Sahni et Rao

1952. Частникова, с. 9, рис. 6. Нижняя (?) юра. Южная Фергана.

Pagiophyllum Heer, 1881

Pagiophyllum cirinicum (Saporta) Heer

1884. Pachyphyllum cirinicum, Saporta, с. 403, табл. 180, фиг. 3—6; табл. 181, 182. Юра. Португалия.

1881а. Pagiophyllum cirinicum. Heer, с. 11, табл. 10, фиг. 6. Юра. Португалия.

Pagiophyllum astrachanense Doludenko

1966а. Долуденко, с. 252, табл. 2, фиг. 1—8. Юра. Астрахань.

Pagiophyllum curvifolium (Dunker) Kryshtofovich et Prynada

Чаще цитируется как Elatides curvifolia (Dunk.) Nath. (см. выше).

1846. Lycopodites curvifolius. Dunker, с. 20, табл. 7, фиг. 9. Нижний мел. Западная Европа.

1932. Pagiophyllum cf. curvifolium. Криштофович, Принада, с. 372. Нижний мел. С. Константиновка, Приморье.

Pagiophyllum ketovae Orlovskaja

1971. Орловская, с. 75, табл. 8, фиг. 1—4. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pagiophyllum kryshtofovichii Samylina

1963. Самылина, с. 106, табл. 33, фиг. 7. Верхняя юра. Бассейн р. Алдана.

Pagiophyllum kutalense Sixtel

1952. Сикстель, с. 48, табл. 2, фиг. 2; табл. 9, фиг. 1—3; табл. 13, фиг. 2—3; табл. 15, фиг. 3. Средняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.

Pagiophyllum microphyllum Doludenko

1966а. Долуденко, с. 251, табл. 1, фиг. 1—8. Средняя юра. Каменка-Бугская, Западная Украина.

Pagiophyllum orientale Kryshtofovich et Prynada

1932. Криштофович, Принада, с. 372. Нижний мел. П-ов Муравьева-Амурского и п-ов Речной, Приморье.

1962. Принада, с. 230, табл. 18, фиг. 9—10. Юра. Иркутский бассейн.

Pagiophyllum papillatum Orlovskaja

1971. Орловская, с. 73, табл. 6, фиг. 1—3; табл. 7, фиг. 1—6. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1976. Долуденко, Орловская, с. 116, табл. 79, фиг. 1—4; табл. 80, фиг. 1—4. табл. 81, фиг. 1—4; табл. 82, фиг. 1—4. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pagiophyllum peregrinum (Lindley et Hutton) Seward

1833—1837 (1831—1837). Araucarites peregrinus. Lindley, Hutton, табл.88. Средняя юра. Англия.

1904. Pagiophyllum peregrinum. Seward, с. 48, табл. 5. Там же.

1952. Брик, с. 64, табл. 22, фиг. 7—8. Средняя юра. Р. Илек, Западный Казахстан.

1963. Турутанова-Кетова в кн.: Основы палеонтологии, с. 248, табл. 12, фиг. 2; рис. 101. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан. Нижняя юра. Таджикистан.

1966. Генкина, с. 119, табл. 59, фиг. 16–22. Нижняя юра. Иссык-Куль.
1976. Долуденко, Орловская, с. 117, табл. 83, фиг. 1–2; табл. 84, фиг. 1–5. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pagiophyllum cf. peregrinum (Lindley et Hutton) Schenk

1907. Сьюрд, с. 37, табл. 8, фиг. 72. Юра. Туркестан.
1976. Долуденко, Орловская, с. 118, табл. 85, фиг. 1–6. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pagiophyllum peregrinum (Lindley et Hutton) Seward f. kazachstanica Orlovskaja

1971. Орловская, с. 72, табл. 2, фиг. 4–7; табл. 5, фиг. 1–4. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pagiophyllum setosum (Phillips) Seward

Цитируется как Elatides setosa (Phill.) Thomas, Cheirolepis setosa (Phill.) Sew. и Haiburnia setosa (Phill.) Harris.

1875. Brachyphyllum setosum. Phillips, с. 229. Средняя юра. Англия.
1912. Pagiophyllum setosum. Seward, с. 40, табл. 4, фиг. 64. Юра. Афганистан.
1952. Брик, с. 65, табл. 22, фиг. 6. Средняя юра. Р. Илек, Западный Казахстан.
1975. Баранова, Киричкова, Зауер, с. 134, табл. 33, фиг. 1–4; табл. 34, фиг. 3, 4. Средняя юра. Бассейн р. Эмбы, Западный Казахстан.
1976. Долуденко, Орловская, с. 78, табл. 35, фиг. 1; рис. 43, *а*, *б*. Средняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1976. Долуденко, Орловская, с. 118, табл. 86, фиг. 1–3. Верхняя юра (боролсайская свита). Чохай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pagiophyllum cf. setosum (Phillips) Seward

1961. Просвирякова, с. 161, табл. 11, фиг. 6. Верхняя юра. Южная Якутия.
1963а. Генкина, с. 89, табл. 49, фиг. 3. Средняя юра. Орский бассейн, Казахстан.

Pagiophyllum cf. setosum (Phillips) Harris

1967. Делле, с. 108, табл. 25, фиг. 6–11. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

Pagiophyllum triangulare Prynada

1938а. Принада, с. 55, табл. 4, фиг. 7–9. Нижний мел. Бассейн р. Колымы.
1967а. Самылина с. 153, табл. 12, фиг. 1–6; рис. 2. Нижний мел (буоркемюсская свита). Бассейн р. Колымы.
1975. Филиппова, с. 34, табл. 3, фиг. 8. Нижний мел. Северо-Восток СССР.
1976. Самылина, с. 63, табл. 34, фиг. 7–9. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Pagiophyllum williamsonii (Brongniart in Lindley et Hutton) Seward

Цитируется так же как Elatides williamsonii (Brongn.) Sew.

1828. Lycopodites williamsonis, Brongniart, с. 83. Средняя юра. Англия.

1833 (1831—1837). Lycopodites williamsonis. Lindley, Hutton, с. 33, табл. 93. Там же.
1900. Pagiophyllum williamsonii. Seward, с. 271, фиг. 742. Там же.
1934. Криштофович, Принада, с. 80, рис. 45, *2*. Нижняя юра. Абхазия.

Palaeopiceoxylon Krausel, 1949

Palaeopiceoxylon transiens (Schimakura) Krausel
1937. Piceoxylon transiens. Shimakura, с. 24, табл. 6, фиг. 1—9. Мел. Япония.
1949. Palaeopiceoxylon transiens. Krausel, с. 127. Там же.

Palaeopiceoxylon arcticum Shilkina
1967. Шилкина, с. 41, табл. 5, фиг. 1—3. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

Palissya Endlicher, 1847

Palissya braunii Endlicher
1847. Endlicher, с. 306. Верхний триас — нижняя юра. Западная Европа.

Palissya sp.
1961б. Маркович, табл. 24, фиг. 7. Средняя юра. Орский бассейн.
1971. Орловская. с. 104, табл. 11, фиг. 4. Там же.

Paracmopyle Krassilov, 1967

Paracmopyle florinii Krassilov
1967. Красилов, с. 191, табл. 68, фиг. 1—4; табл. 69, фиг. 2—3; рис. 256, *д*. Нижний мел. Приморье.

Parasequoia Krassilov, 1967

Parasequoia cretacea Krassilov
1967. Красилов, с. 213, табл. 77, фиг. 1—4; рис. 30, *а—в* в тексте. Нижний мел. Приморье.

Parataxodium Arnold et Lowther, 1955

Parataxodium wigginsii Arnold et Lowther
1955. Arnold, Lowther, с. 522, фиг. 1—12. Мел. Аляска.

Parataxodium aff. wigginsii Arnold et Lowther
1963. Самылина, с. 112, табл. 27, фиг. 4. Нижний мел. Бассейн р. Алдана.
1975. Филиппова, с. 34, табл. 3, фиг. 5; табл. 4, фиг. 5. Нижний мел. Северо-Восток СССР.

Parataxodium cf. wigginsii Arnold et Lowther
1969. Свешникова, Буданцев, с. 66, табл. 21, фиг. 6—7. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.
1976. Самылина, с. 77, табл. 25, фиг. 2. Нижний мел. Омсукчан. Магаданская обл.

Parataxodium jacutense Vachrameev
1958. Вахрамеев, с. 121, табл. 30, фиг. 4—5. Нижний мел. Приверхоянский прогиб.

Parataxodium sugoijensis Samylina

1976. Самылина, с. 77, табл. 40, фиг. 1, 2. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Phyllocladoxylon Gothan, 1905

Phyllocladoxylon muelleri (Schenk) Gothan

1879–1890. Phyllocladus muelleri. Schimper, Schenk, с. 873, фиг. 424.

1905. Phyllocladoxylon muelleri. Gothan, с. 55.

Phyllocladoxylon eboracense (Holden) Krausel

1913.Paraphyllocladoxylon eboracense. Holden, с. 536, табл. 39, фиг. 7–9. Юра. Англия.

1949. Phyllocladoxylon eboracense. Krausel, с. 128. Там же.

1968. Нематулаев, Худайбердыев, с. 91, табл. 33, фиг. 1–3. Средняя юра. Фергана.

1971. Худайбердыев и др., с. 26, табл. 20, фиг. 1–3. Средняя юра. Шураб, Муян, Фергана.

Phyllocladoxylon ferganense Chudajberdyev

1971. Худайбердыев и др., с. 27, табл. 22, фиг. 1–2. Средняя юра. Шураб-2, Муян, Фергана.

Phyllocladoxylon gothani (Stopes) Schimakura

1915. Podocarpoxylon gothani. Stopes, с. 228, рис. в тексте 65, 66. Нижний мел. Англия.

1937. Phyllocladoxylon gothani. Shimakura, с. 31. Там же.

1962б. Нащекин, с. 163, табл. 28, фиг. 8–10. Верхняя юра. Красноярский край.

1968. Нащекин, с. 86, рис. 19. Верхняя юра – нижний мел. Красноярский край.

Phyllocladoxylon heizyoense Shimakura

1936. Shimakura, с. 281, табл. 16, фиг. 4–6; табл. 17, фиг. 1–5; рис. в тексте 5. Юра. Корейский полуостров.

1968. Нематулаев, Худайбердыев, с. 92, табл. 33, фиг. 4; табл. 34, фиг. 1. Сердняя юра. Фергана.

Phyllocladoxylon sp.

1911. Томас, с. 33, табл. 5, фиг. 5–7. Средняя юра. Каменка, Донбасс.

Piceoxylon Gothan, 1906

Piceoxylon pseudotsugae Gothan in Potonie

1906. Gothan in Potonie, с. 1, фиг. 1. Третичные отложения. США.

Piceoxylon antiqum Gothan

Оригинальное написание эпитета "antiquius"

1910. Gothan, с. 20–23, табл. 4, фиг. 3–6. Нижний мел. Шпицберген.

1962а. Нащекин, с. 292. Нижний мел (кийская свита). Красноярский край.

1968. Нащекин, с. 114, рис. 29. Нижний мел (кийская свита). Средняя Сибирь.

Pinites Lindley et Hutton, 1831

Типовой вид этого рода относят к роду Dadoxylon (Seward, 1917)

Pinites brandlingi Lindley et Hutton

1831—1837. Lindley, Hutton, с. 1, табл. 1. Карбон. Англия.

Pinites jurassicus Goeppert

1845. Goeppert, с. 147, табл. 2, фиг. 1—5. Юра. Литовская ССР.
1855. Mercklin, с. 48, табл. 3, фиг. 6—10. Там же.
1865 (1860—1868). Eichwald, с. 55. Юра. Литва, Украина, Тамбовская обл.

Pinites cf. kobukensis Seward

1912. Сьюорд, с. 15, табл. 3, фиг. 23. Нижний мел. Р. Тырма, Дальний Восток.
1914. Криштофович, с. 115, табл. 7, фиг. 1, 1*а*, 2, 2*а*, 3—5. Нижний мел. Р. Тырма, Дальний Восток.
1915. Криштофович, с. 86, табл. 1, фиг. 9. Верхняя юра — нижний мел. Забайкалье.

Pinites mosquensis Mercklin

1855. Mercklin, с. 51, табл. 10, фиг. 1—5. Юра (?). Московская обл.

Pinites pertinax Goeppert

1845. Goeppert, с. 148, табл. 2—6. Юра. Западные районы европейской части СССР.
1855. Mercklin, с. 47, табл. 8, фиг. 1—5. Юра. Литовская ССР.

Pinites sternbergii (Hisinger) Endlicher

1837. Abietites sternbergii. Hisinger, с. 110, табл. 34, фиг. 3. Юра. Швеция.
1847. Pinites sternbergii. Endlicher, с. 283. Там же.
1865 (1860—1868). Eichwald, с. 56, табл. 3, фиг. 18. Юра. Украина, Оренбургское Приуралье (изображен побег типа Elatocladus).

Pinites undulatus Eichwald

1846. Эйхвальд, с. 514. Мел. Курская, Харьковская, Ульяновская области европейской части СССР.
1865 (1860—1868). Eichwald, с. 53, табл. 3, фиг. 20, *a*, *b*; табл. 4, фиг. 12; табл. 5, 11, *a*—*c*. Мел. Московская, Курская, Калужская, Ульяновская области европейской части СССР.

Pinus L., 1753

Pinus sylvestris L., современный

Pinus elliptica Trautschold

1871. Trautschold, с. 39, табл. 21, фиг. 7. Нижний мел. Клин, Московская обл.

Pinus maakiana Heer

Цитируется как Pityospermum maakianum (Heer) Nathorst

1876b. Heer, с. 76, табл. 14, фиг. 1. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.
1878a. Heer, с. 84, табл. 14, фиг. 1. Там же.

Pinus nordenskioldii Heer

Цитируется как Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nathorst

1876b. Heer, с. 76, табл. 4, фиг. 8, *c*; стр. 117, табл. 22, фиг. 4, *a*, *b*; табл. 27, фиг. 9, *a* ; табл. 28, фиг. 4. Юра. Усть-Балей. Верхняя юра — нижний мел. Верховья р. Амура, Буреинский бассейн.

1878a. Heer, с. 26, табл. 2, фиг. 7—10. Нижний мел. Ленский бассейн.

1880. Heer с. 28, табл. 1, фиг. 8, *b*; табл 9, фиг. 3, *b*. Там же.

1910. Криштофович, с. 16, табл. 3, фиг. 10. Верхний триас. Приморье.

Pinus prodromus Heer

1876a. Heer, с. 45, табл. 7, фиг. 7 *a* ; табл. 10, фиг. 11—14. Нижний мел. Шпицберген.

1880. Heer, с. 27, табл. 7, фиг. 12, *c*. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

Pinus viatkensis Prynada

1928a. Принада, с. 137, табл. 9, фиг. 8. Нижний мел. Вятская обл.

Pinus whitimii Reis

Переведен В.Д. Принадой (1962) в род Pityophyllum

1910. Рейс, с. 58, табл. 5, фиг. 14, 14, *a* . Юра — нижний мел. Р. Витим, Забайкалье.

Pityocladus (Nathorst) Seward, 1919

Установлен Натгорстом как подрод рода Pinites, возведен Сьюордом в ранг рода.

Pityocladus longifolius (Nathorst) Seward

1878a. Taxites longifolius. Nathorst, с. 50. Верхний триас. Швеция.

1919. Pityocladus longifolius. Seward, с. 378, рис. в тексте 775, 776. Там же.

Pityocladus angustifolius Sixtel

1962. Сикстель, с. 383, табл. 38, фиг. 2. Триас (мадытенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Pityocladus dahuricus Prynada

1962. Принада, с. 253, табл. 19, фиг. 2; табл. 25, фиг. 6. Верхняя юра — нижний мел. Р. Газимур, Приаргунье, оз. Жилино, Восточное Забайкалье.

Pityocladus ferganensis Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова в кн.: Основы палеонтологии, с. 276, табл. 18, фиг. 1; рис. 145. Нижняя юра. Фергана.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 195, табл. 19, фиг. 2. Нижняя —верхняя юра. Шураб, Южная Фергана.

Pityocladus kobukensis (Seward) Seward

1911. Pinites kobukensis. Сьюорд, с. 26, табл. 4, фиг. 47—51; табл. 5, фиг. 65. Юра. Джунгария.

1919. Pityocladus kobukensis. Seward, с. 379, рис. 777. Юра. Джунгария.

1960. Сикстель, с. 83, табл. 15, фиг. 2; рис. 14. Верхний триас. Средняя Азия.

1961. Просвирякова, с. 163, табл. 11, фиг. 2. Средняя — верхняя юра. Южная Якутия.

1962. Принада, с. 252, табл. 19, фиг. 1. Средняя юра. Иркутский бассейн.
1971. Худайбердыев и др., с. 21, табл. 17, фиг. 4. Нижняя юра. Сулюкта, Южная Фергана.
1976. Долуденко, Орловская, с. 84, табл. 38, фиг. 2, 3. Нижняя юра. Р. Чокпак, Куркурей, хребет Каратау, Южный Казахстан. Средняя юра. Таскомырсай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pityolepis Nathorst, 1897

Pityolepis tsugaeformis Nathorst

1897a. Nathorst, с. 64, табл. 5, фиг. 42—45. Нижний мел. Шпицберген.
1951. Принада, табл. 17, фиг. 6. Верхняя юра — нижний мел. Р. Шивия, Восточное Забайкалье.
1962. Принада, с. 250, табл. 17, фиг. 6. Там же.

Pityolepis cedriformis Turutanova-Ketova

1958. Турутанова-Кетова, табл. 3, фиг. 2. Сердний (?) триас (пестроцветная свита). Буланаш, Восточный Урал.

Pityolepis crassa Prynada

1962. Принада, с. 251, рис. 66. Верхняя юра — нижний мел. Р. Витим, Забайкалье.

Pityolepis oblonga Samylina

1963. Самылина, с. 109, табл. 31, фиг. 8. Нижний мел. Бассейн р. Алдана.
1963. Василевская, Павлов, табл. 10, фиг. 6. Нижний мел (кюсюрская свита). Ленский бассейн.

Pityolepis sibirica Prosvirjakova

1961. Просвирякова, с. 167, табл. 12, фиг. 8. Средняя юра (дурайская свита). Южная Якутия.

Pityolepis tollii Nathorst

1907b. Nathorst, с. 8, 9, табл. 2, фиг. 1—6; рис. в тексте. Юра. О-в Котельный.

Pityophyllum Nathorst, 1897

Pityophyllum staratschinii (Heer) Nathorst

1874a. Pinus staratschinii. Heer, с. 129, табл. 38, фиг. 6, 7. Нижний мел. Шпицберген.
1897a. Pityophyllum staratschinii. Nathorst, с. 41, табл. 6, фиг. 28—30; с. 68, табл. 5, фиг. 32—36. Нижний мел. Шпицберген.
1935. Принада, с. 229. Юра. Р. Нарын, Средняя Азия.
1959a. Василевская, с. 74, табл. 6, фиг. 2, *б*. Нижний мел. Ленский бассейн.
1963. Василевская, Павлов, табл. 10, фиг. 1; табл. 17, фиг. 3. Нижний мел (кюсюрская и булунская свиты). Ленский бассейн.

Pityophyllum ex gr. staratschinii (Heer) Nathorst

1967б. Самылина, с. 155, табл. 6, фиг. 6, *б*; табл. 8, фиг. 8; табл. 13, фиг. 1, *б*. Нижний мел (ожогинская свита). Бассейн р. Колымы.
1976. Самылина, с. 68, табл. 10, фиг. 4, *б*; табл. 36, фиг. 5; табл. 39, фиг. 2. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Pityophyllum angustifolium (Nathorst) Moeller

1878b. Taxites angustifolius. Nathorst, с. 109, табл. 22, фиг. 7—8. Нижняя юра. Швеция.

1903. Pityophyllum angustifolium. Moller, с. 39, табл. 5, фиг. 22—23. Средняя юра. Борнхольм.

1957. Станиславский, с. 79, рис. 32. Средняя юра. Каменка, Донбасс.

1961. Романова, с. 117, табл. 3, фиг. 4. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1966. Генкина, с. 122, табл. 61, фиг. 1—6. Верхний триас — нижняя юра. Иссык-Куль.

1968. Орловская, табл. 18, фиг. 8—9. Нижняя юра. Алаколь, Восточный Казахстан.

1976. Долуденко, Орловская, с. 83, рис. 50, *а—в*. Нижняя юра. Куркурей, р. Чокпак, хребет Каратау, Южный Казахстан. Средняя юра. Боролдай, Аяк-Сунгинское месторождение. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1976. Долуденко, Орловская, с. 119, табл. 86, фиг. 4. Верхняя юра (боролсайская свита). Чохай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pityophyllum latifolium Turutanova-Ketova

1960. Турутанова-Кетова в кн.: Новые виды, с. 112, табл. 23, фиг. 8—9. Нижняя — средняя юра. Иссык-Куль, хребет Кавак-Тау, Тянь-Шань.

1966. Генкина, с. 120, табл. 60, фиг. 4. Верхний триас — нижняя юра. Иссык-Куль.

1968. Орловская, табл. 18, фиг. 3—7. Нижняя юра. Алаколь, Восточный Казахстан.

Pityophyllum lindstroemii Nathorst

1897a. Nathorst, с. 54, табл. 6, фиг. 27. Нижний мел. Шпицберген.

1905. Krasser, с. 36, табл. 4, фиг. 1—3. Верхняя юра — нижний мел. Западное Забайкалье.

1910. Криштофович, с. 16, табл. 3, фиг. 9. Верхний триас. Приморье.

1914. Криштофович, с. 113, табл. 6, фиг. 9. Верхняя юра — нижний мел. Р. Тырма, Буреинский бассейн.

1915. Криштофович, с. 85, табл. 1, фиг. 6—8. Верхняя юра — нижний мел. Забайкалье.

1924. Хахлов, с. 25, рис. 44, 46—47. Юра. Иркутский бассейн.

1931. Турутанова-Кетова, с. 339. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1936. Турутанова-Кетова, с. 107. Юра. Чокпак, Казахстан.

1961. Просвирякова, с. 164. Средняя — верхняя юра. Южная Якутия.

1963. Самылина, с. 109, табл. 9, фиг. 1, *б*. Нижний мел. Бассейн р. Алдана.

1965. Лебедев Е.Л., с. 122. Верхняя юра. Р. Зея, бассейн р. Амура.

1966. Василевская, с. 70, табл. 7, фиг. 5, *А*. Нижний мел. Ленский бассейн.

1969. Свешникова, Буданцев, с. 66, табл. 14, фиг. 8, *б*; табл. 20, фиг. 7, *б*, 9, *б*; табл. 21, фиг. 1. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

Pityophyllum longifolium (Nathorst) Moeller

1878c. Cycadites (?) longifolius. Nathorst, с. 25, табл. 13, фиг. 1—3. Верхний триас — нижняя юра. Швеция.

1903. Pityophyllum longifolium. Möller, с. 40. Нижняя — средняя юра. Борнхольм.
1907. Сьюорд, с. 36, табл. 7, фиг. 58—61. Юра. Туркестан.
1911. Томас, с. 31, табл. 5, фиг. 3,*a, b, c*. Средняя юра. Украина.
1912. Новопокровский, с. 14, табл. 3, фиг. 2. Нижний мел. Р. Тырма, Буреинский бассейн.
1924. Хахлов, с. 22, фиг. 38—39. Юра. Иркутский бассейн.
1927. Криштофович, с. 563, табл. 31, фиг. 8—10. Юра. Мариинская тайга, р. Золотой Китат.
1931. Хахлов, с. 19, 20, 26, фиг. 25. Средняя юра. Кузбасс.
1932. Нейбург, с. 77, табл. 1, фиг. 12. Верхняя юра. Р. Омолон.
1953б. Сикстель, с. 90. табл. 9, фиг. 3. Средняя юра. Кок-Янгак, Фергана.
1955. Аксарин, с. 176, табл. 17, фиг. 2—3. Средняя юра. Канский бассейн.
1963. Турутанова-Кетова в кн.: Основы палеонтологии, с. 277, табл. 18, фиг. 2. Нижняя юра. Иссык-Куль.
1969. Свешникова, Буданцев, с. 66, табл. 14, фиг. 8, *в*; табл. 15, фиг. 12, *б*; табл. 19, фиг. 10; табл. 20, фиг. 9, *а*; табл. 21, фиг. 2. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.
1971. Худайбердыев и др., с. 22, табл. 17, фиг. 1, *б*. Нижняя юра. Сулюкта, Южная Фергана.

Pityophyllum cf. longifolium (Nathorst) Moeller

1971. Станиславский, с. 111, рис. в тексте 60. Верхний триас (новорайская свита). Донбасс.

Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nathorst

1876а. Pinus nordenskioldii. Heer, с. 45, табл. 9, фиг. 6. Нижний мел. Шпицберген.
1897а. Pityophyllum nordenskioldii. Nathorst, с. 18. Там же.
1912. Сьюорд, с. 14, табл. 2, фиг. 17; табл. 3, фиг. 22. Нижний мел. Р. Тырма, Буреинский бассейн.
1914. Криштофович, с. 111, табл. 6, фиг. 3—8. Нижний мел. Р. Тырма, Буреинский бассейн.
1916. Криштофович, с. 122, табл. 2, фиг. 5. Нижний мел. П-ов Муравьева-Амурского, Приморье.
1924. Хахлов, с. 24, рис. 40—43, 45, 48—49. Юра. Иркутский бассейн.
1931. Принада, с. 39, табл. 3, фиг. 28, *а*; табл. 5, фиг. 43—46. Юра. Бассейн р. Зеравшана, Средняя Азия.
1931. Турутанова-Кетова, с. 338, табл. 4, фиг. 3. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1932. Криштофович, Принада, с. 373. Верхний триас. Р. Амба-бира, Приморье.
1933. Криштофович, табл. 2, фиг. 4—6. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн, р. Зеравшан, Средняя Азия.
1936а. Турутанова-Кетова, с. 106, табл. 2, фиг. 11. Юра. Чокпак, Казахстан.
1944. Турутанова-Кетова, с. 84, табл. 2, фиг. 2, *б*. Нижняя — средняя юра. Мангышлак.
1952. Брик, с. 66, табл. 22, фиг. 2. Средняя юра. Р. Илек, Западный Казахстан.

1952. Сикстель, с. 52. Нижняя — средняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.
1953в. Сикстель, с. 90. Средняя юра. Кок-Ягноб, Фергана.
1954. Голова, с. 56. Средняя юра. Соболевское месторождение, Чулымо-Енисейский бассейн.
1955. Аксарин, с. 176, табл. 17, фиг. 7. Средняя юра. Канский бассейн.
1958. Орловская, с. 138, табл. 4, фиг. 1. Нижняя юра. Майкюбень, Казахстан.
1958. Романова, с. 147, табл. 2, фиг. 2, 3. Нижняя юра. Алакуль, Казахстан.
1960. Сикстель, с. 82. Верхний триас. Средняя Азия.
1961. Просвирякова, с. 163, табл. 11, фиг. 9. Средняя юра — нижний мел. Южная Якутия.
1961. Романова, с. 116, табл. 1, фиг. 5. Нижняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1962. Принада, с. 234, табл. 21, фиг. 6—7; рис. 62. Юра. Иркутский бассейн. Верхняя юра — нижний мел. Холбонские копи, Восточное Забайкалье.
1963. Буракова, с. 213, табл. 66, фиг. 1—3. Нижняя — средняя юра. Туаркыр.
1963. Василевская, Павлов, табл. 29, фиг. 2,*д*; табл. 30, фиг. 1,*в*; табл. 42, фиг. 7—8; табл. 28, фиг. 4. Нижний мел (огонер-юряхская и укинская свиты) . Ленский бассейн.
1963а. Генкина, с. 86, табл. 23, фиг. 3; табл. 37, фиг. 2; табл. 47, фиг. 1, 2. Средняя юра. Орский бассейн, Казахстан.
1963. Турутанова-Кетова, в кн.: Основы палеонтологии, с. 277, табл. 18, фиг. 3. Средняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1965. Лебедев Е.Л., с. 122, табл. 34, фиг. 1. Верхняя юра. Р. Зея, бассейн р. Амура.
1966. Генкина, с. 121, табл. 60, фиг. 5—9; табл. 61, фиг. 7. Верхний триас — нижняя юра. Иссык-Куль.
1966. Просвирякова, с. 109, табл. 23, фиг. 1. Средняя юра. Мангышлак.
1968. Орловская, табл. 18, фиг. 1—2. Нижняя — средняя юра. Майкюбень, Алаколь, Восточный Казахстан.
1969. Киричкова, с. 311, табл. 13, фиг. 3,*б*; табл. 14, фиг. 2. Верхний триас — нижняя юра. Восточный Урал.
1970б. Тесленко, с. 176, табл. 47, фиг. 5—10; табл. 52, фиг. 5. Юра. Западная Сибирь, Кузбасс, Тува.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 196, табл. 19, фиг. 3—4. Нижняя — верхняя юра. Шураб, Кугитанг, Средняя Азия.
1976. Долуденко, Орловская, с. 120, табл. 86, фиг. 5, 6. Верхняя юра (боролсайская свита) . Чохай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pityophyllum ex gr. nordenskioldii (Heer) Nathorst

1958. Вахрамеев, с. 119, табл. 31, фиг. 2; табл. 32, фиг. 4. Верхняя юра — нижний мел. Вилюйская впадина и Приверхоянский прогиб.
1962. Киричкова, Тесленко, с. 229, табл. 38, фиг. 9,*б*. Нижний мел (покурская свита) . Омская обл., Западная Сибирь.
1962. Тесленко, с. 148, табл. 23, фиг. 4; рис. 43. Нижняя — средняя юра. Западная Сибирь.

1966. Василевская, с. 71, табл. 6, фиг. 4, 5,*б*. Нижний мел. Ленский бассейн.
1967. Делле, с. 107, табл. 25, фиг. 12—14. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.
1967а. Самылина, с. 154, табл. 6, фиг. 7,*б*; табл. 10, фиг. 1,*б*. Нижний мел. Бассейн р. Колымы.
1976. Долуденко, Орловская, с. 84, табл. 25, фиг. 5; табл. 38, фиг. 4; рис. 51,*а, б*. Нижняя юра. Р. Чокпак, Куркурей, Акбулак, хребет Каратау, Южный Казахстан. Средняя юра. Боролдай, Таскомырсай, Аяк-Сунгинское месторождение, хребет Каратау, Южный Казахстан.
1976. Самылина, с. 68, табл. 7, фиг. 2,*б*; табл. 34, фиг. 6,*б*. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Pityophyllum solmsii (Seward) Prynada

1895. Pinites solmsii. Seward, с. 196, табл. 18, 19. Нижний мел. Англия.
1962. Pityophyllum solmsii. Принада, с. 236, табл. 17, фиг. 3. Верхняя юра — нижний мел. Реки Аленгуя, Шивия, Восточное Забайкалье; р. Витим, Западное Забайкалье.

Pityospermum Nathorst, 1899

Pityospermum maakinum (Heer) Nathorst

1876b. Pinus maakiana. Heer, с. 76, табл. 14, фиг. 1. Юра. Иркутский бассейн.
1878а. Heer, с. 84, табл. 14, фиг. 1. Юра. Иркутский бассейн.
1899. Pityospermum maakiana. Nathorst, с. 17, табл. 2, фиг. 15. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.
1934. Криштофович, Принада, с. 83, рис. 47. Юра. Иркутский бассейн.
1950. Турутанова-Кетова, с. 311, табл. 3, фиг. 31—32; табл. 6, фиг. 79, 83—84. Средняя — верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1961. Просвирякова, с. 166, табл. 11, фиг. 9. Средняя юра. Южная Якутия.
1962. Принада, с. 242. рис. 63. Юра. Иркутский бассейн.

Pityospermum asymmetricum Bystritsskaja

1974. Быстрицкая, с. 42, табл. 4, фиг. 6—9. Юра. Кузбасс.

Pityospermum attenuatum Vassilevskaja

1963. Василевская, Павлов, табл. 10, фиг. 2—3. Нижний мел (кюсюрская свита). Ленский бассейн.
1966. Василевская, Абрамова, с. 88, табл. 8, фиг. 5. Нижний мел (кюсюрская свита). Ленский бассейн.

Pityospermum brachypterum Samylina

1976. Самылина, с. 69, табл. 37, фиг. 1,*а*, 2, 3; рис. 5,*А*. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Pityospermum cedriforme Brick ex Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 305, табл. 3, фиг. 30; табл. 6, фиг. 85. Нижняя юра. Средняя Азия.

Pityospermum crassialiqerum Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 312, табл. 3, фиг. 35—36; табл. 6, фиг. 7,*в*. Средняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pityospermum cuneatum Nathorst

1897a. Nathorst, с. 63, табл. 5, фиг. 38. Нижний мел. Шпицберген.

1950. Турутанова-Кетова, с. 320, табл. 4, фиг. 42. Средняя — верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1963. Василевская, Павлов, табл. 10, фиг. 5; табл. 17, фиг. 6. Нижний мел (кюсюрская и булунская свиты). Ленский бассейн.

Pityospermum falciforme Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 321, табл. 4, фиг. 41; табл. 6, фиг. 75, 89—91. Средняя — верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pityospermum aff. falciforme Turutanova-Ketova

1971. Маркович, с.105, табл. 11, фиг. 12. Нижняя юра (катынадырская свита). Орский бассейн, Казахстан.

Pityospermum gracile Turutanvoa-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 309, табл. 3, фиг. 27—29; табл. 6, фиг. 1—3, 6—7. Средняя — верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pityospermum issykkulensis Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 307, табл. 4, фиг. 49; табл. 6, фиг. 9. Нижняя юра. Иссык-Куль.

Pityospermum karataviensis Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 317, табл. 4, фиг. 43—44; табл. 7, фиг. 93—95, 98, 101. Средняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pityospermum karataviensis f. magna Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 318, табл. 4, фиг. 45; табл. 7, фиг. 105. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pityospermum latum Brick ex Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 308, табл. 4, фиг. 40; табл. 7, фиг. 99—100. Нижняя — верхняя юра. Средняя Азия, Южный Казахстан.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 196, табл. 20, фиг. 1, 2. Нижняя и средняя юра. Средняя Азия.

Pityospermum lundgrenii (Nathorst) Seward

1878c. Pinus lundgrenii. Nathorst, с. 31, табл. 14, фиг. 13—15. Верхний триас — нижняя юра. Швеция.

1919. Pityospermum lungrenii. Seward, с. 396, рис. 788. Там же.

1950. Турутанова-Кетова, с. 306, табл. 3, фиг. 33; табл. 6, фиг. 81—82. Нижняя юра. Средняя Азия. Средняя — верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pityospermum magnum Prosvirjakova

1966. Просвирякова, с. 109, табл. 23, фиг. 2, 3—6, 10. Средняя юра (сарыдиирменская свита). Мангышлак.

Pityospermum marginatum Prosvirjakova

1966. Просвирякова, с. 110, табл. 23, фиг. 7—9. Средняя юра (джарсуйская свита). Мангышлак.

Pityospermum nansenii Nathorst

1899. Nathorst, с. 18, табл. 11, фиг. 12—13; рис. 4. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

1950. Турутанова-Кетова, с. 316, табл. 4, фиг. 38; табл. 6, фиг. 86. Средняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1976. Самылина, с. 69, табл. 37, фиг. 8, 9. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Pityospermum cf. nansenii Nathorst

1962. Принада, с. 245, рис. 64, *Д*. Нижний мел. Р. Турга, Восточное Забайкалье.
1963. Василевская, Павлов, табл. 17, фиг. 4; табл. 43, фиг. 6. Нижний мел (булунская и укинская свиты). Ленский бассейн.
1971. Маркович, с. 105, табл. 11, фиг. 11. Нижняя юра (катынадырская свита). Орский бассейн, Казахстан.

Pityospermum obliquum Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 322, табл. 4, фиг. 39; фиг. 7, фиг. 102—103. Средняя — верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1961а. Маркович, табл. 16, фиг. 7. Нижняя юра (катынадырская свита). Орский бассейн, Казахстан (тот же вид изображен как P. cf. nanseni в работе Маркович, 1971).

Pityospermum pachypteron Prynada

1962. Принада, с. 248, рис. 65. Верхняя юра — нижний мел. Букачачинские копи, Восточное Забайкалье.

Pityospermum cf. pachypteron Prynada

1976. Самылина, с. 70, табл. 37, фиг. 6. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Pityospermum parallelimarginale Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 314, табл. 3, фиг. 34; табл. 7, фиг. 92, 104. Средняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pityospermum parvulum Prynada

1962. Принада, с. 245, рис. 64, *г*. Верхняя юра — нижний мел. Р. Шивия, Восточное Забайкалье.

Pityospermum parvum Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 313, табл. 4, фиг. 46; табл. 7, фиг. 96—97. Средняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pityospermum pinisimulans Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 319, табл. 4, фиг. 47—48; табл. 7, фиг. 87—88. Средняя — верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Pityospermum prynadae Krassilov

1967. Красилов, с. 199, табл. 73, фиг. 6—8. Нижний мел. Приморье.

Pityospermum (?) scythicum Stanislavsky

1971. Станиславский, с. 113, табл. 15, фиг. 7—8. рис. 61, *Д, Е*. Верхний триас (новорайская свита). Донбасс.
1976. Станиславский,. с. 82, табл. 12, фиг. 4—8; табл. 50, фиг. 5—7. Верхний триас (протопивская свита). Гаражовка, Донбасс.

Pityospermum stenopteron Prynada

1951. Принада, табл. 14, фиг. 8. Верхняя юра — нижний мел. Р. Шивия, Восточное Забайкалье.

1962. Принада, с. 246, табл. 14, фиг. 8; рис. 64, *А*. Там же.

Pityospermum turgense Prynada

1951. Принада, табл. 14, фиг. 6. Нижний мел. Р. Турга, Восточное Забайкалье.

1962. Принада, с. 243, табл. 14, фиг. 6; рис. 64, *В*. Там же.

Pityospermum umbonatum Samylina

1976. Самылина, с. 70, табл. 37, фиг. 4, 5; рис. 5, *Б*. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Pityospermum witimii (Reis) Prynada

1910. Pinus witimii. Рейс, с. 58, табл. 5, фиг. 14, 14, *а*. Верхняя юра — нижний мел. Р. Витим, Забайкалье.

1962. Pityospermum witimii. Принада, с. 247. Там же.

Pityospermum cf. yukonense Bell

1976. Самылина, с. 71, табл. 37, фиг. 7. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Pityostrobus (Nathorst) Dutt, 1916

Pityostrobus macrocephalus (Lindley et Hutton) Dutt

1835 (1831—1837). Zamia macrocephala. Lindley, Hutton, с. 127, табл. 125. Эоцен. Англия.

1916. Pityostrobus macrocephalus. Dutt, с. 529, табл. 15. Там же.

Pityostrobus (Picea) angustissima Samylina

1963. Самылина, с. 108, табл. 30, фиг. 3, *б*; табл. 36, фиг. 7. Нижний мел. Бассейн р. Алдана, Якутия.

Pityostrobus burejensis Kryshtofovich

1960. Криштофович, с. 1147, рис. 1. Верхняя юра — нижний мел. Буреинский бассейн.

Pityostrobus gusevii Vassilevskaja

1957. Василевская, с. 89, табл. 1, фиг. 5—6. Нижний мел. Ленский бассейн.

1963. Василевская, Павлов, табл. 28, фиг. 5. Нижний мел (огонер-юряхская свита). Ленский бассейн.

Pityostrobus jacutensis Prosvirjakova

1961. Просвирякова, с. 168, табл. 12, фиг. 7. Средняя юра (дурайская свита). Южная Якутия.

Pityostrobus khudobiniae Turutanova-Ketova

1963. Турутанова-Кетова в кн.: Основы палеонтологии, с. 278, табл. 18, фиг. 5. Нижняя юра. Киргизия.

Pityostrobus piceoides Samylina

1976. Самылина, с. 72, табл. 37, фиг. 15—17. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Podocarpus L'Heritier, 1807

Podocarpus elongata (Ait.) L'Heritier, современный

Podocarpus (Stachycarpus) harrisii Krassilov

19656. Красилов, с. 1450, табл. 1, фиг. 1–5; табл. 2, фиг. 1–3. Нижний мел. Приморье.
1967. Красилов, с. 185, табл. 64, фиг. 1–4; табл. 65, фиг. 1–4; табл. 66, фиг. 6; рис. 24, *а–в*. Там же.

Podocarpus (?) nicanicus Krassilov

1967. Красилов, с. 188, табл. 67, фиг. 1–7; табл. 69, фиг. 1; рис. 25, *а, б*. Нижний мел. Приморье.

Podocarpus (Nageia) sujfunensis Krassilov

19656. Красилов, с. 1451, табл. 3, фиг. 1–3. Нижний мел. Приморье.
1967. Красилов, с. 187, табл. 66, фиг. 1–5; рис. 24, *г–е*. Там же.

Podocarpophyllum Gomolitzky, 1962

Podocarpophyllum singulare Gomolitzky

1962. Гомолицкий, с. 1030, табл. 1, фиг. 1–4; табл. 2, фиг. 1–5. Средняя юра. Ангрен, Фергана.

Podocarpophyllum dorofeevii Gomolitzky

1963. Гомолицкий, с. 1432, табл. 1, фиг. 1–3. Средняя юра. Гиссарский хребет.

Podocarpoxylon Gothan, 1904

Podocarpoxylon juniperoides Gothan in Gagel

1904. Gagel, с. 272. Плейстоцен. ГДР.

Podocarpoxylon blevillense (Lingier) Eckhold

Очевидно, опечатка в названии рода: нужно Protopodocarpoxylon, см. ниже.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 199. Верхняя юра. Южная Фергана.

Podocarpoxylon sciadopityoides Shilkina

1967. Шилкина, с. 43, табл. 8, фиг. 1, 4–6. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

Podocarpoxylon schurabense Chudajberdyev

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 199, табл. 23, фиг. 2–4. Средняя – верхняя юра. Южная Фергана.

Podozamites (Brongniart) C.F.W. Braun, 1843

Podozamites distans (Presl) Braun

1838 (1820–1838). Zamites distans. Presl in Sternberg, с. 196, табл. 41, фиг. 1. Верхний триас – нижняя юра. Бавария.
1843. Podozamites distans. Braun in Münster, с. 28. Там же.
1932. Криштофович, Принада, с. 371. Верхний триас. Р. Амба-бира, Приморье.
19336. Криштофович, Принада, с. 28, табл. 2, фиг. 4. Верхний триас. Восточный Урал.
1958. Турутанова-Кетова, табл. 3, фиг. 3. Верхний триас (буланашская свита). Восточный Урал.
1959. Владимирович, с. 463, табл. 3, фиг. 3, 4. Верхний триас – нижняя юра. Восточный Урал.
1960. Сикстель, с. 81, табл. 14, фиг. 2. Верхний триас. Р. Ягноб. Средняя Азия.

1962б. Киричкова, табл. 4, фиг. 2, *б, г, е, ж, з, и*. Нижняя юра. Челябинский бассейн.

1962. Сикстель, с. 388, табл. 35, фиг. 4–5; рис. 39. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

1966. Генкина, с. 109, табл. 54, фиг. 2–9. Верхний триас. Иссык-Куль.

1969. Киричкова, с. 308, табл. 13, фиг. 1. Верхний триас – нижняя юра. Восточный Урал.

Podozamites angustifolius (Eichwald) Heer

1865 (1860–1868). Zamites angustifolius. Eichwald, с. 39, табл. 2, фиг. 7. Юра. Прикаспий.

1876b. Podozamites angustifolius. Heer, с. 45, табл. 26, фиг. 11. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1878а. Heer, с. 22, табл. 5, фиг. 11, *b*, 12. Нижний мел. Ленский бассейн.

1933б. Криштофович, Принада, с. 27, табл. 4, фиг. 1. Там же.

1934. Криштофович, Принада, с. 77; рис. 40, *1*. Верхний триас. Челябинский бассейн.

1935. Принада, с. 226, рис. 8. Юра. Р. Нарын, Средняя Азия.

1944. Турутанова-Кетова, с. 86, табл. 4, фиг. 4. Нижняя – средняя юра. Мангышлак.

1948. Голова, с. 105, табл. 8, фиг. 67–68. Средняя юра. Чулымо-Енисейский бассейн.

1958. Вахрамеев, с. 122, табл. 31, фиг. 3–5; табл. 32, фиг. 5. Нижний мел. Вилюйская впадина и Приверхоянский прогиб.

1958. Романова, с. 146, табл. 1, фиг. 5; табл. 2, фиг. 4. Нижняя юра. Алакуль, Казахстан.

1958. Турутанова-Кетова, табл. 1, фиг. 8. Верхний триас (буланашская свита). Восточный Урал.

1959а. Василевская, с. 70, табл. 5, фиг. 4–5; табл. 7, фиг. 2–3; табл. 8, фиг. 1, 2, 3, *а*, 4. Нижний мел. Ленский бассейн.

1961. Ковальчук, табл. 58, фиг. 8–9. Верхний триас. Кендерлыкская впадина, Казахстан.

1962. Тесленко, с. 143, табл. 23, фиг. 1. Нижняя юра (макаровская свита). Р. Чулым, Красноярский край.

1962б. Киричкова, табл. 3, фиг. 8. Нижняя юра. Челябинский бассейн, Восточный Урал.

1963. Василевская, Павлов, табл. 8, фиг. 10; табл. 17, фиг. 1, *а*; табл. 41, фиг. 1. Нижний мел (кюсюрская, булунская и укинская свиты). Ленский бассейн.

1963. Самылина, с. 106, табл. 34, фиг. 1–2. Нижний мел. Бассейн р. Алдана.

1966. Генкина, с. 110, табл. 55, фиг. 1–6. Верхний триас – нижняя юра. Иссык-Куль.

1966. Просвирякова, с. 105, табл. 32, фиг. 1. Средняя юра. Мангышлак.

1967а. Самылина, с. 151, табл. 8, фиг. 4; табл. 11, фиг. 10, 11. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Бассейн р. Колымы.

1968. Орловская, табл. 16, фиг. 4. Нижняя юра. Восточный Казахстан.

1969. Киричкова, с. 309, табл. 12, фиг. 8; табл. 13, фиг. 2; табл. 15, фиг. 1, 2. Верхний триас – нижняя юра. Восточный Урал.

1970б. Тесленко, с. 168, табл. 40, фиг. 1–4, 6; табл. 52, фиг. 1. Средняя юра. Чулымо-Енисейский бассейн, Тува.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 192, табл. 18, фиг. 1. Верхний триас. Шураб, Южная Фергана.
1971. Худайбердыев и др., с. 19, табл. 16, фиг. 1–3. Нижняя юра. Сулюкта, Южная Фергана.
1976. Долуденко, Орловская, с. 120, табл. 86, фиг. 7. Верхняя юра (карабастауская свита). Аулие, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Podozamites cf. angustifolius (Eichwald) Heer

1969. Свешников, Буданцев, с. 62, табл. 14, фиг. 11; табл. 16, фиг. 1. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

Podozamites ex gr. corbinensis Bell

1976. Самылина, с. 60, табл. 32, фиг. 5–8. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Podozamites cuspiformis Heer

1878b. Heer, с. 46, табл. 4, фиг. 11, 12. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

Podozamites dongurmensis Genkina

1970. Алиев, Генкина, с. 30, табл. 12, фиг. 1–5. Верхний триас — нижняя юра. Тянь-Шань.

Podozamites eichwaldii Schimper

1865 (1860–1868). Zamites lanceolatus. Eichwald (non Lindley et Hutton), с. 40, табл. 3, фиг. 1. Юра. Оренбургское Приуралье.
1872 (1869–1874). Podozamites eichwaldii. Schimper, с. 160.
1938а. Принада, с. 52, рис. 19. Нижний мел. Бассейн р. Колымы.
1954. Голова, с. 59, табл. 2, фиг. 24, 25,*а*, 26. Средняя юра. Соболевское месторождение, Чулымо-Енисейский бассейн.
1962. Киричкова, Тесленко, с. 228, табл. 38, фиг. 1, 9,*а*; рис. 56. Нижний мел (покурская свита). Омская обл, Западная Сибирь.
1963. Василевская, Павлов, табл. 16, фиг. 5; табл. 25, фиг. 5; табл. 27, фиг. 4; табл. 28, фиг. 3; табл. 30, фиг. 1,*а*; табл. 42, фиг. 2. Нижний мел (булунская, огонер-юряхская и укинская свиты). Ленский бассейн.
1965. Лебедев Е.Л., с. 123, табл. 34, фиг. 2. Верхняя юра — нижний мел. Р. Зея, бассейн р. Амура.
1967а. Самылина, с. 151, табл. 8, фиг. 9; табл. 12, фиг. 11–13. Нижний мел. Бассейн р. Колымы.

Podozamites aff. eichwaldii Schimper

1966б. Долуденко, с. 134, табл. 13, фиг. 1–7. Верхняя юра — нижний мел. Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Podozamites cf. eichwaldii Schimper

1958. Вахрамеев, с. 125. Нижний мел. Приверхоянский прогиб.

Podozamites ex gr. eichwaldii Schimper

1976. Самылина, с. 61, табл. 33, фиг. 1–3. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Podozamites eichwaldii Schimper var. minor Prynada

1962. Принада, с. 214, рис. 56. Верхняя юра — нижний мел. Гусиное озеро, Западное Забайкалье.

Podozamites eichwaldii Schimper var. major Prynada

1962. Принада, с. 216, табл. 14, фиг. 2. Верхняя юра — нижний мел. Тарбагатайский район, Западное Забайкалье.

Podozamites ensiformis Heer

Переведен М.П. Долуденко в род Pseudotorellia (Ginkgoales)

1876b. Heer, с. 46, табл. 3, фиг. 8–10; табл. 20, фиг. 6,*b*; табл. 28, фиг. 5*a*. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн. Верхняя юра. Верховья р. Амура.

1878a. Heer, с. 6, табл. 2, фиг. 5, 6. Верхняя юра. Верховья р. Амура.

Podozamites glehnianus Heer

1876b. Heer, с. 111, табл. 26, фиг. 1. Верхняя юра. Верховья р. Амура.

Podozamites gracilis Vassilevskaja

1957. Василевская, с. 86, табл. 1, фиг. 1. Нижний мел. Ленский бассейн.

1963. Василевская, Павлов, табл. 27, фиг. 3. Нижний мел (огонер-юряхская свита) . Ленский бассейн.

1967a. Самылина, с. 152, табл. 8, фиг. 3. Нижний мел (ожогинская свита) . Бассейн р. Колымы.

Podozamites gramineus Heer

1876b. Heer, с. 46, табл. 4, фиг. 13. Юра. Усть-Балей. Иркутский бассейн.

1878a. Heer, с. 21, табл. 6, фиг. 1–3. Нижний мел. Ленский бассейн.

1880. Heer, с. 10, табл. 1, фиг. 8,*a*. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1905. Krasser, с. 31. Верхняя юра — нижний мел. Забайкалье.

1932. Криштофович, Принада, с. 371. Верхний триас. Район с. Раздольного, Приморье.

1958. Вахрамеев, с. 124, табл. 32, фиг. 2. Нижний мел. Приверхоянский прогиб.

1959a. Василевская, с. 71, табл. 8, фиг. 3,*б*. Нижний мел. Ленский бассейн.

1962. Принада, с. 213, рис. 55. Нижний мел. Р. Турга, Восточное Забайкалье.

1963. Василевская, Павлов, табл. 16, фиг. 3; табл. 42, фиг. 1. Нижний мел (булунская и укинская свиты) . Ленский бассейн.

1966. Просвирякова, с. 106, табл. 22, фиг. 2, 3. Средняя юра. Мангышлак.

Podozamites aff. gramineus Heer

1963a. Генкина, с. 86, табл. 46, фиг. 4. Средняя юра. Орский бассейн, Казахстан.

Podozamites guttiformis (Migatscheva) Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 138, табл. 84, фиг. 1, 2; табл. 85; рис. 59. Верхний триас (протопивская свита) . Николаевка, Донбасс.

Podozamites isfarensis Brick

1941. Брик, с. 32, табл. 9, фиг. 1–2. Верхний триас. Камыш-Баши, Южная Фергана.

1970. Алиев, Генкина, с. 30, табл. 11, фиг. 5–7; табл. 12, фиг. 1, 2. Верхний триас. Тянь-Шань.

Podozamites isfarensis Brick var. rotundata Brick

1941. Брик, с. 33, табл. 9, фиг. 3. Верхний триас. Камыш-Баши, Южная Фергана.

Podozamites issykkulensis Genkina

1966. Генкина, с. 112, табл. 56, фиг. 6—19; табл. 57, фиг. 1. Верхний триас — нижняя юра. Иссык-Куль.

Podozamites kamenkensis Stanislavsky

1957. Станиславский, с. 81, табл. 17, фиг. 2; табл. 18, фиг. 1—2. Средняя юра. Каменка, Донбасс.

1963. Буракова, с. 212, табл. 65, фиг. 1. Средняя юра. Туаркыр.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 192, табл. 18, фиг. 3. Нижняя юра. Кугитанг.

Podozamites lanceolatus (Lindley et Hutton) Schimper

1831—1837. Zamia lanceolata. Lindley, Hutton, с. 194, фиг. 194. Средняя юра. Англия.

1870 (1869—1874). Podozamites lanceolatus. Schimper, с. 160. Там же.

1876b. Heer, с. 45, 106, табл. 1, фиг. 3,*a*; табл. 22, фиг. 1, *c*, 4, *a—c*; табл. 26, фиг. 2—10; табл. 27, фиг. 1—8. Юра. Иркутский бассейн. Верхняя юра — нижний мел. Верховья р. Амура, Буреинский бассейн.

1878a. Heer, с. 20, табл. 5, фиг. 1—11. Нижний мел. Ленский бассейн.

1907. Сьюорд, с. 1439, табл. 1, фиг. 14; табл. 8, фиг. 68. Юра. Кавказ, Туркестан.

1910. Криштофович, с. 17, табл. 2, фиг. 7; табл. 3, фиг. 11—14. Верхний триас. Приморье.

1911. Томас, с. 45, табл. 7, фиг. 8. Средняя юра. Каменка, Донбасс.

1912. Сьюорд, с. 14, табл. 2, фиг. 15. Нижний мел. Р. Тырма, Буреинский бассейн.

1914. Криштофович, с. 116. Нижний мел. Р. Тырма, Буреинский бассейн.

1916. Криштофович, с. 115. Нижний мел. П-ов Муравьева-Амурского, Приморье.

1918. Залесский, табл. 38, фиг. 3, 4, 7; табл. 48, фиг. 6. Юра (?). Кузбасс, Афонино.

1926. Криштофович, с. 602. Нижняя юра. Северный Кавказ.

1927. Криштофович, с. 564, табл. 31, фиг. 11, 12. Юра. Мариинская тайга.

1930. Турутанова-Кетова, с. 158, табл. 6, рис. 47. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1931. Принада, с. 41, табл. 3, фиг. 31; табл. 6, фиг. 60—63; рис. 5, *А*, *Б*. Юра. Бассейн р. Зеравшана, Средняя Азия.

1931. Турутанова-Кетова, с. 343, табл. 5, фиг. 7. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1931. Хахлов, с. 29, рис. 40, 50. Средняя юра. Кузбасс.

1932. Криштофович, Принада, с. 371. Верхний триас. Р. Амба-Бира, Приморье. Нижний мел. Район Уссурийска, бухта Бражникова, Приморье.

1932. Нейбург, с. 77, табл. 1, фиг. 13—17. Верхняя юра. Р. Омолон.

1933. Криштофович, табл. 2, фиг. 2. Нижний мел. П-ов Речной, Приморье.

1933б. Криштофович, Принада, с. 29. Верхний триас. Челябинский бассейн, Восточный Урал.

1933б. Принада, с. 25, табл. 3, фиг. 46. Средняя юра. Тквартели, Грузия.
1935. Принада, с. 226, рис. 9, 10. Юра. Р. Нарын, Средняя Азия.
1936а. Нейбург, с. 150, табл. 4, фиг. 3–4. Средняя юра. Тува.
1936а. Турутанова-Кетова, с. 107, табл. 2, фиг. 16. Нижняя юра. Чокпак, Казахстан.
1952. Сикстель, с. 51, табл. 12, фиг. 1–2. Нижняя — средняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.
1953в. Сикстель, с. 89, табл. 9, фиг. 4; табл. 10, фиг. 3. Средняя юра. Кок-Янгак, Фергана.
1954. Голова, с. 58, табл. 2, фиг. 22–23. Средняя юра. Соболевское месторождение, Чулымо-Енисейский бассейн.
1957. Станиславский, с. 81, табл. 18, фиг. 6–11. Средняя юра. Каменка, Донбасс.
1958. Вахрамеев, с. 124, табл. 32, фиг. 6. Нижний мел. Приверхоянский прогиб.
1959а. Василевская, с. 71, табл. 6, фиг. 4. Нижний мел. Ленский бассейн.
1961. Просвирякова, с. 162, табл. 11, фиг. 1. Верхняя юра (нерюнгринская свита). Южная Якутия.
1962б. Киричкова, табл. 4, фиг. 2, *в, д*. Нижняя юра. Челябинский бассейн, Восточный Урал.
1962. Принада, с. 212, табл. 14, фиг. 3; рис. 54. Юра. Иркутский бассейн.
1962. Тесленко, с. 145, табл. 23, фиг. 7–8. Нижняя — средняя юра. Красноярский край, Кузбасс.
1963. Буракова, с. 211, табл. 63, фиг. 3, 5, 6; табл. 64, фиг. 1–2. Нижняя — средняя юра. Туаркыр.
1963. Василевская, Павлов, табл. 17, фиг. 2. Нижний мел (булунская свита). Ленский бассейн.
1965. Лебедев Е.Л., с. 124, табл. 31, фиг. 1. Верхняя юра. Р. Зея, бассейн р. Амура.
1966. Генкина, с. 111, табл. 55, фиг. 7. Нижняя юра. Иссык-Куль.
1966. Просвирякова, с. 104, табл. 31, фиг. 3. Средняя юра. Мангышлак.
1968. Орловская, табл. 16, фиг. 5–10. Нижняя — средняя юра. Восточный Казахстан.
1969. Киричкова, с. 307, табл. 13, фиг. 3–5; табл. 14, фиг. 1, 3; табл. 15, фиг. 3. Верхний триас — нижняя юра. Восточный Урал.
1970б. Тесленко, с. 169, табл. 44, фиг. 9; табл. 45, фиг. 5; табл. 46, фиг. 5–6. Средняя юра. Западно-Сибирская низменность, Кузбасс, Тува.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 192, табл. 18, фиг. 2. Верхний триас, юра. Шураб, Кугитанг, Средняя Азия.
1976. Долуденко, Орловская, с. 79, табл. 35, фиг. 2–4. Нижняя юра. Акбулак, хребет Каратау, Южный Казахстан. Средняя юра. Боролдай, Таскомырсай, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Podozamites cf. lanceolatus (Lindley et Hutton) Schimper

1938б. Принада, с. 392. Средняя юра. Эмбинский район.
1967. Делле, с. 106, табл. 23, фиг. 10–13. Средняя юра. Тквартели, Закавказье.

Podozamites ex gr. lanceolatus (Lindley et Hutton) Schimper

1967. Красилов, с. 174, табл. 59, фиг. 1–4; рис. 22, *в–д*. Нижний мел. Приморье.

1971. Станиславский, с. 96, рис. в тексте 50. Верхний триас (новоромашкинская свита). Донбасс.

1976. Самылина, с. 62, табл. 32, фиг. 3, 4. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Podozamites lanceolatus (Lindley et Hutton) Scimper var. angustifolius (Eichwald) Turutanova-Ketova

1930. Турутанова-Кетова, с. 159, табл. 6, фиг. 46. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Podozamites lanceolatus (Lindley et Hutton) Schimper f. distans (Presl) Heer

1876b. Heer, с. 109, табл. 26, фиг. 7; табл. 22, фиг. 3, 4. Верхняя юра. Верховья р. Амура.

Podozamites lanceolatus (Lindley et Hutton) Schimper f. (var.) eichwaldii (Schimper) Heer

1876b. Heer, с. 109, табл. 23, фиг. 4; табл. 26, фиг. 2, 3, 9; табл. 27, фиг. 1. Верхняя юра – нижний мел. Верховья р. Амура, Буреинский бассейн.

1878a. Heer, с. 20, табл. 5, фиг. 6–7. Нижний мел. Ленский бассейн.

1879. Schmalhausen, с. 29, табл. 5, фиг. 3, 4, 5, *с*. Юра. Кузбасс.

1905. Krasser, с. 30, табл. 4, фиг. 4–5. Верхняя юра – нижний мел. Восточное Забайкалье.

1910. Криштофович, с. 18. Верхний триас. Приморье.

1915. Криштофович, с. 82, табл. 1, фиг. 2–4. Верхняя юра – нижний мел. Забайкалье.

Podozamites lanceolatus (Lindley et Hutton) Schimper f. (var.) genuinus Heer

1876b. Heer, с. 108, табл. 26, фиг. 10. Верхняя юра. Верховья р. Амура.

1878a. Heer, с. 20, табл. 5, фиг. 3. Нижний мел. Ленский бассейн.

1912. Новопокровский, с. 12, табл. 3, фиг. 1, *в*. Нижний мел. Р. Тырма, бассейн р. Амура.

1933б. Принада, с. 26, табл. 4; фиг. 6. Средняя юра. Ткварчели, Грузия.

1934. Криштофович, Принада, с. 77, рис. 40, *2*. Верхняя юра. Верховья р. Амура.

1955. Аксарин, с. 177, табл. 24, фиг. 4–5. Средняя юра. Канский бассейн.

Podozamites lanceolatus (Lindley et Hutton) Schimper f. (var.) intermedius Heer

1876b. Heer, с. 108, табл. 26, фиг. 4, 8, *a*; табл. 22, фиг. 1, *c*, 4, *d*. Верхняя юра. Верховья р. Амура, Буреинский бассейн.

1878a. Heer, с. 20, табл. 5, фиг. 10. Нижний мел. Ленский бассейн.

1910. Криштофович, с. 18. Верхний триас. Приморье.

1944. Турутанова-Кетова, с. 85, табл. 1, фиг. 4. Средняя юра. Мангышлак.

1966. Просвирякова, с. 105, табл. 21, фиг. 4, 5. Средняя юра. Мангышлак.

Podozamites lanceolatus (Lindley et Hutton) Schimper
cf. f. intermedius Heer

1954. Голова, с. 60, табл. 2, фиг. 27. Средняя юра. Чулымо-Енисейский бассейн.

Podozamites lanceolatus (Lindley et Hutton) Schimper
f. (var.) latifolius (Schenk) Heer

1867. Zamites distans latifolius. Schenk, табл. 36, фиг. 10. Верхний триас — нижняя юра. Бавария.

1876b. Podozamites lanceolatus f. latifolius. Heer, с. 109, табл. 26, фиг. 5, 6, 8, *b*, *c*. Верхняя юра. Верховья р. Амура.

1905. Krasser, с. 30, табл. 4, фиг. 7. Верхняя юра — нижний мел. Восточное Забайкалье.

1907. Сьюорд, с. 39, табл. 5, фиг. 5. Юра. Фергана.

1910. Криштофович, с. 18, табл. 2, фиг. 7; табл. 3, фиг. 11. Верхний триас. Приморье.

1933. Криштофович, табл. 2, фиг. 3. Нижний мел. С. Фаддеевка, Приморье.

1954. Голова, с. 60. Средняя юра. Соболевское месторождение, Чулымо-Енисейский бассейн.

Podozamites lanceolatus (Lindley et Hutton) Schimper
f. (var.) longifolius (Schenk) Sze

1867. Zamites distans var. longifolia. Schenk, с. 162, табл. 37, фиг. 1. Верхний триас — нижняя юра. Бавария.

1931. Podozamites lanceolatus f. longifolia. Sze, с. 27. Юра. Китай.

1962. Принада, с. 211, табл. 14, фиг. 1; рис. 53. Юра. Иркутский бассейн.

1966. Генкина, с. 111, табл. 55, фиг. 8; табл. 56; фиг. 1—5. Верхний триас — нижняя юра. Иссык-Куль.

Podozamites lanceolatus (Lindley et Hutton) Schimper
f. minor (Schenk) Heer

1867. Zamites distans minor. Schenk, с. 162, табл. 35, фиг. 10; табл. 36, фиг. 4. Верхний триас — нижняя юра. Бавария.

1876b. Podozamites lanceolatus f. minor. Heer, с. 110, табл. 27, фиг. 5,*a*, *b*, 6—8. Верхняя юра. Верховья р. Амура.

1878. Heer, с. 20, фиг. 8,*a*. Нижний мел. Ленский бассейн.

1931. Турутанова-Кетова, с. 344, табл. 5, фиг. 2. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Podozamites lanceolatus (Lindley et Hutton) Schimper
f. ovalis Heer

1876b. Heer, с. 109, табл. 27, фиг. 2. Верхняя юра. Бассейн р. Амура.

1955. Аксарин, с. 177, табл. 24, фиг. 6. Средняя юра. Канский бассейн.

1969. Киричкова, с. 308, табл. 12, фиг. 5. Нижняя юра. Челябинский бассейн.

Podozamites lanceolatus (Lindley et Hutton) Schimper
var. typicus Turutanova-Ketova

1944. Турутанова-Кетова, с. 84, табл. 4, фиг. 1. Нижняя — средняя юра. Мангышлак.

Podozamites latifolius (Schenk) Kryshtofovich et Prynada

1867. Zamites distans latifolius. Schenk, табл. 36, фиг. 10. Верхний триас – нижняя юра. Бавария.

1934. Криштофович, Принада, с. 76, рис. 40, *3*. Юра – нижний мел. Дальний Восток.

1963. Василевская, Павлов, табл. 30, фиг. 1, *б*; табл. 29, фиг. 2, *в*. Нижний мел (огонер – юряхская свита). Ленский бассейн.

1965. Лебедев Е.Л., с. 124, табл. 32, фиг. 1–3; табл. 33, фиг. 1; табл. 34, фиг. 5. Верхняя юра. Р. Зея, бассейн р. Амура.

1966. Василевская, с. 66, табл. 6, фиг. 1–2. Нижний мел. Жиганский район, Ленский бассейн.

1967а. Самылина, с. 152, табл. 12, фиг. 10; табл. 13, фиг. 1, *а*. Нижний мел (ожогинская свита). Бассейн р. Колымы.

Podozamites latissimus Stanislavsky

1971. Станиславский, с. 94, табл. 18, фиг. 5; табл. 26, фиг. 3; табл. 29, фиг. 2; табл. 30; рис. 49. Верхний триас (новорайская свита). Донбасс.

Podozamites magnalis Zalessky

1936. Zalessky, с. 246, фиг. 3, 4. Верхний триас. Суракай, Башкирия.

Podozamites minutus Turutanova-Ketova

1968а. Турутанова-Кетова, с. 82, табл. 23, фиг. 5. Верхний триас. Хребет Кавак-Тау, Тянь-Шань.

Podozamites ex gr. minor (Prynada) Samylina

1976. Самылина, с. 62, табл. 33, фиг. 4, 5. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Podozamites mucronatus Harris

1935. Harris, с. 96, табл. 16, фиг. 4, 5, 7, 10–12, 14; рис. 39. Верхний триас – нижняя юра. Гренландия.

19626. Киричкова, табл. 4, фиг. 3. Верхний триас. Челябинский бассейн.

1969. Киричкова, с. 316, табл. 17, фиг. 5–6. Верхний триас. Челябинский бассейн.

Podozamites olenekites Vassilevskaja

1957. Василевская, с. 87, табл. 1, фиг. 2. Нижний мел. Ленский бассейн.

1963. Василевская, Павлов, табл. 30, фиг. 3. Нижний мел (огонер-юряхская свита). Ленский бассейн.

Podozamites ovalifolius Vassilevskaja

1957. Василевская, с. 88, табл. 1, фиг. 3–4; рис. в тексте. Нижний мел. Ленский бассейн.

1963. Василевская, Павлов, табл. 16, фиг. 6–7. Нижний мел (булунская свита). Ленский бассейн.

Podozamites plicatus Heer

1876 a. Heer, с. 36, табл. 7, фиг. 6, *b*, 7, *b*. Нижний мел. Шпицберген.

1876b. Heer, с. 111, табл. 27, фиг. 9, *b*, 10, 11, *b*. Верхняя юра. Верховья р. Амура.

Podozamites pulchellus Heer

Переведен Н.Д. Василевской (1959) в род Pseudotorellia (Ginkgoales)

1876a. Heer, с. 38, табл. 9, фиг. 10—14. Нижний мел. Шпицберген.

Podozamites reinii Geyler

1877. Geyler, с. 229, табл. 33, фиг. 4,*a*; табл. 34, фиг. 1, 2, 3,*b*, 4, 5,*a*. Верхняя юра — нижний мел. Япония.

1955. Лебедев И.В., с. 180, табл. 23, фиг. 9. Средняя юра. Кузбасс.

1962. Киричкова, Тесленко, с. 227, табл. 38, фиг. 2; рис. 55. Нижний мел (покурская свита). Омская обл. Западная Сибирь.

1963. Василевская, Павлов, табл. 28, фиг. 2. Нижний мел (огонер-юряхская свита). Ленский бассейн.

1966. Василевская, с. 68, табл. 6, фиг. 3—4. Нижний мел. Ленский бассейн.

Podozamites cf. reinii Geyler

1907. Сьюорд, с. 15, табл. 1, фиг. 15. Юра. Бассейн р. Гализги, Кавказ.

1954. Голова, с. 61, табл. 2, фиг. 28. Средняя юра. Соболевское месторождение, Чулымо-Енисейский бассейн.

1965. Лебедев Е.Л., с. 126, табл. 34, фиг. 6. Верхняя юра. Р. Зея, бассейн р. Амура.

Podozamites ex gr. reinii Geyler

1976. Самылина, с. 63, табл. 34, фиг. 5. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Podozamites reversolanceolatus Prynada

1935. Принада, стр. 227, табл. 1, фиг. 10—12. Юра. Р. Нарын, Средняя Азия.

Podozamites rigidus Stanislavsky

1971. Станиславский, с. 95, табл. 28, фиг. 4—5; табл. 29, фиг. 3; табл. 31, фиг. 1—3; табл. 32, фиг. 1; табл. 33, фиг. 1—2; табл. 34, фиг. 1; табл. 35, фиг. 3. Верхний триас (новорайская свита). Донбасс.

Podozamites schenkii Heer

1876b. Heer, с. 45. Верхний триас — нижняя юра. Бавария (как nomen novum вместо Zamites angustifolius Schenk, 1967).

1966. Генкина, с. 108, табл. 53, фиг. 2—10; табл. 53, фиг. 1. Верхний триас — нижняя юра. Иссык-Куль.

Podozamites ex gr. schenkii Heer

1971. Станиславский, с. 97, табл. 18, фиг. 1—3; табл. 29, фиг. 3; табл. 32, фиг. 2; табл. 33, фиг. 3; рис. в тексте 51. Верхний триас (новорайская свита). Донбасс.

Podozamites striatus Velenovsky

1963. Василевская, Павлов, табл. 29, фиг. 1, 2,*г*. Нижний мел (огонер-юряхская свита). Ленский бассейн.

Podozamites subreinii Kryshtofovich et Prynada

1932. Криштофович, Принада, с. 371, табл. 2, фиг. 6. Нижний мел. П-ов Муравьева-Амурского, Приморье.

Podozamites tenuinervis Heer

1882a. Heer, с. 44, табл. 16, фиг. 9. Верхний мел. Гренландия.

1967. Красилов, с. 176, табл. 58, фиг. 5. Нижний мел. Приморье.

Podozamites toretziensis Stanislavsky (Cycadocarpidium toretziensis Stanislavsky)

1976. Станиславский, с. 136, табл. 82, фиг. 1—4; табл. 83; табл. 84, фиг. 3, 4; рис. 58. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка, Донбасс.

Podozamites trichocladus Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 69, табл. 37; табл. 38; табл. 39; табл. 40; табл. 41, фиг. 3; рис. 29, 30, 31. Верхний триас (протопивская свита). Гаражовка, Донбасс.

Podozamites (?) tricostatus Heer

1880. Heer, с. 10, табл. 1, фиг. 7. Юра. Усть-Балей. Иркутский бассейн.

Podozamites tuhajkulensis Prynada ex Sixtel

1960. Сикстель, с. 80, табл. 14, фиг. 1. Верхний триас. Р. Ягноб, Средняя Азия.

Podozamites tuvensis Teslenko

1965. Тесленко, Могучева, с. 86, фиг. 3, 4, 6, 7. Средняя юра. Р. Енисей, Тува.

1970б. Тесленко, с. 170, табл. 46, фиг. 1—4. Средняя юра (эрбекская свита). Р. Енисей, Тува.

Podozamites aff. tuvensis Teslenko

1976. Самылина, с. 63, табл. 33, фиг. 6, 7. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Podozamites uralensis Prynada ex Kiritchkova

1962б. Киричкова, табл. 4, фиг. 2,*а*. Нижняя юра. Челябинский бассейн.

Podozamites zwetkovii Schwedov

1958. Шведов, с. 67, табл. 3, фиг. 4—7. Верхний триас. Восточный Таймыр.

Protocedroxylon Gothan, 1910

Protocedroxylon araucarioides Gothan

1910. Gothan, с. 27, табл. 5, фиг. 3—5, 7; табл. 6, фиг. 1. Нижний мел. Шпицберген.

Protocedroxylon dibneri (Shilkina) Shilkina et Chudajberdyev

1967. Araucariopitys dibneri. Шилкина, с. 36, табл. 1, фиг. 1—3. Верхний триас. Земля Франца-Иосифа.

1971. Protocedroxylon dibneri. Шилкина, Худайбердыев, с. 120, табл. 73, фиг. 1—3. Там же.

Protocedroxylon gregussii (Shilkina) Shilkina et Chudajberdyev

1967. Araucariopitys gregussii. Шилкина, с. 37, табл. 1, фиг. 4—5; табл. 2; табл. 4, фиг. 4—7; табл. 5, фиг. 4—7. Верхний триас — нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

1971. Protocedroxylon gregussii. Шилкина, Худайбердыев, с. 120, табл. 74, фиг. 1—4. Там же.
1971. Худайбердыев и др., с. 32, табл. 74, фиг. 1—4. Верхняя юра. Шураб-2, Южная Фергана.

Protocedroxylon haraulachica (Shilkina) Vogellehner

1958. Araucariopitys haraulachica. Шилкина, с. 1316, табл. 1, фиг. 1—6. Нижняя юра. Хараулахские горы, Верхоянский хребет.
1965. Protocedroxylon haraulachica. Vogellehner. Там же.
1971. Шилкина, Худайбердыев, с. 120, табл. 72, фиг. 1—6. Нижняя юра. Хараулахские горы, Верхоянский хребет.

Protocedroxylon polyporosum (Shilkina) Shilkina et Chudajberdyev

1967. Araucariopitys polyporosum. Шилкина, с. 38, табл. 7, фиг. 5—6; табл. 8, фиг. 2—3. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.
1971. Protocedroxylon polyporosum. Шилкина, Худайбердыев, с. 123. Там же.

Protocedroxylon scoticum (Holden) Seward

1915. Metacedroxylon scoticum. Holden, с. 206, табл. 3, фиг. 1—4. Юра. Шотландия.
1919. Protocedroxylon scoticum. Seward, с. 237. Там же.
1971. Худайбердыев и др., с. 33, табл. 23, фиг. 1—4. Средняя — верхняя юра. Шураб-2, Южная Фергана.

Protocedroxylon transiens (Gothan) Eckhold

1907. Cedroxylon transiens. Gothan, с. 26, табл. 1; рис. в тексте 14—15. Нижний мел. Шпицберген.
1922. Protocedroxylon transiens. Eckhold, с. 491. Там же.
1971. Худайбердыев и др., с. 33. Средняя юра. Шураб, Южная Фергана.

Protopodocarpoxylon Eckhold, 1922

Protopodocarpoxylon blevillense (Lignier) Eckhold

1907. Cedroxylon blevillense. Lignier, с. 267, табл. 18, фиг. 15—17; табл. 21, фиг. 66; табл. 22, фиг. 72. Нижний мел. Франция.
1922. Protopodocarpoxylon blevillense. Eckhold, с. 491. Нижний мел. Франция.
1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 199. Верхняя юра. Шураб, Южная Фергана.
1971. Худайбердыев и др., с. 30. Юра. Южная Фергана.

Protopodocarpoxylon schurabense Chudajberdyev

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 199, табл. 23, фиг. 2—4. Средняя — верхняя юра. Шураб, Южная Фергана.
1971. Худайбердыев и др., с. 29, табл. 21, фиг. 1—4. Средняя — верхняя юра. Шураб-2, Южная Фергана.

Pseudolarix Gordon, 1858

Pseudolarix amabilis (Nelson) Gordon, современный
Pseudolarix dorofeevii Samylina

1963. Самылина, с. 108, табл. 37, фиг. 2—4. Нижний мел. Бассейн р. Алдана.
1967. Красилов, с. 198, табл. 73, фиг. 2—4. Нижний мел. Приморье.

Pseudovoltzia Florin, 1927

Pseudovoltzia liebeana (Geinitz) Florin

1880. Votzia liebeana. Geinitz, c. 26, табл. 5, фиг. 1, 2, 5–7. Верхняя пермь. Саксония.

1927. Pseudovoltzia liebeana. Florin, c. 5. Там же.

1960. Сикстель, с. 96, табл. 19, фиг. 5. Нижний триас (кызылнуринская свита). Фергана.

1962. Сикстель, с. 380, табл. 36, фиг. 7–10. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Retinosporites Holden, 1915

Retinosporites indica (Oldham) Holden

1863. Taxodites indicus. Oldham, Morris, табл. 33, фиг. 5, 6. Юра. Раджмахал, Индия.

1915. Retinosporites indica. Holden, c. 221, табл. 11, фиг. 1, 4, 9. Триас. Индия.

Retinosporites (?) sibirica Neuburg

1936б. Нейбург, с. 489, табл. 4, фиг. 1–11. Нижний триас. Кузбасс.

Rhipidiocladus Prynada, 1956

Rhipidiocladus flabellata Prynada

1956. Принада в кн.: Материалы по палеонтологии, с. 250, табл. 42, фиг. 3–9. Нижний мел. Р. Бурея, бассейн р. Амура.

1959а. Василевская, с. 75, табл. 10, фиг. 2–4. Нижний мел. Ленский бассейн.

Samaropsis Goeppert, 1864

Samaropsis ulmiformis Goeppert

1864–1865. Goeppert, c. 177, табл. 28, фиг. 10, 11. Пермь. Богемия.

Samaropsis anzhingolica Batjaeva

1974б. Батяева, с. 97, табл. 1, фиг. 1–3. Юра. Кузбасс.

Samaropsis caudata Heer

1876b. Heer, c. 81, табл. 14, фиг. 8–14. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

Samaropsis inflata Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 142, табл. 81, фиг. 1–5; рис. 55, *D*. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка, Донбасс.

Samaropsis kajensis Heer

1876b. Heer, c. 81, табл. 14, фиг. 37. Юра. Иркутский бассейн.

Samaropsis kazachstanica Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 289, табл. 1, фиг. 9, 11. Средняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Samaropsis oppositeemarginata Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 285, табл. 1, фиг. 10, 12; табл. 8, фиг. 108–109. Нижняя юра. Средняя Азия.

Samaropsis orbicularis Prynada ex Stanislavsky

1971. Станиславский, с. 119, рис. в тексте 65. Верхний триас (новорайская свита). Донбасс.

1976. Станиславский, с. 92, табл. 11, фиг. 4. Верхний триас (протопивская свита). Гаражовка, Донбасс.

Samaropsis parvula Heer

1876b. Heer, с. 82, табл. 14, фиг. 21—23. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1879. Schmalhausen, с. 42, табл. 1, фиг. 6 c; табл. 4, фиг. 3,*b*, 9; табл. 27, фиг. 4 (?). Средняя юра. Кузбасс.

1881. Шмальгаузен, с. 156, табл. 1, фиг. 6,*c*; табл. 4, фиг. 3,*в*, 9. Юра. Кузбасс.

1905. Krasser, с. 39, табл. 4, фиг, 8. Верхняя юра — нижний мел. Западное Забайкалье.

Samaropsis plicata Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 284, табл. 1, фиг. 8, 15—17; табл. 8, фиг. 107. Нижняя юра. Средняя Азия, Казахстан.

Samaropsis plicatiformis Teslenko

1965. Тесленко, Могучева, с. 87, фиг. 8, *а,б,в*. Средняя юра. Р. Енисей, Тува.

1970б. Тесленко, с. 187, табл. 49, фиг. 11, 12; табл. 52, фиг. 7. Средняя юра. Р. Енисей, Тува.

Samaropsis problematica Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, стр. 287, табл. 1, фиг. 13—14. Средняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Samaropsis prynadae Stanislavsky

1971. Станиславский, с. 121, табл. 7, фиг. 4, 5; рис. в тексте 66,*Н*. Верхний триас (новорайская свита). Донбасс.

1976. Станиславский, с. 93, табл. 17, фиг. 3; рис. 42,*С*. Верхний триас (протопивская свита). Гаражовка, Донбасс.

Samaropsis pumila Stanislavsky

1971. Станиславский, с. 123, табл. 15, фиг. 6; рис. в тексте 67,*А—С*. Верхний триас (новорайская свита). Донбасс.

Samaropsis reniformis Gomolitzky

1971. Худайбердыев и др., с. 23, табл. 19, фиг. 1—2. Нижняя юра. Сулюкта, Южная Фергана.

Samaropsis rostrata Schmalhausen

1879. Schmalhausen, с. 92, табл. 16, фиг. 23. Юра. Нижняя Тунгуска, Красноярский край.

Samaropsis rotundata Heer

1876b. Heer, с. 80, табл. 14, фиг. 15—20; 27,*b*; 28,*b*; 30,*b*; табл. 15, фиг. 1,*c*; табл. 13, фиг. 4,*b*. Юра. Иркутский бассейн.

1878a. Heer, с. 88, табл. 13, фиг. 46; табл. 14, фиг. 15—20, 27,*b*, 28,*b*, 30,*b*; табл. 14, фиг. 1,*c*. Юра. Иркутский бассейн.

1880. Heer, с. 24, табл. 7, фиг. 3. Нижняя — средняя юра. Иркутский бассейн.

1931. Турутанова-Кетова, с. 347, рис. 5. Нижняя юра. Иссык-Куль.
1934. Криштофович, Принада, с. 83, рис. 47—2. Юра. Иркутский бассейн, Иссык-Куль.
1936а. Турутанова-Кетова, с. 108. Нижняя юра. Чокпак, Казахстан.
1944. Турутанова-Кетова, с. 87, рис. в тексте 9. Нижняя — средняя юра. Мангышлак.
1950. Турутанова-Кетова, с. 282, табл. 8, фиг. 106. Нижняя — средняя юра. Средняя Азия, Южный Казахстан.
1951. Принада, табл. 15, фиг. 13,*а*. Юра. Иркутский бассейн.
1959а. Василевская, с. 79, табл. 12, фиг. 1—2. Нижний мел (чончургасская свита). Ленский бассейн.
1962. Принада, с. 268, табл. 15, фиг. 13,*а*; рис. 71. Юра. Иркутский бассейн.
1962. Тесленко, с. 155, рис. 49. Нижняя юра (макаровская свита). Красноярский край.
1963. Василевская, Павлов, табл. 9, фиг. 5—6; табл. 43, фиг. 15. Нижний мел (кюсюрская и укинская свиты). Ленский бассейн.
1963. Самылина, с. 114, табл. 26, фиг. 6. Нижний мел. Бассейн р. Алдана.
1966. Генкина, с. 125, табл. 61, фиг. 25—27. Нижняя юра. Иссык-Куль.
1970б. Тесленко, с. 186, табл. 52, фиг. 8. Нижняя и средняя юра. Чулымо-Енисейский бассейн, Тува.
1971. Сикстель, Савицкая и др., 196. Верхнии триас — нижняя юра. Шураб, Кугитанг, Средняя Азия.

Samaropsis ubagana Vladimirovich

1960. Владимирович в кн.: Новые виды. . ., с. 126, табл. 24, фиг. 13. Верхний триас — нижняя юра. Убаганский бассейн, Северо-Западный Казахстан.

Samaropsis zignoana Nathorst

1878b. Nathorst, с. 110, табл. 25, фиг. 10—14. Триас. Швеция.
1970. Алиев, Генкина, с. 32, табл. 12, фиг. 12. Верхний триас (туракавская свита). Хребет Кавак-Тау, Тянь-Шань.
1976. Станиславский, с. 142, табл. 86, фиг. 3—5; рис. 60,*А,В*. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка, Донбасс.

Sciadopitys Siebold et Zuccarini

Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold et Zuccarini (современный)
Sciadopitys sibirica Samylina

1963. Самылина, стр. 111, табл. 36, фиг. 1—5. Нижний мел. Ленский бассейн.

Sciadopitys sp.

1961. Самылина, с. 642, табл. 6, фиг. 4—6. Нижний мел. С. Липовцы, Приморье.
1967а. Самылина, с. 155, табл. 12, фиг. 8. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Бассейн р. Колымы.

Sciadopitytes Goeppert et Menge, 1883

Sciadopitytes linealis Goeppert et Menge,

1883. Goeppert, Menge, с. 36, табл. 13, фиг. 117—119. Миоцен. ГДР.

Sciadopitytes annularioides Kryshtofovich et Prynada

1932. Криштофович, Принада , с. 372. Нижний мел. С. Константиновка, Приморье.

Sciadopitytes ukrainensis Doludenko

1963б. Долуденко, с. 123, табл. 12, фиг. 1—13. Средняя юра. Западная Украина.

Schidolepidium Heer, 1880

Schidolepidium gracile Heer

1880. Heer, с. 27, табл. 8, фиг. 6—12. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1950. Турутанова-Кетова, с. 340, табл. 3, фиг. 3; табл. 5, фиг. 4. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1951. Принада, табл. 18, фиг. 13, 14. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1962. Принада, с. 279, табл. 18, фиг. 13, 14. Юра. Иркутский бассейн.

1962. Лебедев И.В., с. 198, табл. 4, фиг. 7. Средняя юра. Кузбасс.

Schizolepis C.F.W. Braun, 1847

Schizolepis liasokeuperinus C.F.W. Braun

1847. Braun, с. 86. Нижняя юра. Бамберг, ФРГ.

Изображен А. Шенком под названием Schizolepis braunii Schenk

Schizolepis abaschevii Chachlov

1931. Хахлов, с. 9, фиг. 8, 11. Средняя юра. Кузбасс.

1948. Голова, с. 109, табл. 9, фиг. 80—84. Средняя юра. Чулымо-Енисейский бассейн.

Schizolepis aceroides Samylina et Teslenko

1962. Тесленко, с. 146, табл. 23, фиг. 3; рис. 41. Средняя юра (итатская свита). Красноярский край.

1970б. Тесленко, с. 167, табл. 44, фиг. 5; табл. 50, фиг. 17. Средняя юра (итатская свита). Чулымо-Енисейский бассейн.

Schizolepis acuminata Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 331, табл. 5, фиг. 57, 62, 68. Нижняя юра. Средняя Азия.

1961б. Маркович, табл. 16, фиг. 8. Нижняя юра. Орский бассейн, Казахстан (позднее переопределена как S. antiqua, см. ниже).

Schizolepis aldanensis Samylina

1963. Самылина, с. 110, табл. 29, фиг. 5—6; табл. 35, фиг. 6; табл. 37, фиг. 5,*а*. Нижний мел. Бассейн р. Алдана, Якутия.

Schizolepis (?) angusta Prynada

1951. Принада, табл. 18, фиг. 17. Юра. Иркутский бассейн.

1962. Принада, с. 265, табл. 18, фиг. 17; рис. 70. Юра. Иркутский бассейн.

Schizolepis angustipeduncularis Vassilevskaja

1957. Василевская, с. 91, табл. 1, фиг. 7—8; рис. 2 в тексте. Нижний мел. Пенский бассейн.

1963. Василевская, Павлов, табл. 18, фиг. 3—4. Нижний мел (булунская свита). Пенский бассейн.

Schizolepis anisoloba Markovitch

1971. Маркович, с. 102, табл. 11, фиг. 8—9. Нижняя юра. Орский бассейн, Казахстан.

Schizolepis antiqua (Heer) Prynada

1876b. Ephedrites antiquus. Heer, с. 82, табл. 14, фиг. 24—25. Юра. Иркутский бассейн.

1878a. Heer, с. 90, табл. 14, фиг. 24, 25. Юра. Иркутский бассейн.

1951. Schizolepis antiqua. Принада, табл. 18, фиг. 15—16. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1962. Принада, с. 264, табл. 18, фиг. 15—16; рис. 69. Там же.

1971. Маркович, с. 101, табл. 11, фиг. 10. Нижняя юра. Орский бассейн, Казахстан.

Schizolepis cf. antiqua (Heer) Prynada

1971. Маркович, с. 101, табл. 11, фиг. 10. Нижняя юра (катынадырская свита). Орь-Илекский район, Западный Казахстан.

Schizolepis braunii Schenk

1867. Schenk, с. 179, табл. 44, фиг. 1—8. Верхний триас — нижняя юра. Бавария.

1934. Криштофович, Принада, с. 84, рис. 51, *4,5*. Верхняя юра — нижний мел. Забайкалье.

Schizolepis brunsianae Sixtel

1962. Сикстель, с. 384, табл. 40, фиг. 11. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Schizolepis cretacea Samylina

1967a. Самылина, с. 155, табл. 14, фиг. 7—9. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Бассейн р. Колымы.

1976. Самылина, с. 73, табл. 37, фиг. 12—14,*a*. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Schizolepis dahurica Prynada

1951. Принада, табл. 14, фиг. 4. Верхняя юра — нижний мел. Р. Шивия, Восточное Забайкалье.

1962. Принада, с. 263, табл. 14, фиг. 4. Там же.

Schizolepis divergens Prynada

1962. Принада, с. 257, рис. 67. Юра. Иркутский бассейн.

Schizolepis elegans Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 333, табл. 5, фиг. 55, 64. Нижняя юра. Средняя Азия.

1961. Просвирякова, с. 167, табл. 12, фиг. 13. Нижний мел. Южная Якутия.

Schizolepis ferganensis Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 337, табл. 5, фиг. 59—60; табл. 8, фиг. 114. Нижняя юра. Средняя Азия.

Schizolepis follinii Nathorst

1878 (1878—1890). Романовский, с. 164, табл. 25, фиг. 1. Юра. Средняя Азия.

1951. Принада, табл. 18, фиг. 1. Юра. Иркутский бассейн.
1962. Принада, с. 258, табл. 18, фиг. 1; рис. 68. Юра. Иркутский бассейн.

Schizolepis furcata Samylina

1963. Самылина, с. 110, табл. 35, фиг. 7. Нижний мел. Бассейн р. Алдана.

Schizolepis gigantea Tschastnikova

1952. Частникова, с. 7, рис. 4. Нижняя юра. Южная Фергана.

Schizolepis glumacea Kiritchkova

1966. Киричкова, с. 122, табл. 2, фиг. 7–8. Нижняя юра. Р. Вилюй, Восточная Сибирь.

Schizolepis inaequalis Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 330, табл. 5, фиг. 66. Нижняя юра. Средняя юра. Средняя Азия.

Schizolepis insignis Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 336, табл. 5, фиг. 53. Нижняя юра. Средняя Азия.

Schizolepis kryshtofovichii Prynada

1951. Принада, табл. 21, фиг. 2, 3. Верхняя юра — нижний мел. Восточное Забайкалье.
1962. Принада, с. 260, табл. 21, фиг. 2–3. Там же.

Schizolepis latifolia Chachlov

1924. Хахлов, с. 27, фиг. 55. Юра. Иркутский бассейн.
1934. Криштофович, Принада, с. 84, рис. 51, *3*. Юра. Иркутский бассейн.
1962. Принада, с. 262. Там же.

Schizolepis? ex gr. latifolia Chachlov

1952. Сикстель, с. 54, табл. 2, фиг. 6. Средняя юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.

Schizolepis levis Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 334, табл. 8, фиг. 113. Нижняя юра. Средняя Азия.

Schizolepis liassica Kiritchkova

1966. Киричкова, с. 121, табл. 2, фиг. 4–6. Нижняя юра. Р. Вилюй, Восточная Сибирь.

Schizolepis minor Markovich

1961а. Маркович, табл. 16, фиг. 9. Нижняя юра. Орский бассейн, Казахстан.
1971. Маркович, с. 103, табл. 11, фиг. 5–6. Нижняя юра. Орский бассейн, Казахстан.

Schizolepis moelleri Seward

1907. Сьюорд, с. 39, табл. 7, фиг. 64–66. Юра. Фергана.
1911. Томас, с. 33, табл. 5, фиг. 4. Средняя юра. Каменка, Донбасс.
1915. Криштофович, с. 87, табл. 1, фиг. 10–12. Верхняя юра — нижний мел. Забайкалье.
1918. Криштофович, с. 87, табл. 1, фиг. 10–12. Средняя юра. Забайкалье.
1924. Хахлов, с. 26, рис. 50, 53. Юра. Иркутский бассейн.

1931. Турутанова-Кетова, с. 341. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1931. Хахлов, с. 9, фиг. 5. Средняя юра. Кузбасс.
1934. Криштофович, Принада, с. 84, рис. 51, *1, 2*. Нижняя юра. Средняя Азия.
1950. Турутанова-Кетова, с. 326, табл. 5, фиг. 56, 67. Нижняя юра. Средняя Азия.
1957. Станиславский, с. 79, табл. 18, фиг. 13; рис. 33. Средняя юра. Каменка, Донбасс.
1961а. Маркович, табл. 16, фиг. 10, 11. Нижняя юра. Орский бассейн, Казахстан.
1961. Просвирякова, с. 167, табл. 12, фиг. 6. Средняя — верхняя юра. Южная Якутия.
1962. Принада, с. 260. Юра. Иркутский бассейн.
1962. Тесленко, с. 147, табл. 22, фиг. 2; рис. 42. Средняя юра (итатская свита). Красноярский край.
1970б. Тесленко, с. 167, табл. 44, фиг. 4; табл. 50, фиг. 18. Средняя юра (итатская свита). Красноярск, Чулымо-Енисейский бассейн.
1971. Маркович, с. 100, табл. 11, фиг. 7. Нижняя юра. Орский бассейн. Казахстан.

Schizolepis cf. moelleri Seward

1944. Турутанова-Кетова, с. 84, табл. 2, рис. 2,*а*. Нижняя — средняя юра. Мангышлак.

Schizolepis nasledowii Chachlov

1924. Хахлов, с. 27, фиг. 54. Юра. Иркутский бассейн.

Schizolepis paradoxa Prynada

1951. Принада, табл. 14, фиг. 5. Верхняя юра — нижний мел. Восточное Забайкалье.
1962. Принада, с. 262, табл. 14, фиг. 5. Там же.

Schizolepis pedicelata Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 328, табл. 5, фиг. 54, 65. Нижняя юра. Средняя Азия.
1963а. Генкина, с. 92, табл. 51, фиг. 3—4. Средняя юра. Орский бассейн, Казахстан.

Schizolepis promethei Kryshtofovich

1917. Криштофович, с. 365. Юра. Северный Кавказ.

Schizolepis prynadae Samylina

1963. Самылина, с. 110, табл. 37, фиг. 6—7. Нижний мел. Бассейн р. Алдана.

Schizolepis retroflexa Nathorst

1897а. Nathorst, с. 60, табл. 3, фиг. 31, 32; табл. 60, фиг. 11, 12. Нижний мел. Шпицберген.
1955. Аксарин, с. 176, табл. 17, фиг. 6. Средняя юра. Канский бассейн.

Sequoia Endlicher, 1847

Sequoia sempervirens (Lambert) Endlicher, современная

Sequoia ambigua Heer

1874. Heer, с. 78, фиг. 1—2. Нижний мел. Гренландия.

1962. Киричкова, Тесленко, с. 226, табл. 38, фиг. 7. Нижний мел (покурская свита). Омская обл. Западная Сибирь.

1966. Киричкова, Сластенов, с. 164, табл. 4, фиг. 12, 13. Нижний мел (эксеняхская свита). Р. Леписке, Ленский бассейн.

Sequoia cf. concinna Heer

1976. Самылина, с. 73, табл. 35, фиг. 4. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Sequoia fastigiata (Sternberg) Heer

1821 (1820—1838). Caulerpites fastigiatus. Sternberg, с. 23. Мел. Западная Европа.

1869. Sequoia fastigiata. Heer, с. 11, табл. 2, фиг. 10—13. Там же.

1952. Вахрамеев, с. 173, табл. 10, фиг. 10. Нижний мел. Западный Казахстан.

1970а. Самсонов, с. 48, табл. 1, фиг. 7. Нижний мел. Итемир-Джаракудская впадина, Средняя Азия.

Sequoia heterophylla Velenovsky

1885. Velenovsky, с. 22, табл. 12, фиг. 12; табл. 13, фиг. 2—4, 6—9. Верхний мел. Чехословакия.

1952. Вахрамеев, с. 172, табл. 10, фиг. 1—2. Нижний мел. Кульден-Темир, Западный Казахстан.

Sequoia cf. minuta Sveshnikova

1976. Самылина, с. 74, табл. 43, фиг. 16—18. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Sequoia sibirica Chachlov

1924. Хахлов, с. 22, рис. 35—36. Юра. Иркутский бассейн.

Sequoia smittiana Heer

см. также Elatocladus smittianus (Heer) Seward

1874. Heer, с. 82, табл. 12, фиг. 10,*b*; табл. 7, фиг. 3, 4; табл. 20, фиг. 5,*b*, 7,*c*; табл. 23, фиг. 1—6. Нижний мел. Гренландия.

1924. Хахлов, с. 20, фиг. 33 (Elatocladus).

Sequoia sp.

1967а. Самылина, с. 156, табл. 8, фиг. 12—13. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Бассейн р. Колымы.

1976. Самылина, с. 74, табл. 35, фиг. 5, 6. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Stachyotaxus Nathorst, 1886

Stachyotaxus septentrionalis Nathorst

1886. Nathorst, с. 98, табл. 22, фиг. 20—23, 33, 34; табл. 23, фиг. 6; табл. 25, фиг. 9. Верхний триас — нижняя юра. Швеция.

Stachyotaxus elegans Nathorst

1908. Nathorst, стр. 11, табл. 2, фиг. 1–6, 10, 11, 19, 20, 23, 24. Верхний триас – нижняя юра. Швеция.

1966. Генкина, стр. 120, табл. 60, фиг. 1–3. Верхний триас. Иссык-Куль.

Stachyotaxus cf. elegans Nathorst

1963а. Генкина, с. 87, табл. 47, фиг. 3–5. Средняя юра. Орский бассейн, Казахстан.

Stachyotaxus gracilis Srebrodolskaja

1960. Сребродольская, с. 114, табл. 1, фиг. 12, 13. Верхний триас. Приморье.

Stachyotaxus sp.

1960. Сикстель, с. 85, табл. 14, фиг. 3–4. Верхний триас. Гиссарский хребет.

1963. Турутанова-Кетова в кн.: Основы палеонтологии, с. 252, табл. 13, фиг. 4. Нижняя юра. Зауран, Средняя Азия.

Stenomischus Harris, 1935

Stenomischus athrous Harris

1935. Harris, с. 144, табл. 24, фиг. 1, 2, 9–10. Нижняя юра. Гренландия.

Stenomischus cf. athrous Harris

1971. Худайбердыев и др., с. 24, табл. 19, фиг. 3–4. Нижняя юра. Сулюкта, Южная Фергана.

Stenomischus adnicanicus Koczyrkevicz

1974. Кочиркевич, с. 117, табл. 11, фиг. 1–11. Нижний мел (чемчукинская свита). Буреинский бассейн.

Stenomischus balejensis Prynada

1951. Принада, табл. 13, фиг. 6. Юра. Иркутский бассейн.

1962. Принада, с. 276, табл. 13, фиг. 6; рис. 73. Средняя юра. Иркутский бассейн.

Stenomischus magnus Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 303, табл. 5, фиг. 50–52; табл. 8, фиг. 117. Средняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1955. Аксарин, с. 177, табл. 23, фиг. 5. Средняя юра. Канский бассейн.

Stenomischus sp.

1957. Станиславский, с. 83, рис. 36. Средняя – верхняя юра. Донбасс, Днепровско-Донецкая впадина.

1971. Красилов, табл. 2, фиг. 1–2. Верхняя юра. Буреинский бассейн.

Storgaardia Harris, 1935

Storgaardia spectabilis Harris

1935. Harris, с. 58, табл. 11, 12, 16. Верхний триас. Гренландия.

Stogaardia hissarensis Gomolitzky

1963. Гомолицкий, с. 1435, табл. 3, фиг. 1–6. Средняя юра. Гиссарский хребет.

Storgaardia spectabilis Harris

1976. Долуденко, Орловская, с. 82, табл. 38, фиг. 1; рис. 48, 49, *a—g*. Нижняя юра. Куркуреу, правый берег р. Айтватчаян, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Swedenborgia Nathorst, 1876

Swedenborgia cryptomerioides Nathorst

1876. Nathorst, с. 66, табл. 16, фиг. 6—12. Верхний триас — нижняя юра. Швеция.

1952. Брик, с. 48, табл. 9, фиг. 8. Верхний триас (курашасайская свита). Р. Илек, Западный Казахстан.

Swedenborgia longiloba Stanislavsky

1971. Станиславский, с. 109, табл. 8, фиг. 4; рис. 59, *А—М* в тексте. Верхний триас (новорайская свита). Донбасс.

Swedenborgia major Harris

1935. Harris, с. 104, табл. 18, фиг. 19—20; табл. 19, фиг. 10—12. Верхний триас — нижняя юра. Гренландия.

1971. Худайбердыев и др., с. 19, табл. 14, фиг. 1—4; табл. 15, фиг. 1—3; табл. 17, фиг. 1, *а*, 2. Нижняя юра. Сулюкта, Южная Фергана.

Swedenborgia megasperma Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 133, табл. 58, фиг. 4; табл. 81, фиг. 6—12; рис. 56. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка, Донбасс.

Swedenborgia tyttosperma Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 135, табл. 67, фиг. 6; табл. 81, фиг. 13—19; рис. 57. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка, Донбасс.

Swedenborgia sp.

1960. Сикстель, с. 91, рис. 16. Верхний триас. Р. Ягноб. Средняя Азия.

1971. Станиславский, с. 111, рис. 59. Верхний триас (новорайская свита). Донбасс.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 191. Верхний триас. Шураб, Южная Фергана.

Taxites Brongniart, 1828

Taxites tournalii Brongniart

1828 (1828—1838). Brongniart, с. 47, табл. 3, фиг. 4. Олигоцен. Франция.

Taxites subzamioides Moeller

Цитируются как Elatocladus subzamioides, см. выше.

1903. Moller, с. 34, табл. 6, фиг. 4, 5; табл. 7, фиг. 16. Нижняя — средняя юра. Борнхольм.

Taxites cf. subzamioides Moeller

1912. Новопокровский, с. 15, табл. 2, фиг. 3. Нижний мел. Р. Тырма, Буреинский бассейн.

Taxocladus Prynada in Vassilevskaja, 1959

А.И. Турутанова-Кетова (1963) указывает в качестве типового вида Taxocladus nicanicus Prytada, нижний мел. Приморье. Однако этот вид не был эффективно обнародован.

Taxocladus tschtschumensis Vassilevskaja

1959а. Василевская, с. 76, табл. 2, фиг. 1–5. Верхняя юра (джаскайская свита) . Ленский бассейн.

Taxocladus ketovae Teslenko

1962. Тесленко, с. 149, табл. 24, фиг. 2; рис. 44. Средняя юра. Кузбасс.

1970б. Тесленко, с. 175, табл. 47, фиг. 1–4; табл. 51, фиг. 7. Нижняя – средняя юра. Кузбасс.

Taxocladus obtusatus Prynada

1962. Принада, с. 229, табл. 17, фиг. 1–2. Юра. Иркутский бассейн.

Taxocladus sibiricus (Chachlov) Teslenko

1924. Sequoia sibirica!. Хахлов, с. 22, рис. 35, 36. Юра. Иркутский бассейн.

1962. Taxocladus sibiricus. Тесленко, с. 149, рис. 45. Средняя юра (тюменская свита) . Томская обл. Западная Сибирь.

1970б. Тесленко, с. 174, табл. 51, фиг. 6. Средняя юра (тюменская свита) . Западно-Сибирская низменность.

Taxocladus cf. sutschanensis Prynada in Vassilevskaja et Pavlov

1963. Василевская, Павлов, табл. 28, фиг. 1. Нижний мел (огонер-юряхская свита) . Ленский бассейн.

Taxocladus sp.

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 195, табл. 19, фиг. 8. Нижняя юра. Шураб, Южная Фергана.

1975. Баранова, Киричкова, Зауэр, с. 134, табл. 34, фиг. 5–6. Средняя юра. Канджага, Южная Эмба, Западный Казахстан.

Thuites Sternberg, 1825

Thuites alienus Sternberg

1820–1838. Sternberg, с. 38, табл. 45, фиг. 1. Верхний мел. Чехословакия.

Thuites ecarinatus Trautschold

1871. Trautschold, с. 35, табл. 21, фиг. 2. Нижний мел. Клин, Московская обл.

1933а. Принада, с. 49, табл. 2, фиг. 12а–14. Нижний мел. Латненский район, европейская часть СССР.

1937. Принада, с. 84, Нижний мел. Воронежская обл.

1947. Пересветов, с. 201, рис. 10. Нижний мел. Подмосковье.

Thuites cf. expansus Sternberg

1955. Ананьев, с. 190, табл. 26, фиг. 7. Нижний мел. Р. Кия, Западная Сибирь.

Tomharrisia Florin, 1958

Tomharrisia ramosa Florin

1958. Florin, с. 297, табл. 16, фиг. 1–7; табл. 17, фиг. 1–7; табл. 18, фиг. 1–6; табл. 19, фиг. 1–6. Средняя юра. Англия.

Tomharrisia florinii Krassilov

1965б. Красилов, с. 1454, табл. 4, фиг. 1–5. Нижний мел. Приморье.

1967. Красилов, с. 196, табл. 72, фиг. 1–5; рис. 27, *г–е* в тексте. Там же.

Tomharrisia kurbatovii Gomolitzky

1963. Гомолицкий, с. 1433, табл. 1, фиг. 4–7. Средняя юра. Гиссарский хребет.

Tomharrisia ex gr. kurbatovii Gomolitzky

1971. Сикстель, Савицкая и др., с. 195, табл. 19, фиг. 7. Нижняя и средняя юра. Кугитанг, Гиссарский хребет.

Tomiostrobus Neuburg, 1936

Tomiostrobus radiatus Neuburg

1936б. Нейбург, с. 491, табл. 5, фиг. 2–3. Нижний триас. Кузбасс.

Torreya Arnott, 1838

Torreya taxifolia Arnott, современный

Torreya longifolia Gomolitzky

1963. Гомолицкий, с. 1432, табл. 2, фиг. 1–7. Средняя юра. Гиссарский хребет.

Torreya nicanica Krassilov

1965б. Красилов, с. 1453, табл. 3, фиг. 4–8; табл. 4, фиг. 6. Нижний мел. Приморье.

1967. Красилов, с. 194, табл. 71, фиг. 1–7; рис. 27, *а–в*. Там же.

Ulmannia Goeppert, 1850

Ulmannia bronnii Goeppert

1850. Goeppert, с. 185, табл. 20, фиг. 26. Пермь. Саксония, ФРГ.

1962. Сикстель, с. 380. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Ussuriocladus Kryshtofovich et Prynada, 1932

Ussuriocladus racemosus Halle ex Kryshtofovich et Prynada

1932. Криштофович, Принада, с. 372. Нижний мел. С. Константиновка, Приморье.

1961. Самылина, с. 639, табл. 5, фиг. 1–4. Нижний мел. С. Липовцы, Приморье.

1967. Красилов, с. 184, табл. 63, фиг. 1–4. Нижний мел. Приморье.

Ussuriocladus scoparius Kryshtofovich et Prynada in Samylina

1961. Самылина, с. 640, табл. 5, фиг. 5–7. Нижний мел. С. Константиновка, Приморье.

Voltzia Brongniart, 1828

Voltzia brevifolia Brongniart

1828 (1828–1838). Brongniart, с. 449, табл. 15; табл. 16, фиг. 1, 2. Нижний триас. Вогезы, Франция.

Voltzia charkoviensis Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 131, табл. 79, фиг. 1–7; табл. 80, фиг. 1–6, 7, *а*, 8–10; рис. 55. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка, Донбасс.

Voltzia sp.

1976. Станиславский, с. 133, табл. 79, фиг. 8. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка, Донбасс.

Widdringtonites Endlicher, 1847

Widdringtonites ungeri Endlicher

1847. Endlicher, c. 271.

Widdringtonites keuperianus Heer

1865. Heer, c. 52, фиг. 31, *а*. Швейцария.

1960. Сикстель, с. 84, табл. 15, фиг. 3; рис. 15. Верхний триас. Средняя Азия.

Xenoxylon Gothan, 1905

Xenoxylon latiporosum (Cramer) Gothan

1869. Pinites latiporosus. Cramer in Heer, с. 176, табл. 40, фиг. 1–8. Нижний мел. Шпицберген.

1905. Xenoxylon latiporosum. Gothan, с. 38. Там же.

1961. Нащекин, с. 184–186, табл. 3, фиг. 1–5. Нижний мел. Красноярский край.

1961. Нащекин, с. 282, табл. 26, фиг. 4–12. Средняя юра – нижний мел. Западная Сибирь.

1968. Нащекин, с. 64, рис. 11, 12. Нижний мел (кийская свита). Средняя Сибирь.

1967. Шилкина, стр. 44, табл. 6, фиг. 1–4. Юра – нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

1967. Шилкина, в кн.: Делле, с. 108, табл. 25, фиг. 1–4. Средняя юра. Ткварчели, Закавказье.

1971. Худайбердыев и др., с. 36, табл. 24, фиг. 1–4. Юра. Шураб-2, Южная Фергана.

Xenoxylon cf. latiporosum (Cramer) Gothan

1967. Шилкина, с. 45, табл. 6, фиг. 5–6. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

Xenoxylon barberi (Seward) Kräusel

1904. Cupressinoxylon barberi. Seward, с. 60, табл. 7, фиг. 1, 4, 6. Юра. Англия.

1949. Xenoxylon barberi. Kräusel, с. 149. Там же.

1967. Шилкина, с. 44, табл. 7, фиг. 1–4. Нижний мел. Земля Франца-Иосифа.

1968. Нематулаев, Худайбердыев, с. 92, табл. 34, фиг. 2–3. Средняя юра. Южная Фергана.

1971. Худайбердыев и др., с. 35, табл. 22, фиг. 3–4; табл. 23, фиг. 1. Средняя юра. Шураб-2, Муян, Средняя Азия.

Xenoxylon hopeiense Chang

1929. Chang, с. 250, табл. 1, фиг. 1–4; рис. в тексте 1–7. Верхняя юра. Китай.

1971. Худайбердыев и др., с. 36, табл. 23, фиг. 2–4. Юра. Шураб-2. Южная Фергана.

Xenoxylon jurassicum (Eckhold) Krausel

1922. Protopodocarpoxylon jurassicum. Eckhold, с. 491. Юра. Польша.

1949. Xenoxylon jurassicum. Krausel, с. 144. Там же.

1962б. Нащекин, с. 162, табл. 21, фиг. 1–4. Верхняя юра. Красноярский край.

1968. Нащекин, с. 66, рис. 13. Верхняя юра — нижний мел. Средняя Сибирь.

Xenoxylon suljuctense Shilkina et Chudajberdyev

1971. Шилкина, Худайбердыев, с. 132, табл. 80, фиг. 1–4. Юра. Сулюкта, Южная Фергана.

Allicospermum Harris, 1935

Allicospermum xystum Harris

1935. Harris, с. 121, табл. 9, фиг. 1—10, 13, 18; рис. в тексте 46. Нижняя юра (зона Thaumatopteris). Восточная Гренландия.

Allicospermum adnicanicum Krassilov

1972. Красилов, с. 40, табл. 4, фиг. 6—8; рис. 5, *к—м*. Нижний мел (чемчукинская свита). Левый берег р. Буреи.

Allicospermum burejense Krassilov

1972. Красилов, с. 39, табл. 5, фиг. 8—10, 12, 13; табл. 6, фиг. 11; рис. 5, *в—и*. Нижний мел (чемчукинская свита). Левый берег р. Буреи.

Allicospermum sujfunense Krassilov

1967. Красилов, с. 230, табл. 89, фиг. 1—4; табл. 90, фиг. 3, 5; рис. 32, *а—в*. Нижний мел (липовецкая свита). Южное Приморье.

Androstrobus Schimper, 1870[1]

Antholithes Heer, 1880

Antholithes schmidtianus Heer

1880. Heer, с. 21, табл. 9, фиг. 3—5. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1951. Принада, табл. 16, фиг. 1—5. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1962. Принада, с. 274, табл. 16, фиг. 1—6; рис. 72. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

Antholithes cylindricus Prynada

1970. Принада, с. 70, табл. 6, фиг. 8. Нижний триас (корвунчанская свита). Тунгусский бассейн.

Antholithes kraschenninnikovii Kryschtofovich et Prynada

1933б. Криштофович, Принада, с. 21, табл. 2, фиг. 6. 10. Верхний триас — нижняя юра. Челябинский бассейн.

1933. Криштофович, с. 129, табл. 7, фиг. 9. Верхний триас — нижняя юра. Челябинский бассейн.

Antholithes paniculatus Heer

1880. Heer, с. 22, табл. 9, фиг. 1, *а*, 2. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

Antholithes sp.

1976. Станиславский, с. 141, табл. 56, фиг. 6. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка. Донбасс

[1] См. Цикадовые.

Araucarites Presl, 1838[1]

Beania Carruthers, 1869[2]

Burejospermum Krassilov, 1972

Burejospermum crassitestum Krassilov

1972. Красилов, с. 65, табл. 22, фиг. 1–4, 9–14. Верхняя юра (ургальская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Bysmatospermum Harris, 1935

Bysmatospermum macrotrachelum Harris

1935. Harris, с. 132, табл. 29, фиг. 12; рис. в тексте 48. Верхний триас — нижняя юра. Восточная Гренландия.

Bysmatospermum harrisii Krassilov

1967. Красилов, с. 231, табл. 90, фиг. 1–2, 4; рис. 32. Нижний мел (липовецкая свита). Южное Приморье.

Carpolithes Sternberg, 1825

Carpolithes acuminatus Sternberg

1825 (1820–1838). Sternberg, с. 40, табл. 7, фиг. 4. Средняя юра. Англия.

Carpolithes balejensis Prynada

1951. Принада, табл. 18, фиг. 18–19. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1962. Принада, с. 271, табл. 18, фиг. 18, 19. Юра. Иркутский бассейн, Восточное Забайкалье.

Carpolithes bulunensis Heer

1878a. Heer, с. 22, табл. 4, фиг. 17. Нижний мел. Низовья р. Лены.

Carpolithes cardioformis Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 300, табл. 5, фиг. 63; табл. 8, фиг. 112. Нижняя юра. Средняя Азия

Carpolithes cinctus Nathorst

1878c. Nathorst, с. 34, табл. 4, фиг. 17, 18; стр. 52, табл. 6, фиг. 2, 3. Верхний триас. Швеция.

1931. Турутанова-Кетова. с. 333, табл. 2, фиг. 6; табл. 3, фиг. 6. Нижняя юра. Иссык-Куль.

1944. Турутанова-Кетова, с. 86, рис. 9, *а, б* в тексте. Нижняя — средняя юра. Мангышлак.

1948. Голова, с. 109, табл. 9. фиг. 85–87. Средняя юра. Чулымо-Енисейский бассейн.

1950. Турутанова-Кетова, с. 294, табл. 2, фиг. 19, *а*, 20, *а*; табл. 8, фиг. 110. Верхний триас — юра. Средняя Азия и Южный Казахстан.

1951. Принада, табл. 15, фиг. 10. Юра. Восточное Забайкалье.

1954. Голова, с. 62, табл. 1, фиг. 12, *в*; табл. 2, 25, *в*, 33. Средняя юра. Чулымо-Енисейский бассейн.

---

[1] См. Хвойные.

[2] См. Цикадовые.

Araucarites Presl, 1838[1]

Beania Carruthers, 1869[2]

Burejospermum Krassilov, 1972

Burejospermum crassitestum Krassilov

1972. Красилов, с. 65, табл. 22, фиг. 1—4, 9—14. Верхняя юра (ургальская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Bysmatospermum Harris, 1935

Bysmatospermum macrotrachelum Harris

1935. Harris, с. 132, табл. 29, фиг. 12; рис. в тексте 48. Верхний триас — нижняя юра. Восточная Гренландия.

Bysmatospermum harrisii Krassilov

1967. Красилов, с. 231, табл. 90, фиг. 1—2, 4; рис. 32. Нижний мел (липовецкая свита). Южное Приморье.

Carpolithes Sternberg, 1825

Carpolithes acuminatus Sternberg

1825 (1820—1838). Sternberg, с. 40, табл. 7, фиг. 4. Средняя юра. Англия.

Carpolithes balejensis Prynada

1951. Принада, табл. 18, фиг. 18—19. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1962. Принада, с. 271, табл. 18, фиг. 18, 19. Юра. Иркутский бассейн, Восточное Забайкалье.

Carpolithes bulunensis Heer

1878a. Heer, с. 22, табл. 4, фиг. 17. Нижний мел. Низовья р. Лены.

Carpolithes cardioformis Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 300, табл. 5, фиг. 63; табл. 8, фиг. 112. Нижняя юра. Средняя Азия

Carpolithes cinctus Nathorst

1878c. Nathorst, с. 34, табл. 4, фиг. 17, 18; стр. 52, табл. 6, фиг. 2, 3. Верхний триас. Швеция.

1931. Турутанова-Кетова. с. 333, табл. 2, фиг. 6; табл. 3, фиг. 6. Нижняя юра. Иссык-Куль.

1944. Турутанова-Кетова, с. 86, рис. 9, *а, б* в тексте. Нижняя — средняя юра. Мангышлак.

1948. Голова, с. 109, табл. 9. фиг. 85—87. Средняя юра. Чулымо-Енисейский бассейн.

1950. Турутанова-Кетова, с. 294, табл. 2, фиг. 19, *а*, 20, *а*; табл. 8, фиг. 110. Верхний триас — юра. Средняя Азия и Южный Казахстан.

1951. Принада, табл. 15, фиг. 10. Юра. Восточное Забайкалье.

1954. Голова, с. 62, табл. 1, фиг. 12, в; табл. 2, 25, *в*, 33. Средняя юра. Чулымо-Енисейский бассейн.

---

[1] См. Хвойные.

[2] См. Цикадовые.

1955. Аксарин, с. 177, табл. 18, фиг. 8; табл. 24, фиг. 2, 3. Нижняя — средняя юра (устьбалейский комплекс). Западная Сибирь.
1957. Станиславский, с. 85, табл. 18, фиг. 6–8. Средняя юра. Каменка, Донбасс.
1958. Орловская, с. 134, табл. 5, фиг. 5. Средняя юра (шоптыкульская свита). Майкюбень, Казахстан.
1960. Тесленко, с. 156, табл. 17, фиг. 11. Средняя юра (итатская свита). Окрестности Красноярска.
1961. Просвирякова, с. 169, табл. 11, фиг. 8; табл. 12, фиг. 10. Средняя — верхняя юра (гонгринская, дурайская свиты). Южная Якутия.
1961б. Маркович, с. 182, табл. 24, фиг. 4, 5. Средняя юра (романкульская свита). Магнитогорский синклинорий.
1961. Ковальчук, с. 249, табл. 58, фиг. 3, 4. Верхний триас (тологойская свита). Кендерлыкская мульда, Казахстан.
1962. Тесленко, с. 150, табл. 24, фиг. 4–5; рис. 46. Нижняя — средняя юра (макаровская, итатская свиты). Западная Сибирь.
1962. Принада, с. 271, табл. 15, фиг. 10, *а*; табл. 18, фиг. 20. Юра — нижний мел. Иркутский бассейн и Восточное Забайкалье.
1965. Лебедев Е.Л., с. 128, табл. 34, фиг. 4. Верхняя юра. Р. Зея, бассейн р. Амура.
1966. Генкина, с. 124, табл. 61, 24. Нижняя юра (джильская и угленосная свиты). Согуты, Джергалан, Иссык-Куль.
1966. Просвирякова, стр. 111, табл. 23, фиг. 11, 12. Средняя юра (джарсуйская, сарыдиирменская свиты). Мангышлак.
1968. Орловская, с. 66, табл. 13, фиг. 5–6. Средняя юра (шоптыкульская свита). Майкюбень, Казахстан.
1970б. Тесленко, с. 178, табл. 48, фиг. 12; табл. 52, фиг. 6. Нижняя — средняя юра. Чулымо-Енисейский бассейн, Кузбасс, Тува.
1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 98, табл. 71, фиг. 1, 2. Верхний триас — юра. Средняя Азия.
1971. Станиславский, с. 124, табл. 5, фиг. 5, 6. Верхний триас . Донбасс.

Carpolithes cf. cinctus Nathorst

1935. Принада, с. 230, табл. 1, фиг. 6. Юра. Р. Нарын, Средняя Азия.
1963а. Генкина, с. 92, табл. 51, фиг. 5, 6. Средняя юра. Орский бассейн.
1976. Станиславский, с. 93, табл. 48, фиг. 4–7. Верхний триас (протопивская свита). Гаражовка, Донбасс.

Carpolithes aff. cinctus Nathorst

1951. Принада, табл. 18, фиг. 20. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.
1963. Самылина, с. 113, табл. 30, фиг. 6. Нижний мел. Левый берег р. Алдана.

Carpolithes complanatus Turutanova-Ketova

1944. Турутанова-Кетова, с. 87, табл. 1, фиг. 6. Нижняя — средняя юра. Мангышлак.

Carpolithes dahuricus Prynada

1951. Принада, табл. 15, фиг. 10, *в*, 11, 12. Юра. Восточное Забайкалье.
1962. Принада, с. 269, табл. 15, фиг. 10б, 11, 12. Верхняя юра — нижний мел. Восточное Забайкалье.

Carpolithes deplanatus Prynada

1951. Принада, табл. 18, фиг. 4, *в*. Юра. Иркутский бассейн.
1962. Принада, с. 270, табл. 18, фиг. 4, *б*. Юра. Иркутский бассейн.

Carpolithes elongata Prosvirjakova

1966. Просвирякова, с. 112, табл. 23, фиг. 13. Средняя юра. Мангышлак.

Carpolithes cf. elongata Prosvirjakova

1971. Маркович, с. 106, табл. 11, фиг. 13. Средняя юра (орская свита). Орский бассейн.

Carpolithes eretmophylli Krassilov

1972. Красилов, с. 55, табл. 14, фиг. 7–9; рис. 7. Нижний мел (чегдамынская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Carpolithes hartungii Heer

1878а. Heer, с. 8, табл. 1, фиг. 28. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

Carpolithes heeri Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 296, табл. 2, фиг. 19, *в*, 20, *в*; табл. 8, фиг. 3. Верхний триас, нижняя — средняя юра. Мангышлак.
1955. Аксарин, с. 178, табл. 24, фиг. 7, 8. Нижняя — средняя юра. Канский бассейн.
1962. Тесленко, с. 151, табл. 24, фиг. 3. Нижняя — средняя юра (макаровская, итатская свиты). Западная Сибирь.
1970б. Тесленко, с. 179, табл. 48, фиг. 13–18. Нижняя — средняя юра. Западная и Южная Сибирь. Тува.
1976. Долуденко, Орловская, с. 85, табл. 38, фиг. 7. Нижняя юра. Куркуреу, хребет Каратау, Южный Казахстан. Средняя юра. Чокпак, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Carpolithes cf. heeri Turutanova-Ketova

1961б. Маркович, с. 183, табл. 24, фиг. 6, *а*. Средняя юра (романкульская свита). Магнитогорский синклинорий.

Carpolithes ivanovskyi Teslenko

1962. Тесленко, с. 151, рис. 47. Нижняя юра. Кузбасс.
1970б. Тесленко, с. 181, табл. 48, фиг. 11; табл. 52, фиг. 11. Нижняя юра (абашевская свита). Кузбасс.

Carpolithes karatavicus Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 301, табл. 2, фиг. 25–26. Юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.
1970б. Тесленко, с. 181, табл. 48, фиг. 7–8. Средняя юра (салдамская свита). Р. Енисей, Тува.

Carpolithes minor Prynada

1929. Принада, с. 140, рис. 1. Юра. Южный Алтай.

1950. Турутанова-Кетова, с. 298, табл. 2, фиг. 21. Нижняя юра. Кок-Янгак, Фергана.

1962. Принада, с. 272, табл. 18, фиг. 21. Юра. Иркутский бассейн.

1966. Генкина, с. 124, табл. 61, фиг. 19—23. Нижняя юра (джильская и угленосная свиты). Иссык-Куль.

Carpolithes oviformis Prynada

1931. Принада. с. 42, табл. 4, фиг. 41; рис. 6, *Б*, *В*. Нижняя юра. Реки Зауpон, Ягноб, Средняя Азия.

1952. Сикстель, с. 55, табл. 11, фиг. 5. Юра. Фан-Ягноб, Средняя Азия.

Carpolithes piriformis Reiss

1910. Рейс, с. 60, табл. 5, фиг. 7. Верхняя юра. Бурятская АССР.

Carpolithes pygmeus Prynada

1951. Принада, табл. 18, фиг. 21. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

Carpolithes tricostatus Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 302, табл. 2, фиг. 22. Нижняя юра. Иссык-Куль.

1962. Тесленко, с. 152, табл. 24, фиг. 10, 11. Нижняя юра (макаровская свита). Красноярский край.

1970б. Тесленко, с. 180, табл. 48, фиг. 9, 10. Нижняя юра (макаровская свита). Чулымо-Енисейский бассейн.

Carpolithes cf. tricostatus Turutanova-Ketova

19616. Маркович, с. 183, табл. 24, фиг. 6, *б*. Средняя юра (романкульская свита). Магнитогорский синклинорий.

Carpolithes trigonalis Samylina

1963. Самылина, с. 114, табл. 31, фиг. 6, 7. Нижний мел. Левый берег р. Алдана.

Carpolithes ukinensis Vassilevskaja

1963. Василевская, Павлов, табл. 43, фиг. 11. Нижний мел (укинская свита). Низовья р. Лены.

Carpolithes undulatus Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 300, табл. 2, фиг. 24; табл. 8, фиг. 116. Нижняя юра. Средняя Азия.

Conites Sternberg, 1823 — см. Хвойные

Crematosaccus Prynada, 1963

Crematosaccus stenorhachis (Nathorst) Prynada

1875. Zamiostrobus stenorhachis. Nathorst, с. 7, табл. 13, фиг. 1, 2. Верхний триас. Швеция.

1963. Crematosaccus stenorhachis. Принада в кн.: Основы палеонтологии, с. 302.

Crematosaccus sp.

1963. Основы палеонтологии, рис. 194. Нижняя юра. Шураб, Южная Фергана.

1971. Худайбердыев, Гомолицкий, Лобанова, с. 22, табл. 17, фиг. 5. Нижняя юра. Южная Фергана.

Cupressocarpus Brick, 1925; Cycadocarpidium

Nathorst[1], 1886

Discostrobus Krasser, 1905

Discostrobus argunensis Krasser

1905. Krasser, с. 40, табл. 4, фиг. 11–14. Юра. Забайкалье.

Drepanolepis Narhorst, 1897; Elatides Heer, 1876[1]

Enygmatostrobus Kryshtofovich, 1914

Enygmatostrobus dokturowskyi Kryshtofovich

1914. Криштофович, с. 106, табл. 5, фиг. 3–6. Верхняя юра – нижний мел. Р. Тырма, бассейн р. Амура.

1966 (1959–1966). Криштофович, с. 82, табл. 5, фиг. 1–4. Верхняя юра – нижний мел. Р. Тырма, бассейн р. Амура.

Fraxinopsis Wieland[1], 1929

Hydropterangium Halle[2], 1910;

Ixostrobus Raciborski[3], 1891;

Karkenia

Archangeisky[4], 1965

Leptostrobus Heer[3], 1876

Machairostrobus Prynada ex Turutanova-Ketova, 1950

Machairostrobus laxus Prynada ex Turutahova-Ketova

1963. Основы палеонтологии, с. 304, рис. 201. Верхняя юра (?). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Machairostrobus kazachstanicus Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 338, табл. 1, фиг. 1, 2. Средняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Machairostrobus sutschanicus Krassilov

1967. Красилов, с. 218, табл. 33, фиг. 1–7. Нижний мел. Южное Приморье

---

[1] См. Хвойные.
[2] См. Птеридоспермовые.
[3] См. Чекановскиевые.
[4] См. Гинкговые.

Machairostrobus sp.

1963. Василевская, Павлов, табл. 43, фиг. 17. Мел (укинская свита). Низовья р. Лены.

Masculostrobus Seward, 1911; Pityolepis Nathorst, 1897; Pityospermum Nathorst, 1897; Pityostrobus Nathorst[2], 1897

Platylepidium Turutanova-Ketova, 1963 (=Platylepis Turutanova-Ketova, 1950 non Saporta, 1874).

Platylepidium (=Platylepis) oblanceolata Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 340, табл. 1, фиг. 3. Средняя и верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Platylepidium (=Platylepis) levis Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 342, табл. 1, фиг. 4—7. Средняя и верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1970б. Тесленко, с. 186, табл. 49, фиг. 10; табл. 52, фиг. 4. Средняя юра (итатская свита). Чулымо-Енисейский бассейн.

Platylepidium (=Platylepis) cf. levis Turutanova-Ketova

1962. Тесленко, с. 156, табл. 24, фиг. 9; рис. 50. Средняя юра (итатская свита). Окрестности Красноярска.

Platylepidium (=Platylepis) minor Turutanova-Ketova

1950. Турутанова-Кетова, с. 344, табл. 1, фиг. 18. Средняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Platylepidium (=Platylepis) vilujense Kiritchkova

1966. Киричкова, с. 122, табл. 2, фиг. 9. Нижняя юра. Р. Вилюй, Восточная Сибирь.

Platylepis Turutanova-Ketova (non Saporta)[1]

Polyandra Czastnikova, 1952

Polyandra turkestanika Czastnikova

1952. Частникова, с. 9, фиг. 7—9. Нижняя юра. Южная Фергана.

Problematospermum Turutanova-Ketova, 1930

Problematospermum ovale Turutanova-Ketova

1930. Турутанова-Кетова, с. 160, табл. 4, фиг. 30, 30, *а*. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Problematospermum elongatum Turutanova-Ketova

1930. Турутанова-Кетова, с. 161, табл. 4, фиг. 29, 29, *а*. Верхняя юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

Rhopalostachys Prynada, 1971

Rhopalostachys minor Prynada ex Stanislavsky

---

[1] См. Platylepidium.

[2] См. Хвойные

1971. Станиславский, с. 117, табл. 22, фиг. 7–9; рис. 64. Верхний триас. Донбасс.

Rhopalostachys rugosa Sixtel

1960. Сикстель, с. 90, табл. 15, фиг. 4, 5. Верхний триас. Р. Ягноб, Средняя Азия.

Samaropsis Goeppert, 1864; Schidolepidium Heer, 1880;

Schizolepis Braun[2], 1847

Sorosaccus Harris, 1935

Sorosaccus gracilis Harris

1935. Harris с. 10, табл. 24, фиг. 3–7, 11, 12; табл. 28, фиг. 11; рис. 50. Нижняя юра (зона Thaumatopteris). Восточная Гренландия.

Sorosaccus sibiricus Prynada

1951. Принада, табл. 13, фиг. 7, 8; табл. 16, фиг. 14; табл. 18, фиг. 4–7; табл. 21, фиг. 5. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1959а. Василевская, с. 81, табл. 13, фиг. 11. Нижний мел (ынгырская свита). Ленский бассейн.

1962. Принада, с. 289, табл. 13, фиг. 7, 8; табл. 16, фиг. 14; табл. 18, фиг. 4, *а*, 5–7; табл. 21, фиг. 5. Юра. Иркутский бассейн.

1963. Василевская, Павлов, табл. 18, фиг. 5, 6. Мел (булунская свита). Низовья р. Лены.

Sorosaccus ex gr. sibiricus Prynada

1972. Красилов, с. 97, табл. 19, фиг. 3, 8. Верхняя юра — нижний мел (тырминская свита). Р. Тырма, бассейн р. Амура.

Sorosaccus umaltensis Krassilov

1972. Красилов, с. 96, табл. 19, фиг. 1, 2, 4–7, 9. Верхняя юра (талынжанская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Stachyopitys Schenk, 1867

Stachyopitys preslii Schenk

1867. Schenk, с. 185, табл. 44, фиг. 9–12. Верхний триас, нижняя юра. Бавария.

Stachyopitys sp.

1931. Турутанова-Кетова, с. 332, табл. 2, фиг. 2. Нижняя юра. Иссык-Куль.

Staphidiophora Harris[1], 1935; Stenomischus Harris[2], 1935

Stenorhachis Saporta, 1879

Stenorhachis scanicus (Nathorst) Nathorst

---

[1] См. Чеканевскиевые.

[2] См. Хвойные.

1971. Станиславский, с. 117, табл. 22, фиг. 7–9; рис. 64. Верхний триас. Донбасс.

Rhopalostachys rugosa Sixtel

1960. Сикстель, с. 90, табл. 15, фиг. 4, 5. Верхний триас. Р. Ягноб, Средняя Азия.

Samaropsis Goeppert, 1864; Schidolepidium Heer, 1880;

Schizolepis Braun[2], 1847

Sorosaccus Harris, 1935

Sorosaccus gracilis Harris

1935. Harris с. 10, табл. 24, фиг. 3–7, 11, 12; табл. 28, фиг. 11; рис. 50. Нижняя юра (зона Thaumatopteris). Восточная Гренландия.

Sorosaccus sibiricus Prynada

1951. Принада, табл. 13, фиг. 7, 8; табл. 16, фиг. 14; табл. 18, фиг. 4–7; табл. 21, фиг. 5. Юра. Усть-Балей, Иркутский бассейн.

1959а. Василевская, с. 81, табл. 13, фиг. 11. Нижний мел (ынгырская свита). Ленский бассейн.

1962. Принада, с. 289, табл. 13, фиг. 7, 8; табл. 16, фиг. 14; табл. 18, фиг. 4, *а*, 5–7; табл. 21, фиг. 5. Юра. Иркутский бассейн.

1963. Василевская, Павлов, табл. 18, фиг. 5, 6. Мел (булунская свита). Низовья р. Лены.

Sorosaccus ex gr. sibiricus Prynada

1972. Красилов, с. 97, табл. 19, фиг. 3, 8. Верхняя юра – нижний мел (тырминская свита). Р. Тырма, бассейн р. Амура.

Sorosaccus umaltensis Krassilov

1972. Красилов, с. 96, табл. 19, фиг. 1, 2, 4–7, 9. Верхняя юра (талынжанская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Stachyopitys Schenk, 1867

Stachyopitys preslii Schenk

1867. Schenk, с. 185, табл. 44, фиг. 9–12. Верхний триас, нижняя юра. Бавария.

Stachyopitys sp.

1931. Турутанова-Кетова, с. 332, табл. 2, фиг. 2. Нижняя юра. Иссык-Куль.

Staphidiophora Harris[1], 1935; Stenomischus Harris[2], 1935

Stenorhachis Saporta, 1879

Stenorhachis scanicus (Nathorst) Nathorst

---

[1] См. Чекановскиевые.

[2] См. Хвойные.

1875. Zamiostrobus stenorhachis. Nathorst, с. 7, табл. 13, фиг. 1, 2. Верхний триас — нижняя юра. Швеция.
1902. Stenorhachis scanicus. Nathorst, с. 16, табл. 1, фиг. 16, 17. Там же.
1931. Турутанова-Кетова, с. 336, рис. 4, в в тексте. Нижняя юра. Иссык-Куль.
1936а. Турутанова-Кетова, с. 109. Юра. Чокпак, Южный Казахстан.
1962. Принада, с. 277, табл. 9, фиг. 10, 11. Юра. Забайкалье.
1971. Сикстель, Кузичкина и др., с. 97, табл. 70, фиг. 2—4. Верхний триас — нижняя юра. Средняя Азия.

Stenorhachis cf. scanicus Nathorst

1963а. Генкина, с. 90, табл. 51. фиг. 2, 3. Средняя юра. Орский бассейн.

Stenorhachis bulunensis (Heer) Vassilevskaja

1878а. Carpolithes bulunensis. Heer, с. 22, табл. 4, фиг. 17. Мел. Ленский бассейн.
1963. Stenorhachis bulbnensis. Василевская, Павлов, табл. 18, фиг. 2. Мел (булунская свита). Низовья р. Лены.
1966. Василевская, с. 90, табл. 8, фиг. 8. Нижний мел (булунская свита). Низовья р. Лены.

Stenorhachis? clavata Nathorst

1897b. Nathorst, с. 71, табл. 3, фиг. 38, 39. Верхняя юра. Шпицберген.
1934. Криштофович, Принада, с. 83, рис. 484. Юра. Казахстан.
1962. Тесленко, с. 154, табл. 24, фиг. 8. Нижняя юра. Кузбасс.
1970б. Тесленко, с. 188, табл. 49, фиг. 6, 7. Нижняя — средняя юра (осиновская свита). Кузбасс.

Stenorhachis dubia Antevs

1919. Antevs, с. 38, табл. 5, фиг. 8—15. Нижняя юра. Швеция.
1934. Криштофович, Принада, с. 83, рис. 48. Нижняя юра. Кавказ.
1961б. Маркович, с. 183, табл. 24, фиг. 9. Средняя юра (романкульская свита). Магнитогорский синклинорий.
1966. Генкина, с. 125, табл. 61, фиг. 28, 29. Нижняя юра (аксайская свита). Иссык-Куль.
1976. Долуденко, Орловская, стр. 85, табл. 37, фиг. 5, 6. Нижняя юра. Р. Чокпак, Куркурей, хребет Каратау, Южный Казахстан.

Stenorhachis cf. dubia Antevs

1957. Станиславский, с. 83, рис. 35. Средняя юра. Каменка, Донбасс.

Stenorhachis lepida (Heer) Seward

1880. Ginkgo lepida. Heer, с. 17, табл. 4, фиг. 9, *b*, 10, *b*, 11, *b*, 12. Юра. Восточная Сибирь.
1912. Stenorhachis lepida. Сьюорд, с. 13, табл. 1, фиг. 8. Юра. Бассейн р. Амура.
1931. Турутанова-Кетова, с. 331, табл. 4, фиг. 6. Юра. Иссык-Куль.
1931. Принада, с. 37, табл. 2, фиг. 18; рис. 4, *E*. Нижняя юра. Кштут, Средняя Азия.

1934. Криштофович, Принада, с. 83, рис. 48. Юра. Иркутский бассейн. Казахстан, Иссык-Куль, Фергана.

Stenorhachis menkerensis Abramova

1970. Абрамова, с. 52, табл. 10, фиг. 6–8. Нижний мел (джарджанская и огонер-юряхская свиты). Жиганский район, Ленский бассейн.

Stenorhachis paradoxa Kryshtofovich et Prynada

1933б. Криштофович, Принада, с. 23, табл. 3, фиг. 11. Верхний триас — нижняя юра. Челябинский бассейн.

Stenorhachis sibirica Heer

1876b. Heer, с. 61, табл. 11, фиг. 1, 9–12. Юра. Восточная Сибирь.

1948. Голова, с. 101, табл. 7, фиг. 59, 59, *а*, 60. Средняя юра. Чулымо-Енисейский бассейн.

Stenorhachis striolatus Nathorst

1897b. Nathorst, с. 20, табл. 1, фиг. 15. Мел. Шпицберген.

1963. Василевская, Павлов, табл. 43, фиг. 2. Мел (укинская свита). Низовья р. Лены.

Stenorhachis sp.

1959а. Василевская, с. 81, табл. 13, фиг. 8, 9. Нижний мел (ынгырская свита). Ленский бассейн.

1962. Принада, с. 278, рис. 74. Юра. Восточное Забайкалье.

1963а. Генкина, с. 90, табл. 50, фиг. 4–6. Средняя юра. Орский бассейн.

1963. Василевская, Павлов, табл. 43, фиг. 3. Мел (укинская свита). Низовья р. Лены

Swedenborgia Nathorst[1], 1878

Tanaidia Prynada, 1956; Tanaidocarpidium Prynada[2], 1956

Toretzia Stanislavsky, 1917 — см. Гинкговые

Tmematostrobus Harris, 1935

Tmematostrobus eremus Harris

1935. Harris, с. 119, табл. 23, фиг. 5; табл. 28, фиг. 5. Верхний триас (зона Lepidopteris). Восточная Гренландия.

Tmematostrobus spiciformis Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 90, табл. 33, фиг. 10–16. Верхний триас (протопивская свита). Гаражовка, Донбасс.

Tomiostrobus Neuburg[1], 1936

Umaltolepis Krassilov, 1972

Umaltolepis vachrameevii Krassilov

---

[1] См. Хвойные.
[2] См. Цикадофиты.

1972. Красилов, с. 63, табл. 21, фиг. 5, *а*; табл. 22, фиг. 5–8; табл. 23, фиг. 1, 2, 5–7, 13; рис. 10. Верхняя юра (талынжанская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Umaltolepis rarinervis Krassilov

1972. Красилов, с. 64, табл. 23, фиг. 3, 4, 12; рис. 10. Нижний мел (ургальская свита). Р. Бурея, бассейн р. Амура.

Weltrichia Braun, 1848; Wielandia Nathorst, 1909; Wielandiella Nathorst, 1910; Williamsonia Carruthers, 1870

Williamsonieila Thomas[1], 1915

Zamiostrobus Ebdlicher, 1836

Zamiostrobus macrocephala (Lindley et Hutton) Endlicher

1834 (1831–1837). Zamia macrophylla. Lindley, Hutton, с. 125. Мел, Англия.

1836 (1836–1840). Zamiostrobus macrocephala. Endlicher, с. 72. Там же.

Zamiostrobus orientalis Heer

1876b. Heer, с. 47, табл. 13, фиг. 10, *d,e*. Юра. Иркутский бассейн.

---

[1] См. Беннеттитовые.

ГОЛОСЕМЕННЫЕ БЛИЖЕ НЕ УСТАНОВЛЕННОГО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Desmiophyllum Lesquereux, 1878

Desmiophyllum gracile Lesquereux

1878. Lesquereux, с. 333. Карбон. Пенсильвания, США.

Desmiophyllum acuminatum Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 140, табл. 87, фиг. 1—10, 16, 17. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка, Донбасс.

Desmiophyllum flexuosum Aksarin

1955. Аксарин, с. 175, табл. 16, фиг. 7; рис. 188. Юра. Западная Сибирь.

Desmiophyllum magnum (Samylina) Samylina

1967а. Phoenicopsis (?) magnum. Самылина, с. 147, табл. 6, фиг. 7; табл. 10, фиг. 1—3. Нижний мел (буор-кемюсская свита). Бассейн р. Колымы.

1975. Филиппова, с. 33, табл. 3, фиг. 4, 6. Нижний мел. Северо-Восток СССР.

1976. Самылина, с. 77, табл. 41, фиг. 8; табл. 42, фиг. 1—4. Нижний мел. Омсукчан, Магаданская обл.

Desmiophyllum sibiricum Chachlov

1931. Хахлов, с. 12, 14, табл. 6, фиг. 17. Юра. Кузбасс, Западная Сибирь.

Desmiophyllum sp.

1926. Хахлов, с. 14, фиг. 14, 15. Юра. Иркутский бассейн.

1930. Турутанова-Кетова, с. 158, табл. 5, фиг. 37. Юра. Хребет Каратау, Южный Казахстан.

1976. Станиславский, с. 87, табл. 48, фиг. 6. Верхний триас (протопивская свита). Гаражовка, Донбасс.

1976. Станиславский, с. 88, табл. 48, фиг. 1, 2; рис. 40, 41. Верхний триас (протопивская свита). Гаражовка, Донбасс.

1976. Станиславский, с. 141, рис. 60, *С*. Верхний триас (протопивская свита). Николаевка, Донбасс.

Ketovia Vladimirovich, 1972

Ketovia furcata Vladimirovich

1972. Владимирович, с. 96, табл. 2, фиг. 1, 4. Средний триас (букобайская свита). Оренбургское Приуралье.

Mesenteriophyllum Sixtel, 1959

Mesenteriophyllum kotschnevii Sixtel

1959. Сикстель, табл. 2, фиг. 3. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

1961. Сикстель, с. 156, рис. 5. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.
1962. Сикстель, с. 398, табл. 29, фиг. 1—8; рис. 47. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Mesenteriophyllum serratum Sixtel

1961. Сикстель, с. 156, рис. 6. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.
1962. Сикстель, с. 400, табл. 29, фиг. 9, 10; рис. 48. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Miassia Kryshtofovich et Prynada, 1940

Miassia dentata Kryshtofovich et Prynada

1969. Киричкова, с. 295, табл. 9, фиг. 5, 6; табл. 16, фиг. 3. Нижняя юра. Челябинский бассейн.

Tuzhykoviella Vladimirovich, 1972

Tuzhykoviella elegans Vladimirovich

1972. Владимирович, с. 97, табл. 2, фиг. 2. Средний триас (букобайская свита). Оренбургское Приуралье.

Uralophyllum Kryshtofovich et Prynada, 1933

Uralophyllum kraschenninnikovii Kryshtofovich

1933б. Криштофович, Принада, с. 25, табл. 2, фиг. 7, *б*, 9; табл. 3, фиг. 1—4. Верхний триас — нижняя юра. Восточный Урал.
1933. Криштофович, табл. 7, фиг. 7, 8. Верхний триас — нижняя юра. Восточный Урал.
1959. Владимирович, с. 457, табл. 1, фиг. 1, 2; рис. 1. Верхний триас (угленосная свита). Веселовское месторождение, Восточный Урал.

Uralophyllum petiolatum Sixtel

1962. Сикстель, с. 394, табл. 39, фиг. 3—7; рис. 43, 44. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

Uralophyllum prynadae Stanislavsky

1976. Станиславский, с. 84, табл. 49; табл. 50, фиг. 1—4; рис. 38, 39. Верхний триас (протопивская свита). Гаражовка, Донбасс.

Uralophyllum ramosum Sixtel

1962. Сикстель, с. 392, табл. 39, фиг. 1, 2; рис. 42. Триас (мадыгенская свита). Мадыген, Южная Фергана.

ЛИТЕРАТУРА

Абилаев С.А. Новая находка Eretmophyllum в Казахстане. — В кн.: Биология и география. Алма-Ата, 1968а, вып. 4, с. 5—7.

Абилаев С.А. Новые виды гинкго из юрских отложений Тургайского прогиба. — Там же, 1968б, вып. 5, с. 3—8.

Абрамова Л.Н. Раннемеловая флора Жиганского и прилегающих районов Ленского бассейна. -- Учен.зап.НИИГА. Палеонтол. и биостратиграф., 1970, вып. 29, с. 36—57.

Аксарин А.В. Юрская флора (устьбалейский комплекс). — В кн: Атлас руководящих форм ископаемых фауны и флоры Западной Сибири. М.: Госгеолтехиздат, 1955, т. 2, с. 158—178.

Алиев М.М., Генкина Р.З. Новые данные к палеоботанической характеристике континентальных нижнемезозойских отложений хребта Кавак-Тау в Тянь-Шане. — В кн.: Юрские, меловые и палеогеновые отложения запада Средней Азии. М.: Наука, 1970, с. 7—33.

Ананьев А.Р. Меловая флора (кийский комплекс). — В кн.: Атлас руководящих форм ископаемых фауны и флоры Западной Сибири. М.: Госгеолтехиздат, 1955, т. 2, с. 186—191.

Баранов В.И., Николаева О.Г. Ископаемые древесины из верхнемеловых отложений Енисейского кряжа. — Докл. АН СССР, 1956, т. 107, № 1, с. 125—127.

Баранова З.Е., Буракова А.Т., Бекасова Н.Б. Стратиграфия, литология и флора юрских отложений Туаркыра. — Тр.ВСЕГЕИ. Нов. сер., 1963, т. 88. Проблема нефтегазоносности Средней Азии, вып. 13, с. 232.

Баранова З.Е., Киричкова А.И., Зауер В.В. Стратиграфия и флора юрских отложений востока Прикаспийской впадины. — Тр.ВНИГРИ, 1975, вып. 332, с. 1—190.

Батяева С.К. Новые виды растений из юрских отложений Кузнецкого бассейна. — В кн.: Новые данные по геологии и полезным ископаемым Западной Сибири. Томск: Томск.ун-т, 1974а, вып. 9, с. 62—64.

Батяева С.К. Новые юрские растения Кузнецкого бассейна. — Тр.СНИИГГИМС, 1974б, вып. 192, с. 96—99.

Батяева С.К. Новый Ctenis из среднеюрских отложений Кузнецкого бассейна. — В кн.: Материалы по региональной геологии Сибири. 1974в, с. 114—117. (Тр. СНИИГГИМС; Вып. 173).

Брик М.И. О некоторых юрских хвойных растениях Туркестана. — Бюл. Среднеазиат. ун-та, 1925, № 10, с. 197—203.

Брик М.И. Материалы к изучению мезозойской флоры Средней Азии. Некоторые новые юрские растения из Кшут-Зауранского месторождения ископаемого угля в Таджикской ССР. — В кн.: Материалы по геологии Средней Азии. Ташкент, 1933, вып. 1, с. 1—15.

Брик М.И. Первая находка нижнетриасовой флоры в Средней Азии. — Тр.Геол. ин-та, 1936, т. 5, с. 161—171.

Брик М.И. Мезозойская флора Камыш-Баши. Ташкент: Узбгиз, 1941.

Брик М.И. Ископаемая флора и стратиграфия нижнемезозойских отложений бассейна среднего течения р. Илек в Западном Казахстане. М.: Госгеолиздат, 1952.

Буракова А.Т. Флора юрских отложений Туаркыра. — Тр.ВСЕГЕИ. Новая сер., 1963, т.88. Проблема нефтегазоносности Средней Азии, вып. 13, с. 117—224.

Буракова А.Т. Новые ааленские растения из Западной Туркмении. — Палеонтол. журн., 1966, № 3, с. 139—144.

Быстрицкая Л.И. Материалы к изучению юрских отложений Центрального Кузбасса. — В кн.: Палеонтология и стратиграфия Западной Сибири. Томск: Томск. ун-т, 1972, с. 1—64.

Быстрицкая Л.И. Растительные комплексы в юрских отложениях Кузбасса. — Тр. Томск.ун-та, 1974, т. 227, с. 31—49.

Василевская Н.Д. Новые нижнеюрские растения из Восточной Ферганы. — Ежегодн. Всесоюз.палеонтол.о-ва, 1956, т. 15, с. 23—31.

Василевская Н.Д. Некоторые новые представители хвойных из нижнемеловых отложений северной части Ленского угольного бассейна. — В кн.: Сборник статей по палеонтологии и биостратиграфии. Л.: НИИГА, 1957, вып. 6, с. 84—93.

Василевская Н.Д. Голосеменные растения из угленосных отложений Сангарского района. — Там же, 1959а, вып. 15, с. 56—88.

Василевская Н.Д. Кейтониевые и цикадовые из угленосных отложений Сангарского района (Ленский угленосный бассейн). — Там же, 1959б, вып. 14, с. 48—70.

Василевская Н.Д. Гинкговые из нижнемеловых отложений низовья р. Лены (Булунский район Ленского угленосного бассейна). — Тр.НИИГА, 1960, т. 111, с. 149—181.

Василевская Н.Д. Некоторые раннемеловые растения Жиганского района (Ленский угленосный бассейн). — Учен.зап.НИИГА. Палеонтол. и биостратиграф., 1966, вып. 15, с. 49—76.

Василевская Н.Д., Абрамова Л.Н. Материалы к познанию раннемеловой флоры Ленского бассейна. — Там же, 1966, вып. 16, с. 73—96.

Василевская Н.Д., Павлов В.В. Стратиграфия и флора меловых отложений Лено-Олекского района угленосного бассейна. — Тр.НИИГА, 1963, т. 128. Проблемы нефтегазоносности Арктики, II, с. 1—96.

Вахрамеев В.А. Цикадовые из альбских отложений Западного Казахстана. — Бюл. МОИЛ. Отд-ние.геол., 1948, № 5, с. 123—129.

Вахрамеев В.А. Стратиграфия и ископаемая флора меловых отложений Западного Казахстана. — В кн.: Региональная стратиграфия СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1952, т. 1, с. 340.

Вахрамеев В.А. Стратиграфия и ископаемая флора юрских и меловых отложений Вилюйской впадины и прилегающей части Приверхоянского краевого прогиба. — Там же, 1958, т. 3, с. 136.

Вахрамеев В.А. Нижнемеловые растения с оз. Ханка (Приморье). — Бот.журн., 1959, т. 44, № 7, с. 997—1000.

Вахрамеев В.А. Новые раннемеловые цикадофиты Якутии. — Палеонтол.журн., 1962, № 3 с. 123—129.

Вахрамеев В.А. Первая находка беннеттитового Dictyozamites в мезозое Сибири. — Там же, 1970, № 4, с. 120—123.

Вахрамеев В.А., Блинова Е.В. Новая раннемеловая флора Станового хребта. — Там же, 1971, № 1, с. 88—94.

Вахрамеев В.А., Васина Р.А. Нижнеюрская и ааленская флоры Северного Кавказа. — Там же, 1959, № 3, с. 125—133.

Вахрамеев В.А., Долуденко М.П. Верхнеюрская и нижнемеловая флора Буреинского бассейна и ее значение для стратиграфии. — Тр.ГИН АН СССР, 1961, вып. 54, с. 132.

Вахрамеев В.А., Самылина В.А. Первая находка в СССР представителя рода Pachypteris. — Бот.журн., 1958, т. 43, № 11, с. 1611—1612.

Владимирович В.П. Первые находки рода Anthrophyopsis в верхнетриасовых отложениях СССР. — Там же, 1958, т. 43, № 12, с. 1761—1762.

Владимирович В.П. К изучению позднетриасовой — раннеюрской флоры Восточного Урала. — Там же, 1959, т. 44, № 4, с. 457—466.

Владимирович В.П. Остатки некоторых представителей рода Thinnfeldia из рэтских отложений Восточного Урала. — Ежегодн. Всесоюз. палеонтол. о-ва, 1965 (1957—1964), т. 17, с. 238—261.

Владимирович В.П. О среднетриасовой флоре Оренбургского Приуралья. — Тр.Ин-та геол. и геохим.Уральск.науч.центра АН СССР, 1972, вып. 96, с. 87—98.

Владимирович В.П., Лебедев В.М., Попов Ю.Н. и др. Стратиграфия триасовых отложений Средней Сибири. — В кн.: Стратиграфия мезозоя и кайнозоя Средней Сибири. М.: Наука, 1967, с. 7—30.

Генкина Р.З. Ископаемая флора среднеюрских угленосных отложений Восточно-Уральского месторождения Орского буроугольного бассейна. М.: Изд-во АН СССР, 1963а.

Генкина Р.З. Цикадофиты из юрских отложений Согутинского района на южном берегу озера Иссык-Куль. — В кн.: Палеонтология и стратиграфия нефтегазоносных областей СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1963б, с. 192—199.

Генкина Р.З. Cycadocarpidium Nathorst и Fraxinopsis Wieland из отложений Акташской свиты верхнего триаса — южного побережья озера Иссык-Куль в Киргизии. — В кн.: Биостратиграфия и палеогеография мезо-кайнозоя нефтегазоносных областей Юго-Востока СССР. М.: Наука, 1964, с. 69—78.

Генкина Р.З. Ископаемая флора и стратиграфия нижнемезозойских отложений Иссык-Кульской впадины (Северная Киргизия). М.: Наука, 1966.

Голова Т.Ф. Ископаемые растения из Кемчугского буроугольного месторождения Чулымо-Енисейского угленосного бассейна. Палеонтология Западной Сибири. — Тр.Томск.ун-та, Сер.геол., 1948, т. 99. с. 75—118.

Голова Т.Ф. Юрские растения из района Соболевского месторождения Чулымо-Енисейского угленосного бассейна. — Там же, 1954, т. 132, с. 43—66.

Гомолицкий Н.П. О некоторых видах юрской флоры Ферганского хребта. — Бот. журн., 1961, т. 46, № 3, с. 396—399.

Гомолицкий Н.П. Podocarpophyllum — новый род хвойных из юрских угленосных отложений Ангрена в Средней Азии. — Там же, 1962, т. 47, № 7, с. 1029—1032.

Гомолицкий Н.П. О строении эпидермы Czekanowskia latifolia Tur.-Ket. — Там же, 1963а, т. 48, № 12, с. 1828—1830.

Гомолицкий Н.П. Новые юрские хвойные из юго-западных отрогов Гиссарского хребта. — Там же, 1963б, т. 49, № 10, с. 1430—1437.

Гомолицкий Н.П. Новые среднеюрские папортники и гинкговые из Гиссарского хребта. — Палеонтол.журн., 1965, № 1, с. 125—132.

Гомолицкий Н.П. Новые юрские растения Яккабагских гор. — Бот.журн., 1969, т. 54, № 10, с. 1531—1539.

Гомолицкий Н.П. Новые юрские цикадофиты из Ангрена (Узбекская ССР). — Там же, 1974, т. 59, № 8, с. 1199—1203.

Гомолицкий Н.П., Курбатов В.В., Сикстель Т.А. Новые материалы к характеристике рода Pachypteris. — Палеонтол.журн., 1962, № 2, с. 166—167.

Гуров А.В. К геологии Екатеринославской и Харьковской губерний. Харьков, 1882.

Делле Г.В. Гинкговые (Ginkgoales) из юрских отложений Ткварчельского угленосного бассейна в Закавказье. — Бот.журн., 1959а, т. 44, № 1, с. 87—91.

Делле Г.В. Новый род Ptiloctenia из юрских отложений Закавказья. — Там же, 1959б, т. 44, № 6, с. 819—822.

Делле Г.В. Среднеюрская флора Ткварчельского угленосного бассейна (Закавказье). — Тр.Ботан.ин-та АН СССР. Сер. 8. Палеоботаника, 1967, вып. 6, с. 51—132.

Добрускина И.А. Новые юрские цикадофиты Верхнего Амура. — Палеонтол.журн., 1964, № 2, с. 132—142.

Добрускина И.А. О присутствии гигантоптерид на территории СССР. — Докл. АН СССР, 1966, т. 171, № 5, с. 1187—1190.

Добрускина И.А. Род Scytophullum (морфология, эпидермальное строение и систематическое положение). — В кн.: Птеридоспермы верхнего палеозоя и мезозоя: Вып. 190, 1969, с. 35—58 (Тр.Геол.ин-та АН СССР).

Долуденко М.П. Новые виды Ptilophyllum из юры Западной Украины. — Ботан. журн., 1963а, т. 48, № 6, с. 796—805.

Долуденко М.П. Новый вид Sciadopitytes из юрских отложений Западной Украины. — Палеонтол. журн., 1963б, № 1, с. 123—126.

Долуденко М.П. Новые виды рода Pagiophyllum из юры юга СССР. — Ботан.журн., 1966а, т. 51, № 2, с. 250—253.

Долуденко М.П. О строении эпидермиса листьев некоторых Podozamites. — Палеонтол.журн., 1966, № 2, с. 133—136.

Долуденко М.П. О соотношении родов Thinnfeldia и Pachypteris. — Тр.Геол.ин-та АН СССР, 1969, вып. 190, с. 14—34.

Долуденко М.П. Thinnfeldia — младший синоним Pachypteris. — Палеонтол.журн., 1971, № 1, с. 99—104.

Долуденко М.П. Первые находки листьев рода Sphenozamites в верхней юре СССР. — Ботан.журн., 1974, т. 59, № 4, с. 560—564.

Долуденко М.П. Новое видовое название Elatocladus turutanovae nom.nov. — Палеонтол.журн., 1978, № 1, с. 146.

Долуденко М.П., Делле Г.В., Свинидзе Ц.И. Первые неходки в СССР представителей рода Paracycas Harris. — Ботан.журн. 1968, т. 53, № 7, с. 912—920.

Долуденко М.П., Лебедев Е.Л. Ginkgoites sibirica и "G.huttonii" Восточной Сибири. — В кн.: Мезозойские растения Восточной Сибири (гинкговые и чекановскиевые), 1972, с. 80—101. (Тр.Геол.ин-та АН СССР; вып. 230).

Долуденко М.П., Орловская Э.Р. Юрская флора Каратау. —Тр. Геол.ин-та АН СССР, 1976, вып. 284, с. 260.

Долуденко М.П., Рассказова Е.С. Гинкговые и чекановскиевые Иркутского бассейна. — В кн.: Мезозойские растения Восточной Сибири (гинкговые и чекановскиевые), 1973, с. 7—33. (Тр.Геол.ин-та АН СССР; вып. 230).

Долуденко М.П., Сванидзе Ц.И. Некоторые юрские Ptilophyllum — Украины и Грузии и связь их с индийскими видами этого рода. — В кн.: Гондвана. М.: Наука, 1964, с. 111—112.

Долуденко М.П., Сванидзе Ц.И. Позднеюрская флора Грузии. — Тр.Геол.ин-та АН СССР, 1969, вып. 178, с. 116.

Долуденко М.П., Сванидзе Ц.И. Новый вид Anthrophyopsis из Грузии. — Ботан. журн., 1970, т. 55, с. 559—562.

Ефимова А.Ф. О меловом возрасте некоторых "кайнозойских" отложений Алазейского плато. — В кн.: Материалы по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР, 1963, № 16, с. 302—305.

Ефимова А.Ф., Терехова Г.П. О возрасте гинтеровской свиты в бухте Угольной. — В кн.: Материалы по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР, 1966, вып. 19, с. 63—76.

Залесский М.Д. О Cordaites aequalis Goepp. из Сибири и о тождестве его с Noeggerathiopsis hislopi Bunb.sp. — Тр.Геол.ком., Новая серия, 1912, вып. 86, с. 1—21.

Залесский М.Д. Палеозойская флора Ангарской серии. — Там же, 1918, вып. 174, с. 1—76.

Залесский М.Д. Распространение ископаемой флоры, родственной гондванской в пределах северной части Евразии. — Изв. АН СССР. Отделение мат.-естеств. наук, 1930, № 9, с. 913—930.

Иминов Я.Х. К вопросу систематики некоторых видов юрских нильссоний. — Узб.биол.журн., 1967, № 3, с. 43—47.

Иминов Я.Х. Некоторые юрские растения Средней Азии и Северного Афганистана. — В кн.: Палеоботаника Узбекистана. Ташкент: ФАН, 1968а, т. 1, с. 95—104.

Иминов Я.Х. Новый вид Tyrmia abdullaevii Iminov из юрских отложений юго-западных отрогов Гиссарского хребта. — Узб.геол.журн., 1968б, № 2, с. 79—81.

Иминов Я.Х. Несколько новых раннемезозойских цикадофитов из Средней Азии. — В кн.: Вопросы геологии и нефтегазоносности Узбекистана. Ташкент: Фан, 1971, вып. 3, с. 7—17.

Иминов Я.Х. Цикадофиты позднего триаса и юры Средней Азии и их значение для стратиграфии. Ташкент: Фан, 1976.

Киричкова А.И. Два новых вида растений из мезозойских отложений Восточного Урала. — Докл. АН СССР, 1960, т. 131, № 4, с. 948—950.

Киричкова А.И. Новые материалы к триасовой флоре Среднего Урала. — В кн.: Палеонтология, 1962а, сб. 3, с. 458—467. (Тр.ВНИГРИ; вып. 196).

Киричкова А.И. Флористические комплексы угленосного мезозоя Челябинского бассейна. — Там же, 1962б, вып. 196, с. 471—494.

Киричкова А.И. О находке нижнеюрской флоры в Восточной Сибири. — В кн.: Геология и нефтегазоносность Западной Якутии. Л., 1966, с. 120—127. (Тр. ВНИГРИ; Вып. 249).

Киричкова А.И. Материалы к изучению нижнемезозойской флоры Восточного Урала. — Тр.ВНИГРИ, 1969, вып. 268, с. 270—349.

Киричкова А.И. О родовой принадлежности листьев Tyrmia cingulata Burak. из среднеюрских отложений Туаркыра и Мангышлака. — В кн.: Биостратиграфия мезозоя осадочных бассейнов СССР. Л., 1974, с. 123—132. (Тр.ВНИГРИ; Вып. 350).

Киричкова А.И., Сластенов Ю.Л. Стратиграфия и флора нижнемеловых отложений р. Леписке (Западное Приверхоянье). — Тр.ВНИГРИ, 1966, вып. 249, с. 147—181.

Киричкова А.И., Тесленко Ю.В. Ископаемые растения из нижнемеловых отложений Западно-Сибирской низменности. — В кн.: Биостратиграфия мезозойских и третичных отложений Западной Сибири, 1962, т. 1, с. 223—229. [Тр.Сиб.науч.-исслед. ин-та геол., геофиз. и минер. сырья (СНИИГГИМС); Т. 22].

Ковальчук Г.М. Палеоботаническая характеристика нижнемезозойских отложений Кендерлыкской мульды. — Тр.Лабор.геол.угля АН СССР, 1961, вып. 12, ч. 1, с. 207–218.

Кочиркевич Т.Н. Новый вид микростробила с пыльцой in situ из нижнего мела Буреинского бассейна. — Палеонтол.журн., 1974, № 1, с. 117–121.

Кошман М.М. Новые раннемеловые папортники и цикадофиты Удского прогиба (Западное Приохотье). — Там же, 1970, № 3, с. 124–130.

Красилов В.А. Новые данные о меловой флоре Среднего Сихотэ-Алиня. — Там же, 1961, № 3, с. 132–133.

Красилов В.А. Новые голосеменные из нижнего мела Приморья. — Там же, 1964, № 1, с. 114–119.

Красилов В.А. Араукариевые из нижнего мела Приморья. — Там же, 1965а, № 2, с. 109–117.

Красилов В.А. Новые хвойные из нижнемеловых отложений Приморья. — Бот.журн., 1965б, т. 50, № 10, с. 1450–1455.

Красилов В.А. Раннемеловая флора Южного Приморья и ее значение для стратиграфии. М.: Наука, 1967, с. 264.

Красилов В.А. Таксономическая ревизия рода Tyrmia Prynada. — В кн.: Ископаемая фауна и флора Дальнего Востока. 1. Владивосток, 1969, с. 95–116.

Красилов В.А. Эволюция и систематика хвойных. — Палеонтол.журн., 1971, № 1, с. 7–20.

Красилов В.А. Мезозойская флора реки Буреи (Ginkgoales и Czekanowskiales). М.: Наука, 1972, с. 150.

Красилов В.А. Материалы по стратиграфии и палеофлористики угленосной толщи Буреинского бассейна. — В кн.: Ископаемые флоры и фитостратиграфия Дальнего Востока. Владивосток, 1973, с. 28–51.

Красилов В.А., Шорохова С.А. Новые триасовые растения из бассейна р. Имана (Приморье) и некоторые вопросы морфологии мезозойских птеридофиллов. — В кн.: Триасовые беспозвоночные и растения востока СССР. Владивосток, 1970, с. 98–123.

Красилов В.А., Шорохова С.А. Раннеюрская флора реки Петровки (Приморье). — В кн.: Ископаемые флоры и фитостратиграфия Дальнего Востока. Владивосток, 1973, с. 13–27.

Криштофович А.Н. Юрские растения Уссурийского края. — Тр.Геол.ком. Новая сер., 1910, вып. 56, с. 1–23.

Криштофович А.Н. Растительные остатки мезозойских угленосных отложений восточного склона Урала. — Изв.Геол.ком., 1912, т. 31, № 7, с. 489–498.

Криштофович А.Н. Растительные остатки из юрских отложений Крыма. — Зап. Крымск.о-ва естествоиспыт., 1913, т. 2, с. 41–45.

Криштофович А.Н. Юрские растения с р. Тырмы Амурской области. — Тр.Геол.музея АН СССР, 1914, т. 8, вып. 2, с. 79–124.

Криштофович А.Н. Растительные остатки из озерных юрских отложений Забайкалья. — Зап.Минерал. о-ва, 1915, Сер. 2, ч. 51, с. 77–93.

Криштофович А.Н. Материалы к познанию юрской флоры Уссурийского края. — Тр. Геол. и минерал.музея АН СССР, 1916, т. 2, вып. 4, с. 81–140.

Криштофович А.Н. Отчет о состоянии и деятельности Геологического комитета в 1916 году. — изв.Геол.ком., 1917, т. 36, с. 365.

Криштофович А.Н. Растительные остатки из озерных юрских отложений Забайкалья. — Зап.Минерал. о-ва, 1918. Сер. 2, ч. 51, вып. 1, с. 76–96.

Криштофович А.Н. Растительные отстатки из юрских сланцев на Северном Кавказе. — Изв. Геол.ком., 1926, т. 45, № 5, с. 597–608.

Криштофович А.Н. Отпечатки юрской флоры из Мариинской тайги. — Там же, 1927, т. 46, № 6, с. 560–565.

Криштофович А.Н. Открытие древнейших двудольных покрытосеменных и эквивалентов потомакских слоев на Сучане в Уссурийском крае. — Там же, 1929, т. 48, № 9, с. 1357–1386.

Криштофович А.Н. Ангарская свита Байкальский отдел. — Тр.Всесоюз.геол.-развед. объедин. НКТП СССР, 1933, вып. 326, с. 136.

Криштофович А.Н. Несколько пермских растений из Актюбинской области. — Бот. журн., 1949, т. 34, № 6, с. 629–631.

Криштофович А.Н. Избранные труды. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959–1966, т. I-III.
Криштофович А.Н. Шишка Pityostrobus burejensis Krysht. из мезозойских отложений Буреинского бассейна. — Докл. АН СССР, 1960, т. 131, № 5, с. 1147–1148.
Криштофович А.Н., Принада В.Д. Материалы к мезозойской флоре Уссурийского края. — Изв.Всесоюз.геол.-развед.объедин., 1932, т. 2, вып. 29, с. 363–373.
Криштофович А.Н., Принада В.Д. О верхнетриасовой флоре Армении. — Тр. Всесоюз. геол.-развед.объедин., 1933а, вып. 336, с. 1–26.
Криштофович А.Н., Принада В.Д. О раг-лейасовой флоре Челябинского буроугольного бассейна Восточного Урала. — Там же, 1933б, вып. 346, с. 1–40.
Криштофович А.Н., Принада В.Д. Определитель мезозойской флоры СССР. Л.; М.: Новосибирск, ОНТИ, 1934.
Лебедев Е.Л. Позднеюрская флора р. Зеи и граница юры и мела. — Тр. Геол.ин-та АН СССР, 1965, вып. 125, с. 142.
Лебедев Е.Л. Сибирские цикадовые из группы Heilungia. — В кн.: Растения мезозоя, 1968, с. 41–54. (Тр. ГИН АН СССР; Вып. 191).
Лебедев Е.Л. Юрские растения Западного Приохотья. — Палеонтол. журн., 1973, № 4, с. 84–94.
Лебедев Е.Л. Альбская флора и стратиграфия нижнего мела Западного Приохотья. — Тр.Геол.ин-та АН СССР, 1974, вып. 254, с. 147.
Лебедев И.В. Юрская флора. — В кн.: Атлас руководящих форм ископаемых фауны и флоры Западной Сибири. М.: Госгеолтехиздат, 1955, т. 2, с. 157–180.
Лебедев И.В. Новые растения из юрских отложений Кузнецкого бассейна. — В кн.: Материалы по геологии Западной Сибири, Томск, 1962, вып. 63, с. 193–202.
Маркович Е.М. Нижнемезозойские ископаемые растения бассейна среднего течения р. Илек. — В кн.: История нижнемезозойского угленакопления в Казахстане, 1961а, ч. 2, с. 145–156. (Тр. Лабор.геол.угля АН СССР; Вып. 13).
Маркович Е.М. Нижнемезозойские ископаемые растения южной части Магнитогорского синклинория. — Тр.Лабор.геол.угля АН СССР, 1961б, вып. 12, ч. 1, с. 82–96.
Маркович Е.М. Юрская флора и растительность Орь-Илекского района. Л.: Наука, 1971.
Материалы по палеонтологии. Новые семейства и роды. Нов.сер., вып. 12, М.: Госгеолтехиздат, 1956, с. 356.
Могучева Н.К. Новые виды гинкговых и хвойных из нижнетриасовых отложений Тунгусского бассейна. — Тр. СНИИГГИМС, 1972, вып. 146, с. 111–116.
Могучева Н.К. Раннетриасовая флора Тунгусского бассейна. — Там же, 1973, вып. 154, с. 3–112.
Моисеев А.С. О растениях из юрских отложений Крыма (предварительное сообщение). — Изв.Геол.ком., 1925, т. 44, с. 563–569.
Моисеев А.С. Новая находка юрских растений в Крыму. — Там же, 1926, т. 45, № 5, с. 585–589.
Нашекин В.Д. Ископаемая древесина Xenoxylon latiporosum из нижнемеловых отложений Красноярского края. — В кн.: Материалы по геологии и полезным ископаемым Красноярского края, 1961, вып. 1, с. 184–186.
Нашекин В.Д. Ископаемые древесины из меловых отложений. — В кн.: Биостратиграфия мезозойских и третичных отложений Западной Сибири. Л.: Гостоптехиздат, 1962а, т. 1, с. 282–294. (Тр. СНИИГГИМС; Вып. 22).
Нашекин В.Д. Ископаемые древесины из юрских отложений. — Там же, 1962б, с. 161–164.
Нашекин В.Д. Ископаемые древесины из меловых, третичных и четвертичных отложений Средней Сибири. Новосибирск: Наука, 1968.
Нейбург М.Ф. Юрские растения с р. Омолона. — Тр. Совета по изучению производ.сил. Сер.якутская, 1932, вып. 11, с. 73–78.
Нейбург М.Ф. К стратиграфии и возрасту угленосных отложений Танну-Тувинской народной республики. — Тр.Геол.ин-та, 1936а, т. 5, с. 129–159.
Нейбург М.Ф. К стратиграфии угленосных отложений Кузнецкого бассейна. — Изв. АН СССР. Отд-ние мат. и естеств.наук, 1936б, вып. 4, с. 469–510.
Нейбург М.Ф. Палеоботаническое обоснование триасовых угленосных отложений Печорского бассейна. — Докл.АН СССР, 1959, т. 127, № 3, с. 681–684.
Нематулаев С., Худайбердыев Р. Юрские древесины Муяна (Южная Фергана). — В кн.: Палеоботаника Узбекистана. Ташкент: Фан, 1968, т. 1, с. 88–94.

Никишова В.М. Новые виды ископаемой флоры из юрских отложений Ферганы. — В кн.: Юрские, меловые и палеогеновые отложения запада Средней Азии. М.: Наука, 1970, с. 34—38.

Новопокровский П.В. Материал к познанию юрской флоры долины р. Тырма (Амурская область). — В кн.: Геологические исследования и разведочные работы по линии Сибирской ж.д.. СПб., 1912, вып. 32, с. 1—35.

Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М.: Госгеолтехиздат, 1960, вып. 1, ч. 1, с. 612.

Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М.: Недра, 1968, вып. 2, ч. 1, с. 478.

Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М.: Наука, 1972.

Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. — Тр.ВНИГРИ, 1973, вып. 318.

Орловская Э.Р. Материалы по юрской флоре Майкюбеньского угольного бассейна. — В кн.: Материалы по истории развития фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата, 1958, т. 2, с. 117—142.

Орловская Э.Р. Находки Pseudotorellia и Eretmophyllum в юрских отложениях Казахстана. — Бот.журн., 1962, т. 47, № 10, с. 1437—1445.

Орловская Э.Р. Нижнемезозойская флора Восточного Казахстана. — Тр.Ин-та геол. наук АН КазССР, 1968, т. 23, с. 64—75.

Орловская Э.Р. Представители Brachyphyllum и Pagiophyllum в поздней юре хребта Каратау. — В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата, 1971, т. 5, с. 66—86.

Орловская Э.Р. Юрская флора из Илийского угленосного бассейна. — В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата, 1971, т. 6, с. 93—107.

Орловская Э.Р. К раннемезозойской флоре бассейна р. Илек. — В кн.: Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата, 1977, т. 7 с. 106—125.

Основы палеонтологии. Голосеменные и покрытосеменные. М.: Изд-во АН СССР, 1963.

Первецтов А.С. Флористическая характеристика нижнемеловых песчаников Карова. — Тр. МГРИ, 1947, т. 22, с. 192—208.

Пименова Н.В. Ценоманская флора окрестностей г. Канаева. — Геол. журн., АН УССР, 1939, т. 6, вып. 1—2, с. 229—243.

Полевой атлас характерных комплексов фауны и флоры триасовых отложений Приморского края. М.: Госгеолтехиздат, 1954.

Полевой атлас юрской фауны и флоры Северо-Востока СССР. Магадан, 1968.

Принада В.Д. О растительных остатках из мезозойских отложений Самарской луки. — Изв.Геол.ком., 1927, т. 46, № 8, с. 965—978.

Принада В.Д. Новые находки нижнемеловых растений в пределах европейской части СССР. — Ежегодн.Русск.палеонтол.о-ва, 1928а, т. 7, с. 135—138.

Принада В.Д. О строении кутикулы у листьев Phoenicopsis. — Изв. Геол.ком., 1928б, т. 47, № 4, с. 411—420.

Принада В.Д. Юрская флора северных предгорий Саура (Южный Алтай). — Изв.Геол. ком., 1929, т. 48, № 4, с. 139—141.

Принада В.Д. Материалы к познанию мезозойской флоры Средней Азии. — Тр. Главн. геол.-развед.Упр., 1931, вып. 122, с. 1—54.

Принада В.Д. Нижнемеловая флора из Латненского района Центрально-Черноземной области. — В кн.: Материалы Центр. науч.-исслед.геол.-развед.ин-та. Палеонтология и стратиграфия, 1933а, сб. 1, с. 43—53.

Принада В.Д. Юрские растения Ткварчельского угленосного бассейна в Закавказье. — Тр.Всесоюз.геол-развед.объедин., 1933б, вып. 261, с. 1—39.

Принада В.Д. Древнемезозойские растения Памира. — Тр.Таджикской компл.экспедиции АН СССР, 1932, г., 1934, вып. 9, с. 1—99.

Принада В.Д. Юрские растения из бассейна р. Нарын в Средней Азии. — Тр.Кирг. комплексной экспед. 1932—1933 гг. М.: Изд-во АН СССР, 1935, т. 1, ч. 4, с. 215—230.

Принада В.Д. К изучению нижнемеловой флоры Воронежской области. — Ежегодн.Всерос.палеонтол.о-ва, 1937, т. 2, с. 71—89.

Принада В.Д. Материалы к познанию мезозойской флоры бассейна р. Колымы. — В кн.: Материалы по изучению Колымско-Индигирского края. Сер. 2. Геология и геоморфология, 1938а, вып. 13, с. 1—67.

Принада В.Д. Материалы к юрской флоре Эмбинского района.— В кн.: Проблемы палеонтологии. М.: Изд-во МГУ, 1938б, т. 4, с. 363–405.
Принада В.Д. О нахождении на Урале верхнетриасовых растений замечательной сохранности. — Сов.ботаника, 1940, № 4, с. 23—27.
Принада В.Д. Мезозойская флора Восточной Сибири и Забайкалья. Атлас. – Тр. Иркутск.ун-та: Сер.геол., 1951, т. 6, вып. 1, с. 1—37.
Принада В.Д. Мезозойская флора Восточной Сибири и Забайкалья. М.: Госгеолтехиздат, 1962.
Принада В.Д. Ископаемая флора корвунчанской свиты бассейна р. Н.Тунгуски. М.: Наука, 1970.
Просвирякова З.П. Палеоботаническая характеристика угленосных отложений Южной Якутии. — Тр.Лабор.геол. угля АН СССР, 1961, вып. 11, с. 122—175.
Просвирякова З.П. Юрская флора Мангышлака и ее значение для стратиграфии. М.; Л.: Наука, 1966.
Радченко Г.П. Некоторые растительные остатки из района Осташкиных гор в Кузнецком бассейне. — В кн.: Материалы по геологии Западно-Сибирского края, 1936, № 35, с. 1—24.
Рейс О. Фауна рыбных сланцев Забайкальской области. — В кн.: Геологические исследования и развитие работы по линии Сиб. ж.д. СПб., 1910, вып. 29, с. 1—68.
Романова Э.В. К юрской флоре Алакульской впадины. — В кн.: Материалы по истории развития фауны и флоры Казахстана. Алма-Ата, 1958, т. 2, с. 143–146.
Романова Э.В. Материалы к познанию юрской флоры Боролдайского угольного месторождения. — Там же, 1961, т. 3, с. 104—120.
Романовский Г.Д. Материалы для геологии Туркестанского края. 1878, вып. 1; 1884, вып. 2; 1890, вып. 3. СПб., 1878—1890.
Савицкая Л.И. О флоре поздней юры Ферганы. — Палеонтол.журн., 1969, № 1, с. 143–146.
Самсонов С.К. Ископаемая флора Итемир-Джаракудукской впадины. — В кн.: Юрские, меловые и палеогеновые отложения запада Средней Азии. М.: Наука, 1970а, с. 46—541.
Самсонов С.К. Флора из меловых отложений Кульджук-Тау. — Там же, 1970б, с. 34—38.
Самылина В.А. Два новых вида гинкговых изнижнемеловых отложений р.Алдана. — Бот.журн., 1956а, т. 41, № 10, с. 1525—1527.
Самылина В.А. Мезозойская флора нижнего течения р. Алдана: Автореф. дис. канд. биол.наук. Л., 1956б, с. 1—24.
Самылина В.А. Новые цикадофиты из мезозойских отложений р. Алдана. – Бот.журн., 1956в, т. 41, № 9, с. 1334—1339.
Самылина В.А. Эпидермальное строение листьев рода Sphenobaiera. 1. — Докл. АН СССР, 1956 г, т. 106, вып. 3, с. 537—539.
Самылина В.А. Новые данные о нижнемеловой флоре Южного Приморья. — Бот. журн., 1961, т. 46, № 5, с. 634—645.
Самылина В.А. Мезозойская флора нижнего течения р. Алдана. -- Тр. Бот. ин-та АН СССР. Сер. 8. Палеоботаника, 1962, вып. 4, с. 59—139.
Самылина В.А. К нижнемеловой флоре среднего Сихотэ-Алиня. — Бот. журн., 1964а, т. 19, с. 1286—1287.
Самылина В.А. Мезозойская флора левобережья р. Колымы (Зырянский угленосный бассейн). Ч. 1. Хвощовые, папоротники, цикадовые, беннеттитовые. — Тр. Бот. ин-та АН СССР. Сер. 8. Папоротники, 1964б, вып. 5, с. 39—80.
Самылина В.А. Мезозойская флора левобережья р. Колымы (Зырянский угленосный бассейн). Ч. 1Г. Гинкговые, хвойные. Общие главы. — Тр. Бот. ин-та АН СССР. Сер. 8. Палеоботаника, 1967а, вып. 6, с. 133—176.
Самылина В.А. О заключительных этапах истории рода Ginkgo L. в Евразии. — Бот. журн. 1967б, т. 52, № 3, с. 303—316.
Самылина В.А. Систематика рода Phoenicopsis. — В кн.: Мезозойские растения Восточной Сибири. — Тр. Геол. ин-та АН СССР, 1972, вып. 230, с. 44—81.
Самылина В.А. Меловая флора Омсукчана (Магаданская область). Л.: Наука, 1976.
Самылина В.А., Филиппова Г.Г. К систематике рода Heilungia. — Палеонтол. журн., 1973, № 1, с. 80—87.

Свандзе Ц.И. Pseudocycas colchica Pryn. и Cloughtonia rugosa Halle из флоры батских отложений Ткибули. — Уч. зап. Азерб. ун-та. Сер. геол.-геогр., 1961, № 3, с. 47—53.

Свандзе Ц.И. Ископаемая флора нижнеюрских отложений окрестностей сел. Шроша (Западная Грузия). — Изв. Геол. о-ва Грузии, 1965, т. 4, вып. 2, с. 25—36.

Свандзе Ц.И. Новый вид рода Ginkgo из нижнелейасовых отложений Грузии. — Уч. зап. Азерб. ун-та. Сер. геол.-геогр., 1971, № 1, с. 88—92.

Свандзе Ц.И. Новый вид рода Pterophyllum из среднеюрских отложений Грузии. — Сообщ. АН ГрузССР, 1973а, т. 72, № 1, с. 117—120.

Свандзе Ц.И. Новый вид рода Sphenobaiera из батских отложений Гелати. — Сообщ. АН ГрузССР, 1973б, т. 72, № 2, с. 401—402.

Свешникова И.Н. Ископаемые хвойные Вилюйской синеклизы. — Тр. Бот. ин-та. Сер. 8. Палеоботаника, 1967, вып. 6, с. 177—203.

Свешникова И.Н., Будянцев Л.Ю. Nansenia — новый род семейства Pinaceae из нижнего мела Земли Франца-Иосифа. — Палеонтол. журн. 1967, № 3, с. 123—125.

Свешникова И.Н., Будянцев Л.Ю. Ископаемые флоры Арктики. 1. Палеозойские и мезозойские флоры Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа и острова Новая Сибирь. Л.: Наука, 1969.

Сикстель Т.А. Открытие палеозойской флоры с Gigantopteris в Фергане. — Докл. АН СССР, 1949, т. 66, № 5, с. 925—928.

Сикстель Т.А. Юрская флора каменноугольного месторождения Фан-Ягноб. — Тр. Ин-та геологии АН ТаджССР, 1952, т. II. Сталинабад, с. 1—103.

Сикстель Т.А. Материалы к познанию юрской флоры угольного месторождения Ангрен. — Тр. Ин-та геол. АН УзССР, 1953а, вып. 7. Палеонтология и стратиграфия Средней Азии, сб. 2, Ташкент, с. 41—56.

Сикстель Т.А. Материалы к стратиграфии юрских угленосных отложений Ягмана в Туркменской ССР. — Там же, 1953б, с. 117—135.

Сикстель Т.А. Материалы к стратиграфии юрской толщи каменноугольного месторождения Кок-Янгак. — Там же, 1953в, с. 69—94.

Сикстель Т.А. Prynadaia, Madygenopteris, Madygenia, Kryshtofovichiella. — В кн.: Материалы по палеонтологии. Новые семейства и роды. М.: Госгеолтехиздат, 1956, с. 219—253.

Сикстель Т.А. Морфологические особенности позднепермских и раннетриасовых растений Южной Ферганы, обусловленные экологическими причинами. — Тр. III сессии Всесоюз. палеонтол. о-ва, Л., 1959, с. 166—173.

Сикстель Т.А. Стратиграфия континентальных отложений верхней перми и триаса Средней Азии. — Тр. Ташкент. ун-та. Нов. сер., 1960, вып. 176. Геол. науки, кн. 13, Ташкент, с. 146.

Сикстель Т.А. Представители гигантоптерид и некоторые сопутствующие им растения из Мадыгенской свиты Ферганы. — Палеонтол. журн., 1961, № 1, с. 151—158.

Сикстель Т.А. Флора поздней перми и раннего триаса в Южной Фергане. — В кн.: Стратиграфия и палеонтология Узбекистана и сопредельных районов. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1962, кн. 1, с. 284—414.

Сикстель Т.А. К фитостратиграфии перми Средней Азии. Ташкент: Фан, 1966.

Сикстель Т.А. Новые виды голосеменных Средней Азии. — В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М.: Недра, 1968, вып. 2, ч. 1, с. 86—90.

Сикстель Т.А., Кузичкина Ю.М., Савицкая Л.И. и др. К истории развития гинкговых в Средней Азии. — В кн.: Палеоботаника Узбекистана. Ташкент: Фан, 1971, Т. 2, с. 62—116.

Сикстель Т.А., Савицкая Л.И., Худайбердыев Р. и др. Юрские растения из опорных разрезов Кугитанга и Шураба. — В кн.: Палеонтологическое обоснование опорных разрезов юрской системы Узбекистана и сопредельных районов, 1971, № 10, с. 164—201.

Сикстель Т.А., Худайбердыев Р. О флорах прошлого Средней Азии. — В кн.: Палеоботаника Узбекистана. Ташкент: Фан, 1968, т. 1, с. 1—87.

Сребродольская И.Н. О расчленении монгугайской свиты Южного Приморья по палеоботаническим данным. — Докл. АН СССР, 1958, т. 118, № 1, с. 171—173.

Сребродольская И.Н. Новые материалы по монгугайским флорам Южного Приморья. — Информ. сб. ВСЕГЕИ, 1960, № 24, с. 107—116.

Станиславский Ф.А. Ископаемая флора батско-келловейских отложений Донецкого бассейна и Днепровско-Донецкой впадины. Киев: Изд-во АН УССР, 1957.

Станиславский Ф.А. Ископаемая флора и стратиграфия верхнетриасовых отложений Донбасса (рэтская флора с. Райского). Киев: Наукова думка, 1971.

Станиславский Ф.А. Новый род Toretzia из верхнего триаса Донбасса и его отношение к родам порядка Ginkgoales. — Палеонтол. журн., 1973, № 1, с. 88—96.

Станиславский Ф.А. Среднекейперская флора Донецкого бассейна. Киев: Наукова думка, 1976.

Сьюорд А.Ч. Юрские растения Кавказа и Туркестана. — Тр. Геол. ком. Нов. сер., 1907, вып. 38, с. 48.

Сьюорд А. Юрские растения из Китайской Джунгарии. — Там же, 1911, вып. 75, с. 61.

Сьюорд А. Юрские растения из Амурского края. — Там же, 1912, вып. 81, с. 34.

Сьюорд А., Томас Г. Юрские растения из Балаганского уезда Иркутской губернии. — Там же, 1911, вып. 73, с. 21.

Тесленко Ю.В. Материалы к изучению среднеюрской флоры окрестностей Красноярска. — Тр. Сиб. научн.-исслед. ин-та геол., геофиз. и минер. сырья, 1960, вып. 8, с. 144—159.

Тесленко Ю.В. Юрские растения Западной Сибири. — В кн.: Биостратиграфия мезозойских и третичных отложений Западной Сибири. П., 1962, Т. 1, с. 108—157. (Тр. СНИИГГИМС: Т. 22).

Тесленко Ю.В. Находка стробила Williamsoniella в верхнеюрских отложениях Западной Сибири. — Палеонтол. журн., 1964, № 2, с. 160—162.

Тесленко Ю.В. К геологической истории лиственниц и лжелиственниц. — Там же, 1970а, № 2, с. 98—104.

Тесленко Ю.В. Стратиграфия и флора юрских отложений Западной и Южной Сибири и Тувы. — Тр. СНИИГГИМ. Сер. Палеонтол. и стратиграф. 1970б, вып. 42, с. 270.

Тесленко Ю.В. Растительные остатки из верхних горизонтов шадоронской серии в Восточном Забайкалье и их стратиграфическое значение. — В кн.: Биостратиграфия бореального мезозоя. Новосибирск: Наука, с. 134—142. (Тр. Ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР, 1974; Вып. 136).

Тесленко Ю.В., Могучева Н.К. К изучению юрской флоры Улугхемского угольного бассейна в Туве. — Геол. и геофиз., 1965, № 10, с. 80—88.

Томас Г. Юрская флора Каменки в Изюмском уезде. — Спб. тр. Геол. ком., 1911, вып. 71, с. 91.

Турутанова-Кетова А.И. Юрская флора хребта Каратау. — Тр. Геол. музея АН СССР, 1930, т. 6, с. 172.

Турутанова-Кетова А.И. Материалы к познанию юрской флоры бассейна оз. Иссык-Куль в Киргизской АССР. — Там же, 1931, т. 8, с. 311—356.

Турутанова-Кетова А.И. Материалы к стратиграфии Чак-Пакского каменноугольного района в Южном Казахстане. Тр. Геол. ин-та АН СССР, 1936а, т. 5, с. 85—116.

Турутанова-Кетова А.И. Otozamites turkestanica и Pseudocycas dubius из юрских отложений хребта Каратау (Казахстан). — Там же, 1936б, т. 5, с. 177—195.

Турутанова-Кетова А.И. Материалы к вопросу о стратиграфии и возрасте угольного месторождения Мангыстау Казахской ССР. Ч. 2. Голосеменные. — Учен. зап. ЛГУ, № 70. Сер. геол.-почв. наук, 1944, вып. 11, с. 67—90.

Турутанова-Кетова А.И. Некоторые юрские семена и цветки голосеменных из Средней Азии и Южного Казахстана. — В кн.: Вопросы палеонтологии. Л.: Изд-во ЛГУ, 1950, т. 1, с. 273—347.

Турутанова-Кетова А.И. Флористическая характеристика некоторых нижнемезозойских продуктивных толщ восточного склона Среднего Урала. — Бот. журн., 1958, т. 43, № 5, с. 664–678.

Турутанова-Кетова А.И. Williamsoniacea Советского Союза. — Тр. Бот. ин-та АН СССР. Сер. 8. Палеоботаника, 1963, вып. 4, с. 7–55.

Турутанова-Кетова А.И. Новый юрский птеридосперм Средней Азии. — В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М.: Недра, 1968, вып. 2, ч. 1, с. 18–21.

Филиппова Г.Г. Меловые растения из бассейна рек Паляваам и Яблон. — Колыма, Магадан, 1972, № 7, с. 43–46.

Филиппова Г.Г. Новые меловые растения из бассейна р. Паляваам. — Там же, 1972б, № 2, с. 36–38.

Филиппова Г.Г. Позднеюрские цикадофиты из континентальных отложений бассейна р. Большого Анюя. — В кн.: Материалы по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР. Магадан, 1972в, вып. 20, с. 279–282.

Филиппова Г.Г. Флора нижнемеловых отложений Умкувеемской и Айнакхургенской впадины. — Там, же, 1975, вып. 22, с. 23–35.

Хахлов В.А. Юрская группа Ginkgoales Иркутского угленосного бассейна. — Изв. Томск. технол. ин-та, 1923, т. 64, вып. 3, с. 33–52.

Хахлов В.А. Ископаемые растения Иркутского угленосного бассейна. — Изв. Сиб. отд-ния Геол. ком., 1924, т. 4, вып. 2, с. 1–39.

Хахлов В.А. Растительные остатки Олонского района. — Изв. Томск. технол. ин-та, 1926, с. 8–16.

Хахлов В.А. Материалы к познанию возраста продуктивной толщи Кузнецкого каменноугольного бассейна. — Изв. Зап-Сиб. отд-ния геол. ком., 1929, т. 8, вып. 4, с. 1–32.

Хахлов В.А. Юрская флора из Кузнецкого бассейна. — Тр. Науч.-исслед. угольного ин-та Востокуголь. Сер. Г, 1931, вып. 3, с. 1–43.

Херасков Н.П., Давыдова Т.Н., Крашенинников Г.Ф., Пенинский Д.Д. Геология Буреинского бассейна. — Тр. Всесоюз. ин-та минерал. сырья, М.; Л.: 1939, вып. 149. с. 3–176.

Храмова С.Н. Род Scytophyllum. — В кн.: Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. 1973, с. 8–9. (Тр. ВНИГРИ; Вып. 318).

Храмова С.Н. Триасовая флора бассейна р. Печоры и ее значение для стратиграфии. — Тр. ВНИГРИ, 1977, вып. 380, с. 71.

Худайбердыев Р., Гомолицкий Н.П., Лобанова А.Н. Материалы к юрской флоре Южной Ферганы. — В кн.: Палеоботаника Узбекистана, Ташкент: Фан, 1971, т. 2, с. 3–61.

Частникова Л.С. Несколько новых юрских растений из Южной Ферганы. — Тр. Ин-та геол. Киргиз. филиал АН, 1952, вып. 3, с. 3–14.

Шапаренко К.К. Ближайшие предки Ginkgo biloba L. — Тр. Бот. ин-та АН СССР, Сер. 1, 1936, вып. 2, с. 5–32.

Шведов Н.А. Некоторые представители триасовой флоры Восточного Таймыра. — В кн.: Сборник статей по палеонтологии и биостратиграфии. Л.: НИИГА, 1958, вып. 7, с. 56–78.

Шведов Н.А. О наличии остатков раннемезозойской флоры на Западном Таймыре. — Там же, 1960а, вып. 20, с. 55–65.

Шведов Н.А. Раннемезозойские растения с реки Фадью-Куда (Таймырский полуостров). — Там же, 1960б, вып. 21, с. 77–83.

Шведов Н.А. Новые раннетриасовые растения из Норильского района. — Там же, 1963, вып. 32, с. 59–62.

Шилкина И.А. Ископаемые древесины Арктики. 1. Araucariopitys haraulachica sp. n. из нижнеюрских отложений Хараулахских гор (Верхоянский хребет). — Бот. журн., 1958, т. 43, № 9, с. 1316–1319.

Шилкина И.А. Древесина нового рода и вида хвойных из нижнемеловых отложений Земли Франца-Иосифа. — Палеонтол. журн., 1960, № 1, с. 113–117.

Шилкина И.А. Ископаемые древесины Земли Франца-Иосифа. — Тр. Ботан. ин-та АН СССР. Сер. 8. Палеоботаника, 1967, вып. 6, с. 29–50.

Шилкина И.А., Худайбердыев Р. Новые находки и обзор родов Protocedroxylon и Xenoxylon. — В кн.: Палеоботаника Узбекистана. Ташкент: Фан, 1971, т. 2, с. 117—232.

Шмальгаузен И. Юрская флора Кузнецкого бассейна и Печорского края. — Зап. Минерал. о-ва, сер. 2, 1881, ч. 16, с. 97—178.

Шорохова С.А. Новые осмундовые папоротники из верхнего триаса Приморья. — Палеонтол. журн., 1975, № 4, с. 106—110.

Штемпель Б.М. Представители флоры из никанских отложений Хабаровского района. — Вестн. ДВ филиала АН СССР, 1938, № 29, с. 71—76.

Эйхвальд Э. Геогнозия преимущественно в отношении к России. СПб, 1846.

Andrews E.B. Descriptions of fossil plants from the coal measures of Ohio. — Ohio Geol. Surv. Rept,. 1875, vol. 2, Geol. and Palaeontol., part 2, p. 415—426.

Antevs E. Die liassische Flora des Horsandsteins. — Kgl. sven. vetenskap akad. handl., 1919, Bd. 59, N 8, S. 1—71.

Arber E.A.N. The earlier Mesozoic floras of New Zealand. — N.Z. Geol. Surv. Palaeontol. Bull., 1917, N 6, p. 1—80.

Archangelsky S. Fossil Gingoales from the Tico Flora, Santa Cruz Province, Argentina. — Brit. Mus. (Natur. Hist.) Bull. Geol., 1965, vol. 10, N 5, p. 121—137.

Arnold C.A., Lowter J.S. A new cretaceous conifer from Northern Alaska. — Amer. J. Bot., 1955, vol. 42, N 6, p. 522—528.

Bell W.A. Lower Cretaceous floras of Western Canada. — Mem. Geol. Surv. Canada, 1956, N 285, p. 1—331.

Berger A.C. Die Versteinerungen der Fischer und Pflanzen im Sandsteine der Coburger Gegend. Coburg, 1832.

Berry E.W. Systematic palaeontology of the Lower Cretaceous deposits of Maryland. — In: Lower Cretaceous. Baltimore: Maryland Geol. Surv., 1911, p. 173—597.

Bertrand P. Etudes gites mineraux de la France, Bassin houiller de la Sarre et de la Lorraine. — Flore fossile, 1932, part 2, Alethopteridees, p. 31—60.

Black M. Drifted plant-beds of the Upper Estuarine Series of Yorkshire. — Quart. J. Geol. Soc., Lond., 1929, vol. 85, p. 389—437.

Bornemann J.B. Uber organische Reste der Lettenkohlengruppe Thüringens. Leipzig, 1856.

Bowerbank I.S. A history of the fossil fruits and seeds of the London Clay. London, 1840.

Braun C.F.W. Verzeichniss der in der Kreis-naturalien Sammlung zu Bayreuth befindlichen Petrefacten. Leipzig, 1840.

Braun C.F.W. Die fossilen Gewachse aus den Grenzschichten zwischen dem Lias und Keuper des neu aufgefundenen Pflanzenlagers in dem Steinbruch von Veitlahm bei Gulmback. — Flora, 1847, vol. 30, S. 81—87.

Braun C.F.W. Weltrichia eine neue Gattung fossiler Rhizantheen. — Flora, 1849, Bd. 7, S. 705—712.

Brauns D. Der Sandstein bei Seinstedt unweit des Fallsteins und die in ihm vorkommenden Pflanzenreste. — Palaeontographica, 1862, Bd. 9, Lief. 2, S. 47—62.

Brongniart A. Sur la classification et la distribution des vegetaux fossiles en general, et sur ceux des terrains de sediment superieur en particulier. — Mem. Mus. nat. hist. natur. (Paris), 1822, vol. 8, p. 203—348.

Brongniart A. Observations sur les vegétaux fossiles renfermés dans les Gres de Hoer en Scanie. — Ann. sci. nature, ser. I, 1825, vol. 4, p. 200—219.

Brongniart A. Histoire des vegetaux fossiles on recherches botaniques et geologiques sur les vegetaux renfermes dans les diverses couches du globe. Paris, 1828—1838, vol. I, p. 1—488 (1828—1836); vol. 2, p. 1—72 (1837—1838).

Brongniart A. Prodrome d'une histoire des vegetaux fossiles. — Diction. sci. Natur., 1828, vol. 57, p. 16—212.

Brongniart A. Tableau des genres de vegetaux fossiles considérés sous le point de vue de leur classification botanique et de leur distribution geologique. — Diction. univ. hist. natur., 1849, vol. 13, p. 1—127 (52—176).

Bronn H.G. Index Palaeontologicus oder Ubersicht der bis jetzt bekannten Fossilen Organismen. Stuttgart, 1848.

Bronn H.G. Beitrage zur triassichen Fauna und Flora der bituminosen Schiefer von Raibl. — Neues Jahrb. Mineral. Geol. und Palaontol., 1858, S. 132, 129—144.
Buckland W. On the Cycadeoideae, a family of fossil plants found in the Oolite quarries of the Isle of Portland. — Geol. Soc. London Trans. Ser. 2, 1828, vol. 2, p. 395—401.
Bunbury C.J.F. On some fossil plants from Jurassic strata of the Yorkshire Coast. — Quart. J. Geol. Soc. London, 1857, vol. 7, p. 179—194.
Carruthers W. On Beania, a new genus of cycaden fruit, from the Yorkshire oolites. — Geol. Mag., 1869, vol. 6, p. 97—99.
Carruthers W. On fossil Cycadean stems from the secondary rocks of Britain. — Linnean Soc. London Trans., 1870, vol. 26, p. 675—708.
Chang C. A new Xenoxylon from North China. — Bull. Geol. Soc. China, 1929, vol. 8, N 3, p. 15—24.
Conwentz H. Sobre algunos arboles fosiles del Rio Negro. — Acad. nac. cienc. Cordoba Bol., 1885, vol. 7, p. 435—456.
Doludenko M.P. On the relation of the genera Pachypteris, Thinnfeldia and Cycadopteris. — In: Symposium on Morphological and Stratigraphical Palaeobotany, Birbal Sahni Inst. Palaeobotany, Lucknow. Lucknow, 1974, p. 8—16.
Dunker W. Monographie der Norddeutschen Wealdenbildung. Braunschweig, 1846.
Dutt C.P. Pityostrobus macrocephalus L. and H. — a Tertiary cone showing ovular structures. — Ann. Bot., 1916, vol. 30, p. 529—549.
Eckhold W. Die Hoftüpfel bei rezanten und fossilen Coniferen. — Preuss. Geol. Landesanst. Jahrb., 1922, Bd. 42, S. 472—505.
Echwald E. Lethaea Rossica ou Paleontologie de la Russie. Periode moyenne. Stuttgart, 1860—1868, t. 2, partie 1, p. 7—71.
Endliecher S. Genera plantarum. Vienna, 1836—1840.
Endlicher S. Synopsis Coniferarum. Sangalli, 1847.
Ettingshausen C.V. Beitrag zur naheren Kenntniss der Flora der Wealden Periode. — Abh. Kgl.-k. geol. Reichsanst. Wien, 1852a, Bd. 1, Abt. 1, S. 1—32.
Ettingshausen C.V. Bergrundung einiger neuer oder nicht genau bekanten arten der Lias und der Oolithen Flora. — Abh. Kgl.-k. geol. Reichsanst. Wien, 1825b, Bd. 1, Abt. 3, S. 1—10.
Feistmantel O. Jurassic (Oolitic) flora of Kach. — Mem. Geol. Surv. India, Palaeontol. Indica, 1876a, vol. 2, part 1, p. 1—80.
Feistmantel O. Notes on the age of some fossil floras of India. — Rec. Geol. Surv. India, 1876b, vol. 9, part 3, p. 63—79.
Feistmantel O. Paleontologische Beitrage. Part I. Uber die Indischen Cycadeengattungen Ptilophyllum Morr. und Dictyzamites Oldh. — Palaeotographica, 1876c, Bd. 23, Suppl. 3, N 3, S. 1—24.
Feistmantel O. Flora of the Jabalpur Group (Upper Gondwanas), in the Son-Narbada reigion. — Mem. Geol. Surv. India, Palaeontol. indica, 1877a, vol. 2, part 2, p. 1—25.
Feistmantel O. Upper Gondwana flora of the outliers or the Madras Coast. — Mem. Geol. Surv. India, Palaeontol. indica, 1879, vol. 1, part 4, p. 191—224.
Feistmantel O. The flora of the Damuda-Pancet division. — Mem. Geol. Surv. India, Palaeontol. indica, 1880, vol. 3, part. 2—3, p. 1—77.
Florin R. Preliminary description of some Palaeozoic genera of Coniferae. — Ark. bot., 1927, vol. 21 A, p. 1—7.
Florin R. Uber Nilssoniopteris grandulosa n. sp., eine Benntettitaceae aus der Juraformation Bornholms. — Ark. bot., 1933, Bd. 25 A, N 20, S. 1—19.
Florin R. Die fossilen Ginkgophyten von Fran-Joseph Land nebst Erorterungen uber verschiedene Cordaitales mesozoischan Alters. I. Spezieller Teil. — Palaeontographica, 1936, Bd. 81, Abt. B, Lief. 3—6, S. 71—173.
Florin R. On Jurassic taxads and conifers from North-Western Europe and Eastern Greenland. — Acta horti berg., 1958, vol. 17, N 10, p. 1—402.
Fontaine W.M. The Potomac or younger Mesozoic flora. — Monogr. U.S. Geol. Surv., 1889, vol. 15, p. 1—337.
Fox-Strangways C., Barrow G. The Jurassic rocks of Britain. I. Yorkshire. — Mem. Geol. Surv. U.K., 1892.

Gagel C. Über einige Bohrere gebnisse und ein neues Pflanzenführendes Interglazial aus der Gegend von Elmshorm. – Preuss. geol. Landesanst. Jahrb., 1904, Bd. 25, S. 246–281.

Geinitz H.B. Charakteristik der Schichten und Petrefacten des sachsischböhmischen Kreidegebierges. Dresden; Leipzig, 1839–1842.

Geinitz H.B. Nacktrage zur Dryas 1. – Kgl. mineral. geol. praehist. Dresden Mitt., 1880, Bd. 30, S. 1–43.

Geyler H.T. Über fossile Pflanzen aus der Juraformation Japans. – Palaontographica, 1877, Bd. 24, S. 221–232.

Goeppert H.R. Die fossilen Farrenkrauter (Systema filicum fossilium). – Nova acta leopold., 1836, Bd. 17, S. 1–486.

Goeppert H.R. Die Gattungen der fossilen Pflanzen. Bonn, 1841–1846, Lief. 1–6.

Goeppert H.R. Uber die fossilen Cycadeen überhaupt, mit Rücksicht auf die in Schlesien vorkommender Artn: Übersicht Arbeiten Verander. Schlesischen Ges, für Vaterl. Kultur in Jahre 1843. Breslau, 1844, S. 114–144.

Goeppert H.R. Description des vegetaux fossiles recueillis par M.P. de Tchihatcheff en Scherie. – In: Tchihatcheff P. Voyage scientifique dans l'Altai Orient et les parties adjacentes de la frontiere de la China. Paris, 1845, p. 379–390.

Goeppert H.R. Monographic der fossilen Coniferen. – Holland. Maatsch. wet. nat. verh., 1850, Bd. 6, S. 1–73.

Goeppert H.R. Fossile Flora des Übergangsgebirges. – Nova acta leopold., 1852, Bd. 22, S. 1–299.

Goeppert H.R. Die fossila Flora der Permischen Formation. Cassel, 1864–1865.

Goeppert H.R., Menge A. Die Flora der Bernsteins und ihre Beziehungen zur Flora der Tertiarformation und der Gegenwart. Danzig, 1883, vol. 1.

Gothan W. Zur Anatomie lebender und fossile Gymnospermen Holzer. – Preuss. Geol. Landesanst. Abh., N.S., 1905, N 44, S. 1–108.

Gothan W. Die fossilen Hölzer von Konig Karls Land. – Kgl. sven. vetenskap akad. handl., 1907, Bd. 42, S. 1–44.

Gothan W. Die fossilen Hölzreste von Spitzbergen. – Kgl. Sven. vetenskab. akad. handl., 1910, Bd. 45, N 2, S. 1–56.

Gothan W. Uber die Gattung Thinnfeldia Ettingshausen. – Natur. Ges. Nurnberg, Abh., 1912, Bd. 19, S. 67–80.

Gothan W. Die Unter-liassische (rhätische) Flora der Umgegend von Nürnberg. – Abh. naturhist. Ges. Nurnberg, 1914, Bd. 19, N 4, S. 17–39.

Grant C.W. Memoire to illustrate a geological map of Cutch. – Geol. Soc. London Trans. Ser. 2, 1840, vol. 5, part 2, p. 289–330.

Halle T.G. On the Swedich species of Sagenopteris Presl and on Hydropterangium nov. gen. – Kgl. sven. vertenskapakad handl., 1910, Bd. 45, N 7, S. 1–15.

Halle T.G. Cloughtonia, a problematic fossil plant from the Yorkshire Oolite. – Ark. Bot., 1911, vol. 10, N 14, p. 1–6.

Halle T.G. The Mesozoic flora of Graham Land: Schwedisch Südpolar Expedition. Nordenskjold wissenschaftliche Ergebnisse 1901–1903. Stockholm, 1913, Bd. 3, Lief. 14, S. 1–123.

Halle T.G. Fossil plants from South-Eastern China. – Palaeont. sinica. Ser. A, 1927, vol. 1, fasc. 2, p. 1–21.

Harris T.M. The Rhaetic flora of Scoresby Sound. – Medd. Gronland, 1926, bd. 68, s. 45–147.

Harris T.M. The fossil flora of Scoresby Sound, East Greenland. Part 2. Description of seed plants incertae sedis, together with a discussion of certain cycadophyte cuticles. – Medd. Grønland, 1932a, bd. 85, N 3, s. 1–112.

Harris T.M. The fossil flora of Scoresby Sound, East Greenland. Part 3. Caytoniales and Bennettitales. – Medd. Grønland, 1932h, bd. 85, N 5, s. 1–133.

Harris T.M. The fossil flora of Scoresby Sound, East Greenland. Part. 4. – Medd. Grønland, 1935, bd. 112, N 1, s. 1–176.

Harris T.M. The fossil flora of Scoresby Sound, East Greenland. Part 5. Stratigraphic relations of the plant beds. – Medd. Grønland, 1937, bd. 112, N 2, S. 112.

Harris T.M. On some Jurassic species of Sagenopteris. – Ann. Mag. Natur. Hist. Ser. 11, 1940, vol. 6, N 33, p. 249–265.

Harris T.M. Notes on the Jurassic flora of Yorkshire. — Ann. Mag. Natur. Hist. Ser. 11, 1944, vol. 11, N 82, p. 661–630.
Harris T.M. Notes on the Jurassic flora of Yorkshire. — Ann. Mag. Natur. Hist. Ser. 12, 1949, vol. 2, p. 275–299.
Harris T.M. Notes on the Jurassic flora of Yorkshire. — Ann. Mag. Natur. Hist. Ser. 12, 1952, vol. 5, p. 614–627.
Harris T.M. Conifers of the Taxodiaceae from the Wealden formation of Belgium. — Mem. Inst. Roy. Sci. Natur. Belg. Bruxelles, 1953a, N 126, p. 1–43.
Harris T.M. Notes on the Jurassic flora of Yorkshire. — Ann. Mag. Natur. Hist. Ser. 12, 1953b, vol. 6, p. 33–52.
Harris T.M. The Yorkshire Jurassic flora. Part 2. Caytoniales, Cycadales, Pteridosperms. London: Brit. Mus. (Natur. Hist.), 1964.
Hartz N. Plantaforsteninger fra Kap Stewart i Ostgronland. — Med. Gronland, 1896, bd. 19, s. 1–215.
Heer O. Die Urwelt der Schweiz. Zurich, 1865.
Heer O. Beitrage zur Kreide-Flora. I. Flora von Moletein in Mahren. — Neue Denkschr. allgem. schweiz. Ges. Naturw., 1869, Bd. 23, S. 1–24.
Heer O. Die Kreida-Flora der arctischen Zone. — In: Flora fossilis arctica. Zurich, 1874, Bd. 3, H. 2, S. 1–140.
Heer O. Beitrage zur fossilen Flora Spitzbergens. — In: Flora fossilis arctica, Zurich, 1876a, Bd. 4, H. 1, S. 1–141.
Heer O. Beitrage zur Jura-Flora Ostsidiriens und des Amurlandes. — In: Flora fossilis arctica. Zurich, 1876b, Bd. 4, H. 2, S. 1–122.
Heer O. Die vorweltliche Flora der Schweiz. Zurich, 1877.
Heer O. Beitrage zur Fossilen Flora Sibiriens und des Amurlandes. — In: Flora fossilis arctica. Zurich, 1878a, Bd. 5, H. 2, S. 1-58.
Heer O. Miocene Flora des Insel Sachalin. — In: Flora fossilis arctica. Zurich, Bd. 5, 1878b, S. 1–61.
Heer O. Die miocene Flora des Grinnell-Landes. — In: Flora fossilis arctica. Zurich, 1878c, Bd. 5, H. 1, S. 1–38.
Heer O. Nachträge zur Jura-Flora Sibiriens. — In: Flora fossilis arctica. Zurich. 1880, Bd. 6, S. 1–34.
Heer O. Contributions a la flore fossile du Portugal. Lisbon, 1881a, p. 1–51.
Heer O. Zur Geschichte der Ginkgo-artigen Baume. — Bot. Jahrb. Leipzig, 1881b, Bd. 1, S. 1–13.
Heer O. Die fossile Flora Gronlands. — In: Flora fossilis arctica. Zurich, 1882, Bd. 6, Theil, 1, S. 1–112.
Heer O. Die fossile Flora Gronlands. — In: Flora fossilis arctica. Zurich, 1883, Bd. 7, Teil, 2, S. 1–275.
Hirmer M. Zur Kenntniss von Cycadopteris Zigno. — Palaeontographica, 1924, Bd. 66, Lief. 4, S. 127–162.
Hisinger W. Lethaea suecica sen Petrificata sueciae, iconibus et characteribus illustrata. Stockholm, 1837.
Holden R. Contributions to the anatomy of Mesozoic conifers. I. Jurassic coniferous woods from Yorkshire. — Ann. Bot., 1913, vol. 27, p. 534–545.
Holden R. On the cuticles of some Indian conifers. — Bot. Gaz., 1915, vol. 60, p. 215–227.
Hollick A. The Upper Cretaceous floras of Alaska. — U.S. Geol. Surv. Prof. Pap, 1930, N 159, p. 1–116.
Houlbert C. Les bois des Faluns de Touraine. — Feuilla jeun. natur., 1910, t. 40, 70–76.
Jacob K., Shukla B.N. Jurassic plants from the Saighan series of Northern Afganistan and their palaeoclimatological significance. — Palaeontol. indica, N.S., 1955, vol. 33, N 2, p. 1–64.
Jaeger G.F. Uber die Pflanzenversteinerungen welche in dem Bausandstein von Stuttgart. vorkommen. Stuttgart, 1827.
Jeffrey E.C. Araucariopitys, a new genus of araucarians. — Bot. Gaz., 1907, vol. 44, p. 435–444.

Johansson N. Die rhätischen Flora der Kohlengrube bei Stabbarp and Skromberga in Schonen. – Kgl. sven. vetenskapakad. handl., 1922, Bd. 63, N 5, S. 1–78.

Jongmans W., Gothan W. Die palaobotanischen Ergebnisse der Djambi-Expedition 1925. – Jaarb. mijnwezen Nederlandsch–Oost-Indie, 1930, Jaarg., 1935, Bd. 59, S. 72–201.

Kawasaki S. Some older mesozoic plants in Korea. – Bull. Geol. Surv. Chosen (Korea), 1925, vol. 4, part 1, p. 1–71.

Kawasaki S. The flora of the Heian System. Part 1. – Bull. Geol. Surv. Chosen (Korea), 1927, vol. 6, N 1, p. 1–15.

Krasser F. Die von Obrutshew in China und Centralasien 1893–1894 gesammelten fossilen Pflanzen. – Denkschr. Kais. Kgl. Akad. Wiss., 1900, Bd. 70, S. 1–16.

Krasser F. Fossile Pflanzen aus Transbaikalien der Mongolei und Mandschurei. – Akad. Wiss. Wien Denkschr., 1905, Bd. 78, S. 589–634.

Krassilov V.A. Dirhopalostachyaceae a new family of Proangiosperms and its bearing on the problem of Angiosperm ancestry. – Palaeontographica, 1975, Bd. 153, Abt. B, Lief. 1–3, S. 100–110.

Krassilov V.A. Contributions to the knowledge of the Caytoniales. – Rev. Palaeobot. and Palynol., 1977, vol. 24, p. 155–178.

Krausel R. Die Ginkgophyten der Trias von Lunz in Nieder–Osterreich und von neue Welt bei Basel. – Palaeontographica, 1943, Bd. 87, Abt. B, S. 59–63.

Krausel R. Die fossilen Koniferen Holzer. – Palaeontographica, 1949, Bd. 89, Abt. B, S. 83–203.

Krausel R., Schaarschmidt F. Die Keuperflora von Neuewelt bei Basel. IV. Pterophyllen und Taeniopteriden. – Schweiz. Palaontol. Abh. Basel. 1966, Bd. 84.

Kryshtofovich A.N. On the flower of Williamsonia sp., found near Vladivostok, and some other plants from the Maritime Province of the Asiatic Russia. – J. Geol. Soc. Tokyo, 1919, vol. 26, N 30, p. 1–5.

Kurr J.G. Beitrage zur fossilen Flora der Juraformation Würtemberg. Stuttgart, 1846, S. 1–21.

Leckenby J. On the sandstones and shales of the oolites of Scarborough, with description of some new species of fossil plants. – Quart. J. Geol. Soc. London, 1864, vol. 20, p. 74–82.

Lesquereux L. On the Cordaites and their related generic divisions in the carboniferous formation of the United States. – Amer. Phil. Soc. Proc., 1878, vol. 17, p. 315–355.

Lesquereux L. Description of coal flora of the carboniferous formation in Pennsylvania and throughout the United States. – Pennsylvania 2nd Geol. Surv. Rept. Progress P., 1880, vol. 1, p. 1–354.

Lignier O. Vegetaux fossiles de Normandie. IV Bois. Divers. – Mem Soc. Linn. Normandie, 1907, vol. 22, p. 240–332.

Lindley J., Hutton W. The fossil flora of Great Britain. London, 1831–1837, vol. I.

Lundblad A.B. Studies in the Rhaeto-Liassic flores of Sweden. Part I. Kgl. sven. vetenskapakad. handl. Ser. 4, 1950, vol. 1, N 8, p. 1–81.

MacClelland J. Report of the Geological Survey of India for the Season of 1848–1849. Calcutta, 1850.

Makarewiczowna A. Flora dolno-liasowa okolic Ostrowca. – Pr. zakl. geol. Univ. Wilne, 1928, vol. 4, N 3, p. 1–49.

Mantel G. The geology of the south-east of England. London, 1833.

Medlicott H.B., Blanford W.T. A manual of the geology of India chiefly compiled from the Observations of the Geological Survey. Calcutta, 1879, vol. 1.

Merckfin C. Palaeodendrologikon Rossicum: Ein Beitrag zur vorweltlichen Flora. St. Petersb., 1885, S. 27–76.

Miquel F.A.W. Over de rangschikking der fossiele Cycadeae. – Wiss. natuurk. wetensch., Amsterdam, Tijdschr., 1851, vol. 4, p. 205–227.

Moller H. Bidrag till Bornholms fossila flora. Gymnospermen. – Kgl. sven. vetenskapakad. handl., 1903, bd. 36, N 6, S. 1–56.

Morris J. Remarks upon the recent and fossil cycadeae. – Ann. Mag. Natur. Hist. London. Ser. 1, 1841, vol. 7, p. 110–120.

Morris J. Fossil Flora in Strzeleckl's: Physical Description of New South Walles and Van Diemens Land. London, 1845.

Münster G.G. Beitrage zur Petrefacten-Kunde. 1843, Teil 6, S. 1–100.
Murchison R., Verneuil E., Keyserling A. The geology of Russia in Europe and the Ural mountaine. London, 1845, vol. 1–2.
Nathorst A.G. Fossila växter fran den stenkolsforande formationen vid Palsjo i Skane. – Geol. foren. i Stockholm forhandl., 1875, bd. 2, N 103, s. 373–392.
Nathorst A.G. Bidrag till Sveriges fossila flora. – Kgl. sven. metenskabakad. handl., 1876, bd. 14, N 3, s. 1–82.
Nathorst A.G. Beitrage zur fossilen Flora schwedens: Uber einige rhatische Pflanzen von Palsjo in Schonen. Stuttgard, 1878a, S. 1–34.
Nathorst A.G. Om floran i Skanes Kolforande Bildningar. I. Floran vid Bjuf. – Sver. geol. undersokn., 1878b, s. 1–52.
Nathorst A.G. Om floran in Skanes Kolforande bildningar. II. Floran vid Höganäs och Helsingborg. – Kgl. sven. vetenskapakad. handl., 1878c, bd. 16, N 7, s. 1–53.
Nathorst A.G. Om de växtforande lagren i Skanes Kolforande bildningar och deras plats i lagerföljden. – Geol. foren. i Stockholm forhandl., 1880, N 62, bd. 5, N 6, s. 1–9.
Nathorst A.G. Berattelse, afgifen till Kongl. Vetenskaps-Akademien, om en med understod af allmanna medel utford vetenskaplig resa till Schweiz och Tyskland. – Kgl. vet. Akad. forhandl., 1881, N 1, s. 61–84.
Nathorst A.G. Om floran Skanes Kolforande bildningar. – Sver. geol. undersokn. Ser. C, 1886, N 85, p. 85–131.
Nathorst A.G. Beitrage zur Mesozoischen Flora Japan's. – Kgl. Akad. Wiss. Wien. Denkschr., 1890, Bd. 57, S. 43–60.
Nathorst A.G. Fossil plants from Franz Josef Land: Sci. Res. Norw. Polar. Exped. 1893–1896. Christiania, 1899, p. 1–26.
Nathorst A.G. Nachtragliche Bemerkungen uber die Mesozoische Flora Spitzbergens. – Kgl. vet. Akad. forhandl., 1897a, N 8, s. 383–387.
Nathorst A.G. Zur mesozoischen Flora Spitzbergens. – Kgl. sven. vetenskapakad. handl., 1897b, bd. 30, N 1, s. 1–77.
Nathorst A.G. Beitrage zur Kenntnis einiger mesozoischen Cycadophyten. – Kgl. sven. vetenskapakad. handl., 1902, bd. 36, N 4, s. 1–28.
Nathorst A.G. Om nagra Ginkgovaxter fran Kolgrufvorna vid Stabbarp i Skane. – Lunds Univer. Arsskruift. N.F., Af. 2, 1906, bd. 2, N 8, s. 3–16.
Nathorst A.G. Uber Trias und Jurapflanzen von der Insel Kotelny. – Зап. Акад. наук, сер. 8, 1907, т. 21, № 2, с. 3–17.
Nathorst A.G. Palaobotanische Mitteilungen, 4–6. – Kgl. Sven. vetenskapakad. handl., 1908, bd. 43, N 6, s. 1–32.
Nathorst A.G. Palaobotanische Mitteilungen, 8. – Kgl. Sven. vetenskapakad. handl., 1909, bd. 45, N 4, s. 1–37.
Nathorst A.G. Beitrage zur Geologie der Baren-Insel, Spitzbergens und des König-Karl-Landes. – Uppsala Univ. Geol. Inst. Bull., 1910, Bd. 10, S. 261–416.
Nathorst A.G. Neue Beitrage zur Kenntnis der Williamsonia Blüten. Palaobotanische Mitteilungen, 10. – Kgl. Sven. vetenskabakad. handl., 1911a, Bd. 46, N 4, S. 1–33.
Nathorst A.G. Uber die Gattung Cycadocarpidium Nathorst nebst einigen Bemerkungen über Podozamites: Palaobotanische Mitteilungen. 10. – Kgl. Sven. vetenskapakad. handl., 1911b, Bd. 46, N 8, S. 3–11.
Newton E.T., Teall J.J. Notes on a collection of rocks and fossils from Franz Josef Land. – In: A Thousand Days in the Arctic. London, 1897, vol. 2.
Nilsson S. Fossila växter funna i Skane och beskrifne. – Kgl. sven. Vetenskapakad. handl., 1832, p. 340–347.
Oischi S. The Rhaetic plants from the Nariwa district, prov. Bitchu (Okayama, prefecture), Japan. – J. Fas. Sci. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo. Ser. 4, 1932, vol. 1, N 3/4, p. 257–280.
Oishi S. Notes on some fossil plants from Tung-ning, prov. Pinchiang, Mandchoukou. – J. Fac. Sci. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo. Ser. 4, 1935, vol. 3, N 1, p. 79–85.
Oishi S. The mesozoic floras of Japan. – J. Fac. Sci. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo. Ser. 4, 1940, vol. 5, N 2/4, p. 123–480.
Oldham T., Morris J. The fossil flora of the Rajmahal series Rajmahal Hills, Bengal. – Palaeontol. indica. Ser. 2, 1863, vol. 1, N 1, p. 1–52.

Phillips J. Illustrations of the geology of Yorkshire: or, a description of the strata and organic remains of the Yorkshire Coast. Yorkshire, 1829.
Phillips J. Illustrations of the geology of Yorkshire: or, a description of the strata and organic remains of the Yorkshire Coast. London, 1875.
Pomel A. Materiaux pour servir, a la flore fossile des terrains jurassiques de la France. – Dtsch. Naturforsch. Artzte Amtliche Versamml., 1849, vol. 25, p. 332–354.
Potonie H. Abbildungen und Beschreibungen fossiler Pflanzen–Reste. Preuss. geol. Landesanst., 1906, Bd. 4, S. 61–80.
Potonie R. Uber einige Pflanzenreste aus dem Jura Persiens. – Inst. Palaobot. und Petrogr. Brennsteine Arb., 1933, Bd. 3, S. 247–250.
Raciborski M. Flora retycka Polnocnego stoku gor swietokrzyskich. – Pol. Akad. Rozprawy Wydzialu mat.-przyrodn. Umiejetnosci. Ser. 2, 1891, vol. 3, p. 292–326.
Reuss A.E. Die Versteinerungen der bohmischen Kreideformation. Stuttgart, 1845–1846.
Roemer F. Die Versteinerungen des norddeutschen Oolithgebirges. Hannover, 1836.
Rouilliers C., Vossinsky A. Etudes progressives sur la paleonto logie des environs de Moscou. Second etude. – Bull. Soc. Natur. Moscou, 1847, vol. 20, p. 371–447.
Sahni B., Rao A.R. On some Jurassic plants from the Rajmahal Hills. – J. Proc. Asiat. Soc. Bengal, 1933, vol. 27, p. 183–208.
Saporta G. Paleontologie francaise ou description des fossiles de la France, plants jurassiques. Paris, 1872–1873, vol. 1.
Saporta G. Paleontologie française ou description des fossiles de la France, plants jurassiques. Paris, 1873–1875, vol. 2.
Saporta G. Paleontologie française ou description des fossiles de la France, plants jurassiques. Paris, 1884, vol. 3.
Schenk A. Beitrage zur Flora des Keupers und der rhatischen Formation. – Naturforsch. Ges. Bamberg Ber., 1864, Bd. 7, S. 51–142.
Schenk A. Die fossile Flora de Grenzschichten des Keupers und Lias Frankens. Wiesbaden, 1867, Teil 4, S. 97–128; Teil 5, 6, S. 129–192.
Schenk A. Beitrage zur Flora der Vorwelt. III. Die fossilen Pflanzen der Wernsdorfer Schichten in den Nordkarpathen. – Palaontographica, 1869, Bd. 19, S. 1–34.
Schenk A. Beitrage zur Flora der Vorwelt. Die Flora der nordwestdeutschen Wealdenformation. – Palaeontographica, 1871, Bd. 19, S. 203–266.
Schenk A. Pflanzen aus der Steinkohlenformation, in Richthofen's China. Berlin, 1883, Bd. 4, N 2, S. 211–269.
Schenk A. Fossile Pflanzen aus der Albourskette. – Bibl. bot., 1887, N 6, p. 1–12.
Schenk A. Fossil Pflanzen: Wissensch. Ergebn. Reise Graphen Bela Szechenyi. Wien, 1899, Bd. 3, S.
Schimper W.P. Observations in Voltz "Notice sur la grés bigarre de la Carriere de Soultz–les–Bains". – Mem. Soc. mus. hist. natur., 1837, vol. 2, p. 9–14.
Schimper W.P. Traite de paleontologie vegetale ou la flore du monde primitif. Paris: J.B. Bailliere et fils, 1869–1874, vol. 1, p. 1–740 (1869); vol. 2, p. 1–968 (1870–1872); vol. 3, p. 1–896 (1874).
Schimper W.P., Schenk A. – In: Zittel's Handbuch der Palaeontologie. Teil II. Palaeophytologie. Leipzig, 1879–1890.
Schlotheim E.F. Natchträge zur Petrefactenkunde. Gotha, 1822–1823.
Schmalhausen J. Ein ferner Beitrage zur Kenntniss der Ursastufe Ostsibiriens. – Bull. Acad. Imp. St. Petersb., 1877, Bd. 25, N 4, S. 1–17.
Schmalhausen J. Beitrage zur Jura–Flora Russlands. – Mem. Acad. Sci. St.-Petersb. Ser. 7, 1879, Bd. 27, N 4, S. 1–96.
Seward A.C. The Wealden Flora. Part II. Gymnospermae. – In: Catalogue of the Mesozoic Plants in the Department of Geology. London: Brit. Mus (Natur. Hist.), 1895, part. 2.
Seward A.C. The Jurassic Flora. I. The Yorkshire Coast. – In: Catalogue of the Mesozoic Plants in the Department of Geology. London: Brit. Mus. (Natur. Hist.), 1900, part 3.
Seward A.C. The Jurassic Flora II. Liassic and Oolitic Floras of England. – In: Catalogue of the Mesozoic Plants in the Department of Geology. London: Brit. Mus (Natur. Hist.), 1904, part 4.

Seward A.C. A new genus of fossil plants from the Stormberg series of cape Colony. – Geol. Mag., 1911a, vol. 8, p. 298–299.
Seward A.C. The Jurassic flora of Sutherland. – Roy. Soc. Edinburgh Trans., 1911b, vol. 47, part 4, N 23, p. 643–709.
Seward A.C. Mesozoic plants from Afghanistan and Afghan-Turkesten. – Mem. Geol. Surv. India, Palaeontol. indica, N.S., 1912, vol. 4, N 4, p. 1–57.
Seward A.C. Fossil plants. Cambridge Univ. Press., 1917, vol. 3.
Seward A.C. Fossil plants. Cambridge Univ. Press., 1919, vol. 4.
Seward A.C. The Cretaceous plant–bearing rocks of western Greenland. – Roy. Soc. London Phil. Trans., 1926, vol. 215B, p. 57–174.
Seward A.C., Conway V.M. Additional Cretaceous plants from Western Greenland. – Kgl. sven. vetenskapakad. handl., 1935, vol. 15, p. 1–51.
Seward A.C., Sahni S. Indian Gondwana Plants. A revision. – Mem. Geol. Surv. India, Paleontol. indica, N.S., 1920, vol. 7, p. 1–54.
Shimakura M. Preliminary report on some Cretaceous plants from Karahuto. – J. Geol. Soc. Jap., 1936, vol. 43, p. 869–875.
Shimakura M. Studies on fossil woods from Japan and adjacent lands. – Tohoku Univ. Sci. Rept, Ser. 2, 1937, vol. 19, p. 1–73.
Sternberg G.K. Versuch einer geognostischen botanischen Darstellung der Flora der Vorswelt. Leipzig, Prague, 1820–1838, Bd. 1, Tentamen, S. 1–42.
Stopes M. The Cretaceous flora. Patr 2. Lower Greensand (Aptian) plants of Britain. – In: Catalogue Mesozoic plants in the Department of Geology. London: Brit. Mus. (Natur. Hist.), 1915, part 2.
Sze H.O. Beitrage zur liassiasche Flora von China . – Mem. Natur. Res. Inst. Geol. (Acad. sinica), 1931, N 12, p. 1–85.
Sze H.O. Beitrage zur mesozoischen Flora von China. – Palaeontol. sinica. Ser. A, 1933, Bd. 4, N 1, S. 1–91.
Sze H.O. Die mesozoischen Flora aus der Hsiangchi Kohlen Serie in Westhupeh. – Palaeontol. sinica, N.S. A, 1949, N 2, S. 1–71.
Sze H.O. Older Mesozoic plants from the Yunchang formation, Nordhern Schensi. – Palaeontol. sinica, N.S. A, 1956, N 5, p. 1–217.
Tateiwa J. Geological Atlas of Tyosen (Korea). Korea, 1929.
Thomas H.H. The fossil flora of the Cleveland district of Yorkshire. I. The flora of the Markske Quarry. – Quart. J. Geol. Soc. London, 1913a, vol. 69, p. 223–251.
Thomas H.H. On some new and rare Jurassic plants from Yorkshire – Eretmophyllum, a new type of ginkgoalian leaf. – Cambridge Phil. Soc. Proc., 1913b, vol. 17, p. 256–262.
Thomas H.H. On Williamsoniella, a new type of bennettitalean flower. – Rov. Soc. London Phil. Trans., 1915, vol. 207B, p. 113–148.
Thomas H.H. Caytoniales, a new group of angiospermous plants from the Jurassic rocks of Yorkshire. – Roy. Soc. London Phil. Trans., 1925, vol. 213, p. 299–363.
Thomas H.H. Further observations on the cuticle structure of Mesozoic Cycadean fronds. – Linnean Soc. London J. Bot., 1930, vol. 48, p. 389–415.
Trautschold H.A. Der Klin'sche Sandstein. Moscou, 1870, S. 15–142. – Ibid. Nouv. Mem. Soc. Nat. Moscou, 1871, vol. 13, livr. 3, p. 189–236.
Unger F. Einige interessante Pflanzenabdrücke aus der konige Petrefactensammlung in Munchen. – Bot. Z., 1849, Bd. 7, S. 345–353.
Unger F. Genera et species Plantarum fossilium. Vienna, 1850.
Velenovsky J. Die Gymnospermen der bohmischen Kreidoformation. Prague, 1885.
Vogellehner D. Untersuchungen zur Anatomik und Systematik der verkieselten Holzer aus dem frankischen und sudthüringischen Keuper. – Erlanger geol. Abh., 1965, Bd. 59, S. 1–76.
Walton J.M.A. On some fossil woods of Mesozoic and Tertiary age from the Arctic zone. – Ann. Bot., 1927, vol. 41, p. 239–252.
Ward L.F. Status of the Mesozoic Floras of the United States. The Older Mesozoic. – U.S. Geol. Surv., 20th Anniv. Rept, 1900, part 2, p. 213–430.
Ward L.F. Status of the Mesozoic Floras of the United States. – U.S. Geol. Surv. Mon., 1905, vol. 48, part 1, 2, p. 1–616.

Weiss Ch.E. Fossile der jungsten Steinkohlenformation und des Rothliegenden im Saar-Rhein-Gebiete, 1869, Teil 1, S. 1–100.
Weiss Ch.E. Studien über Odontopteriden. – Dtsch. geol. Ges. Z., 1870, Bd. 22, S. 853–888.
Wieland G.R. Antiquity of the angiosperms. – In: Proc. Internat. Congr. Plant Sci. Ithaca, 1929. New York, 1929, p. 429–456.
Yabe H. Notes on some Mesozoic plants from Japan, Korea and China. – Sci. Repts Tohoku Imp. Univ. Sendai, Ser. 2. Tokyo, 1922, vol. 7, N 1, p. 1–28.
Yabe H., Oishi S. Jurassic plants from the Fang–tzu Coal-Field Skantung. – Jap. J. Geol. and Geogr. Tokyo, 1928, vol. 6, N 1/2, p. 1–14.
Yabe H., Oishi S. Mesozoic plants from Manchuria. – Sci. Repts Tohoku Imp. Univ., Sendai. Ser. 2, 1933, vol. 12, N 2B, p. 195–238.
Yokoyama M. Jurassic plants from Kaga, Hida and Echizen. – J. Coll. Sci. Imp. Iniv. Tokyo, 1889, vol. 3, part 1, p. 1–66.
Yokoyama M. Mesozoic plants from Kozuke, Kii, Awa and Tosa. – J. Coll. Sci. Imp. univ. Tokyo, 1894, vol. 3, p. 201–231.
Yokoyama M. Mesozoic plants from China. – J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo, 1906, vol. 21, N 9, p. 1–39.
Zalessky M.D. Observations sur les végétaux nouveaux paléozoiques de Sibérie. – Soc. geol. Nord. Ann., 1932, vol. 57, p. 111–134.
Zalessky M.D. Observations sur les végétaux du terrain permien inférieur de l'Oural. Patr 2. – Bull. Acad. Sci. USSR, 1933, 7th ser., N 7, p. 1093–1103.
Zalessky M.D. Observations sur les végétaux permiens du bassin de la Petchora. Part 1. – Bull. Acad. Sci. USSR, 1934, N 2/3, p. 241–290.
Zalessky M.D. Sur la flore triasique de la rivière Sourakai en Bachkirie. – Probl. Paleontol., Moscow Univ. Paleontol. Lab. Publ., 1936, vol. 1, p. 245–250.
Zalessky M.D. Végétaux permiens du Bardien de l'Oural. – Пробл. палеонтол. М., 1939, т. 5, с. 329–374.
Zeiller R. Examen de la flore fossile des couches charbon du Tong-King. – Ann. Mines. Ser. 8, 1882, vol. 2, p. 299–352.
Zeiller R. Flore fossile des gîtes de Charbon du Tonkin. – In: Etude des gites minéraux de la France. Paris, 1903.
Zigno A. Sulle cicadee fossil dell'oolite. – Riv. period., 1853, vol. 1, p. 345–349.

УКАЗАТЕЛЬ
латинских наименований подродов и родов

A

Abietites 134
Agathopsis 134
Aipteris 5
Albertia 135
Aldania 55
Allicospermum 195
Amuriella 55
Androstrobus 55, 195
Angaridium 5
Angaropteridium 6
Anomozamites 23
Antevsia 6
Antholithes 195
Anthrophyopsis 56
Araucariodendron 135
Araucariopitys 135
Araucariostrobus 136
Araucarites 136, 196
Archaeolarix 137
Arctobaiera 120
Athrotaxites 137
Athrotaxopsis 137

B

Baiera 89
Baierella 94
Beania 56, 196
Borysthenia 138
Brachyphyllum 138
Bureja 27
Burejospermum 196
Butefia 78
Bysmatospermum 196

C

Callipteridium 6
Callipteris 6
Carpolithes 196
Caveophyllum 140
Caytonia 21
Caytoanthus 21
Cedroxylon 140
Cephalotaxopsis 140
Cephalotaxus 141
Chankanella 7
Cheirolepis 141
Chiropteris 7
Circoporoxylon 142
Cloughtonia 27
Comia 7
Compsopteris 7
Coniferites 142
Conites 142, 199
Crematosaccus 199
Ctenis 56
Ctenopteris 7
Ctenozamites 7
Culgoweria 121
Cupressinites 143
Cupressinocladus 143
Cupressinoxylon 143
Cupressocarpus 143, 200
Cycadeoidea 28
Cycadites 78
Cycadocarpidium 143, 200
Cycadolepis 28
Cycadopteris 8
Cycadospadix 80
Cyclopitys 145
Cyparissidium 145
Czekanowskia 121

D

Desmiophyllum 205
Dicroidium 8
Dictyozamites 29
Dioonites 60
Dirhopalostachys 60
Discostrobus 200
Doratophyllum 60
Drepanolepis 146, 200

E

Edyndella 8
Elatides 147, 200
Elatocladus 148
Encephalartites 80
Enygmatostrobus 200
Eretmophyllum 95

F

Feildenia 96
Ferganiella 151
Florinia 152
Fraxinopsis 153, 200
Frenelopsis 153
Furcula 9

G

Geinitzia 153
Gigantopteris 9

Ginkgo 97
Ginkgodium 106
Ginkgoites 107
Ginkgophyllum 110
Glossophyllum 110
Glossozamites 80
Glottophyllum 9
Glyptostroboxylon 153

H

Haiburnia 153
Harrisiothecium 9
Hartzia 125
Heilungia 61
Hissarella 10
Hissaria 153
Hydropterangium 10, 200
Hyrcanopteris 10

I

Imania 10
Ixostrobus 125, 200

J

Jacutiella 29
Juniperoxylon 154

K

Karkenia 111, 200
Keteleerioxylon 154
Ketovia 205
Kirjamkenia 10
Kryshtofovichiana 30

L

Lepidopteris 11
Leptopterophyllum 30
Leptostrobus 126, 200
Leuthardtia 30

M

Machairostrobus 200
Macrotaeniopteris 80
Madygenia 12
Madygenopteris 12
Masculostrobus 154, 200
Mesenteriophyllum 205
Miassia 206

N

Nageiopsis 154
Nansania 154
Neodoratophyllum 61
Neozamites 30
Neuropteridium 12
Nikania 81
Nilssonia 62
Nilssoniopteris 31

O

Odontopteris 12
Ontheodendron 154
Otozamites 33

P

Pachypteris 13
Pagiophyllum 155
Palaeopiceoxylon 157
Palissya 157
Paracmopyle 157
Paracycas 75
Parajacutiella 81
Parasequoia 157
Parataxodium 157
Peltaspermum 14
Phoenicopsis 128
Phyllocladoxylon 158
Piceoxylon 158
Pinites 159
Pinus 159
Pityocladus 160
Pityolepis 161, 200
Pitiophyllum 161
Pityospermum 165, 200
Pitiostrobus 168
Platylepidium 200
Platylepis 200, 201
Podocarpophyllum 169
Podocarpoxylon 169
Podocarpus 168
Podozamites 169
Polyandra 201
Problematospermum 201
Protoblechnum 14
Protopodocarpoxylon 180
Protocedroxylon 179
Pseudoctenis 76
Pseudocycas 36
Pseudolarix 180
Pseudotorellia 111
Pseudotychtopteris 14
Pseudovoltzia 181
Pterophyllum 37
Ptiloctenia 15
Ptilophyllum 45
Ptilozamites 15

R

Retinosporites 181
Rhopalostachys 201
Rhipidiocladus 181

S

Sagenopteridium 15
Sagenopteris 21
Samaropsis 181, 201
Sarmatiella 15, 82
Schidolepidium 184, 201
Schizolepis 184, 201
Sciadopitytes 183
Scytophyllum 15
Sequoia 188
Sorosaccus 201
Sphenobaiera 113
Sphenocallipteris 17
Sphenopteridium 17
Sphenozamites 47
Stachyopitys 202
Stachyotaxus 188
Staphidiophora 134, 202
Stenomischus 189
Stenopteris 18
Stehorhachis 202
Stephanophyllum 134
Storgaardia 189
Swedenborgia 190, 204

T

Taeniopteridium 82
Taenipoteris 82
Tanaidia 88, 204
Tanaidocarpidium 88, 204
Tanymasia 18
Taxites 190
Taxocladus 190
Tersiella 18
Thinnfeldia 19
Thinnfeldiella 20
Thuites 191
Tmematostrobus 204
Tomharrisia 191
Tomia 88
Tomiostrobus 192, 204
Toretzia 120, 204
Torreya 192
Tudovakia 20
Turketia 20
Tuzhykoviella 206
Tyrmia 48

U

Ulmannia 192
Umaltolepis 204
Uralophyllum 206
Ussuriocladus 192

V

Validopteris 21
Voltzia 192

W

Wielandiella 49, 204
Weltrichia 49, 204
Widdringtonites 193
Wiliamsonia 50, 204
Williamsonieila 52, 204
Windwardia 134

X

Xenoxylon 193

Y

Yavorskyia 88

Z

Zamiophyllum 53
Zamiostrobus 204
Zamites 53

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие (В.А. Вахрамеев) 3
Класс Gymnospermae. Голосеменные 5
Подкласс Pteridospermidae. Птеридоспермы 5
Порядок Cycadofilicales. Птеридоспермовые (И.А. Добрускина) 5
Порядок Caytoniales. Кейтониевые (И.А. Добрускина) 21
Подкласс Phyllospermidae. Филлоспермиды 23
Порядок Bennettitales (Cycadeoideales). Беннеттитовые (М.П. Долуденко) 23
Порядок Cycadales. Цикадовые (М.П. Долуденко) 55
Филлоспермиды ближе не установленного систематического положения (цикадофиты) (М.П. Долуденко) 78
Подкласс Stachyospermidae (Coniferophyta). Стахиоспермиды. 89
Порядок Ginkgoales. Гинкговые (В.А. Самылина) 89
Порядок Czekanowskiales. Чекановскиевые (А.И. Киричкова). 120
Порядок Coniferales. Хвойные (В.А. Красилов) . . . . . .
Репродуктивные органы голосеменных (А.Т. Буракова) 195
Голосеменные ближе не установленного систематического положения (И.А. Добрускина) 206
Литература 208
Указатель 228

МЕЗОЗОЙСКИЕ
ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ СССР
(Справочное руководство)

Утверждено к печати
ордена Трудового Красного знамени
Геологическим институтом АН СССР

Редактор издательства *В.Х. Марусич*
Художественный редактор *И.Ю. Нестерова*
Технические редакторы *Г.П. Каренина,*
И.И. Джиоева

ИБ № 17381

Подписано к печати 04.08.80. Т – 15803
Формат 60 x 90 1/16. Бумага офсетная № 1
Печать офсетная. Усл.печ.л. 14,5. Уч.-изд.л. 15,7
Тираж 750 экз. Тип. зак. 3227
Цена 2 р. 40 к.

Издательство "Наука", 117864 ГСП-7,
Москва В-485, Профсоюзная ул., д. 90
Типография № 9 Союзполиграфпрома,
Москва, Волочаевская ул., д. 40.

МЕЗОЗОЙСКИЕ
ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ СССР
(Справочное руководство)

Утверждено к печати
ордена Трудового Красного знамени
Геологическим институтом АН СССР

Редактор издательства *В.Х. Марусич*
Художественный редактор *И.Ю. Нестерова*
Технические редакторы *Г.П. Каренина,*
И.И. Джиоева

ИБ № 17381

Подписано к печати 04.08.80. Т – 15803
Формат 60 x 90 1/16. Бумага офсетная № 1
Печать офсетная. Усл.печ.л. 14,5. Уч.-изд.л. 15,7
Тираж 750 экз. Тип. зак. 3227
Цена 2 р. 40 к.

Издательство "Наука", 117864 ГСП-7,
Москва В-485, Профсоюзная ул., д. 90
Типография № 9 Союзполиграфпрома,
Москва, Волочаевская ул., д. 40.